

	La D	
	S. (d.
Nouvel Alphabet Double in 18 broché	1	6
Syllabaire des Ecoles chrétiennes, in-18 broch		
Petit Catéchismes de Québec (le) in-18 broch	9	3
Nouveau traité des Devoirs du chrétiens in-1	2	
Rélié	12	6
Histoire abrégé de l'ancien Testament avec	3	
celle de la vie de N. S. J. C. in-12 Relié	12	6
Psautier de David in-18 Rélie	6	6
Grammaire française par Lhomond in-12 Reli	é 4	
do do des frères in-12 Relié	10	- 1
do do par Noël & chapsal in-12 Reli	4 10	
do do Boucher-Belleville in-12 Reli	é 12	
Extrais de la Grammaire des frères in-18 Reli		6
Gramr'e angl. et française J. B. Meilleur in-12		6
Exercices ortographique des frères in-12 Reli	é 12	
do do Noël & chapsal in-12 Relié	10	
Dictée et corrigée des Exercises des frères		6
do do Noël & chapsal 12 Rélié		6
Géographie française des frères in-12 Relié	12	
Petite abrégé de Géographie in-32 Relié	5	0
Arithmétique des Frères in-12 Relié	12	
do do M. Bouthillier in-12 Relié	18	0
do do Bibaud in-12 Relié	10	
do do Walhingame in-12 Relié	10	
Abrégé de l'Histoire sainte, de France et d	10	
Canada in-12 Relié	7 6	
Abrégé de Géométrie pratique in-12 Relié	25	
Manuscrit par F. P. B. in-12 Relié	7 6	
do do Dembourg in-12 broché	6	000
The Catholique school Book in 12 Relie	6	000
Manuel de Phrase anglais et français 18 Relié Guide de l'Instituteur, in-12 Relié	10 7	WING.
(2)	18	《系》
5, pour cent de deduction pour argent comptant	. 9	
Beauchemin & Payette,	STORES	Pan)
P. CERAT, IMPRIMEUR.	器的	M
The state of the s	CO 8	314



12 6


12 6 6 6

10 10 **CANADA**

NATIONAL LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

QA 101 Bb Reserve

BLIOTHECAIRE



TRAITÉ D'ARITHMÉTIQUE

L'USAGE DES ÉCOLES,

PAR

JEAN-ANTOINE BOUTHILLIER.

CINQUIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE.



QUÉBEC:

TYPOGRAPHIE D'AUGUSTIN COTÉ ET CIE.

1855.

HOUTHMETHORE

Story SH SHERI

9

REAL VALUE BOLTHIELDS

REFERENCE TO ANYMOD STREET, STREET,



SHEET THE THE PARTY OF THE COLD TO STATE OF THE COLD TO STATE OF THE S

And the second s

The same of the sa

1000




TRAITÉ D'ARITHMÉTIQUE

L'USAGE DES ÉCOLES,

PAR

JEAN-ANTOINE BOUTHILLIER.

NOUVELLE SDITION, REVUE ET CORRIGÉE.



QUÉBEC:

J. & O. CRÉMAZTE, LIBRAIRES-ÉDITEURS, rue la Fabrique, N°. 12, 1855.

DISTRICT DE QUÉBEC.

SUREAU DU PROTONOTAIRE, 25e jour d'août 1835.

Qu'il soit notoire que le vingt cinquième jour d'août, dans l'année milhuit-cent-trente-cinq, Samuel Nellson & William Cowan de Québec, Imprimeurs, Papetiers et Associés faisant commerce à Québec sous le nom et raison de Neilson & Cowan, ont déposé dars ce buieau le tître d'un livre lequel est dans les mots suivants, savoir : "Traité d'Arithmétique pour l'usage des écoles, par Jean Antoine Bouthillier, troisième édition, revue et corrigée," au sujet duquel ils réclament le droit de propriété comme propriétaires.

THART

BUNHTHMETIOUE

Enregistré en conformité à l'acte provincial intitulé : " Acte pour protéger la propriété littéraire."

PERRAULT & BURROUGHS,

Protonotaires de la cour du Banc du roi du district de Québec.

Les soussignés ont acquis par acte authentique des héritiers, représentants ou ayant cause des dits Samuel Neilson & William Cowan, la propriété de l'ouvrage décrit dans le privilège ci-dessus.

J. & O. CRÉMAZIE,

Libraires-Editeurs.

as o creat las las constitues a

PROTONOTAIRE,

HAM

c, dans l'année mil-Cowan de Québec, se à Québec sous le se ce bureau le tître suit d'Arithpubliller, troisième ment le droit de pro-

: " Acte pour pro-

RROUGHS, du Banc du roi rict de Québec.

éritiers, représenam Cowan, la pro-

CRÉMAZIE, aires-Editeurs.

PRÉFACE

DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

J'AI donné en 1809 un Traité d'Arithmétique: la manière favorable dont il a été accueilli m'a engagé à en donner une nouvelle édition, revue et corrigée, avec tout le soin possible, et considérablement augmentée. Cette édition, par l'augmentation du format et celle des matières, contient au moins le double de la première.

Dans cette édition, comme dans la première, je n'ai eu en vue que d'être utile à mon pays; si j'atteins mon but, je serai

satisfait.

J. ANTOINE BOUTHILLIER.

BEAUPORT, 17 novembre, 1829.

T	A	\mathbf{B}	L	E	
-	-				_

De l'Addition, De la Soustraction, De la Multiplication, Table de Multiplication, De la Division, Des Fractions, Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Monnaies, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Composée, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte.	1
De l'Addition, De la Soustraction, De la Multiplication, Table de Multiplication, De la Division, Des Fractions, Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Monnaies, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Intérêt, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	
De la Soustraction, De la Multiplication, Table de Multiplication, De la Division, Des Fractions, Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Monnaies, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Intérêt, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	b.
De la Multiplication,. Table de Multiplication,. De la Division,. Des Fractions,. Des Fractions Décimales,. Des Fractions Décimales Périodiques,. Tables des Monnaies,. Tables des Poids,. Tables des Mesures,. Systême Métrique de France,. Systême Usuel ou Binaire,. De l'Evaluation des Fractions,. De la Réduction,. De l'Addition Composée,. De la Soustraction Composée,. De la Multiplication Composée,. De la Division Composée,. Multiplication par les Parties Aliquotes,. Des Raisons et Proportions,. Règle de Trois Simple,. Règle de Trois Composée,. Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance,. Règle d'Escompte,. Règle d'Intérêt Composé,. Profit et Perte,.	2
Table de Multiplication, De la Division, Des Fractions, Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Poids, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	4
De la Division, Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Monnaies, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De la Réduction Composée, De la Soustraction Composée, De la Division Composée, De la Division Composée, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Interêt Composé, Profit et Perte,	. 5
De la Division, Des Fractions, Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Poids, Tables des Mesures, Système Métrique de France, Système Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De la Réduction Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	b.
Des Fractions, Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Monnaies, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	8
Des Fractions Décimales, Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Poids, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	13
Des Fractions Décimales Périodiques, Tables des Monnaies, Tables des Poids, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De la Réduction Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	20
Tables des Monnaies, Tables des Poids, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De la Réduction Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Tois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	25
Tables des Poids, Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Tomis Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	28
Tables des Mesures, Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	36
Systême Métrique de France, Systême Usuel ou Binaire, De l'Evaluation des Fractions, De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Composée, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	37
Systême Usuel ou Binaire,. De l'Evaluation des Fractions,. De la Réduction,. De l'Addition Composée,. De la Soustraction Composée,. De la Multiplication Composée,. Multiplication par les Parties Aliquotes,. Des Raisons et Proportions,. Règle de Trois Simple,. Règle de Trois Composée,. Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance,. Règle d'Escompte,. Règle d'Intérêt Composé,.	42
De l'Evaluation des Fractions,. De la Réduction,. De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée,. De la Multiplication Composée,. Multiplication par les Parties Aliquotes,. Des Raisons et Proportions,. Règle de Trois Composée,. Règle de Trois Composée,. Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance,. Règle d'Escompte,. Règle d'Intérêt Composé,.	48
De la Réduction, De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle d'Intérêt, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	50
De l'Addition Composée, De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle d'Intérêt, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	53
De la Soustraction Composée, De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	55
De la Multiplication Composée, De la Division Composée, Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	5 €
De la Division Composée,. Multiplication par les Parties Aliquotes,. Des Raisons et Proportions,. Règle de Trois Simple,. Règle de Trois Composée,. Règle d'Intérêt,. Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance,. Règle d'Escompte,. Règle d'Intérêt Composé,.	58
Multiplication par les Parties Aliquotes, Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle d'Intérêt, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	59
Des Raisons et Proportions, Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle d'Intérêt, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	61
Règle de Trois Simple, Règle de Trois Composée, Règle d'Intérêt, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	72
Règle de Trois Composée,	75
Règle d'Intérêt, Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Intérêt Composé, Profit et Perte,	78
Règle de Commission, de Courtage, et d'Assurance, Règle d'Escompte, Règle d'Interêt Composé, Profit et Perte,	81
Règle d'Escompte,	90
Règle d'Intérêt Composé,	95
Profit et Perte, 10	98
	00
	90
Equations de Payements,	09
Règle d'Alliage,	10
Règle d'Echange. 1	16
	18
Fausse Position Double,	19
Règle de Change	21
Des Puissances,	22
De l'Extraction de la Racine Quarrée	24
De l'Extraction de la Racine Cubique,	26
	28
Des Progressions Géométriques,	41
Propriétés des Nombres,	
	60
	66

EXPLICATION DES SIGNES QUI SE TROUVENT DANS CE LIVRE.

- + Le Signe de l'Addition, signifie plus: 4 + 8 veut dire 4 plus 8, ou 4 ajouté à 8.
- Le Signe de la Soustraction, signifie moins: 10-4 veut dire 10 moins 4.
- × Le Signe de la Multiplication, signific multiplié par : 8 × 4 veut dire 8 multiplié par 4.
- = Le Signe d'Egalité: 8 × 2 = 16 veut dire 8 multiplié par 2 égale 16.
- ✓ Devant un Nombre, veut dire qu'on demande la Racine quarrée de ce Nombre.
- Signifie Racine cubique, etc.

NOMBRE OU CHIFFRES ROMAINS.

_		HIFFRES	ROMATA
1	_		TOMAINS.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	II III IV V VI VII VIII IX X XI XIII XIV XVI XVI	30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 200 300 400 500 600 700 800 900	ROMAINS. XXX XL LX LXX LXXX XC C CX CXX CXX CCC CCC
	XXI	1855	MDCCCLV.

ROUVENT

veut dire 4

10-4 veut

iplié par :

multiplié

la Racine

XXX
XL
LX
LXX
LXX
XC
C
CX
CX
CXX
CCX

DC DCC CCC CCC M .V.

CCC

DE L'ARITHMÉTIQUE.

L'Arithmétique, ou Science des Nombres, enseigne à faire différentes Opérations sur les Nombres, et en démontre les principales Propriétés.

Les Opérations principales de l'Arithmétique sont la notation et la numération, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

LA NOTATION est l'Art de marquer les Nombres par les Caractères qui leur sont propres, et de les distinguer par leurs Figures. On se sert en Arithmétique de dix Caractères ou Chiffres pour exprimer tous les Nombres possibles lesquels sont:—Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept, Huit, Neuf, Zéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0.

LA NUMERATION est l'Art de prononcer ou d'exprimer un

Nombre quelconque ou une suite de Nombres.

Dans la Numération actuelle, la valeur des Chiffres va en augmentant de droite à gauche en proportion décuple, c'est-àdire, que l'Unité d'un Chiffre à gauche vaut dix fois plus que l'Unité d'un Chiffre immédiatement à sa droite; ainsi, en allant de droite à gauche, les Unités du premier Chiffre seront des Unités simples, celles du deuxième des Dizaines, celles du troisième des Centaines, celles du quatrième des Mille, &c., et ainsi de suite, suivant le rang qu'il occupe; comme on peut le voir dans le Tableau suivant:—

8 9 6,	4 5 3,	120,	7 9 3,	5 8 6,
Trillions. Dizaines de Trillions. Centaines de Trillions	Billions. Dizaines de Billions. Centaines de Billions.	Millions. Dizaines de Millions. Centaines de Millions	Mille. Dizames de Mille. Centaines de Mille.	Unités. Dizaines. Centaines.

Le Zéro par lui-même ne signifie rien, et n'a auqune valeur mais il sett à remplir les places vacantes, et à ramener les Chiffres à leurs propres places.

Ainsi, si l'on voulait exprimer en Chiffres le Nombre Huit mille six cent deux, il faudrait commencer à gauche par les Mille, et mettre 8, ensuite 6 Centaines, et comme if n'y a point de Dizaines, il faudrait mettre un Zéro à la place, et ensuite les 2 Unités. Ainsi l'on écrirait 8602.

PRATIQUE,

Mettez en Chiffres les Nombres suivants :-Vingt-sept.

Quatre-vingt-un.

Cent soixante-et-dix.

Dix mille.

Trente mille soixante-et-dix.

Cent dix mille cent un.

Trois millions trente mille trois cent trois.

Vingt-huit millions treize.

Neuf cent quatre-vingt sept millions six cent cinquantequatre mille trois cent vingt-et-un. Cent onze millions cent onze.

Un Billion vingt millions trois cent quatre mille cinquante. Vingt billions deux cent deux millions vingt mille deux

Cent vingt-trois billions quatre cent douze millions trois cent quarante-et-un mille deux cent trente-quatre.

Ecris	TOP and		quarre.
65 04 06	9090 10751 *40848 85403 90602 1101010	tout au long les 2030405 4006307 89796959 90500900 90010007 102103040	Nombres suivants:- 123456543 135067001 289007064 698097001 852004601 987654321
06	85403 90602	89796959 90500900 90010007	289007064 698097001 852004601

DE L'ADDITION.

L'Addition est une Opération par laquelle on ajoute deux ou plusieurs Nombres ensemble pour savoir combien ils font en tout. Le résultat s'appelle Somme ou Total.

RÈGLE.

Posez les Nombres les uns sons les autres, les Unités sous les Unités, les Dizaines sous les Dizaines, etc., et tirez un Trait dess com lonn Cold Ajou ajou céde

P pera f'Op par

alla

en e

Son

1

ann ans

3

4

ann 629 845

5 une doi

6 d'A de une valeur mener les

mbre Huit he par les if n'y a place, et

luante-

inte. deux

s cent

ute len al.

uit

es

dessous. Ajoutez les Chiffres de la Colonne des Unités, et voyez combien elle contient de Dizaines, que vous ajouterez à la Colonne des Dizaines, et posez l'Excédant, s'il y en a, sous la Colonne des Unités, ou un Zéro s'il n'y a point d'Excédant. Ajoutez ensuite les Chiffres de la Colonne des Dizaines, en y ajoutant le Nombre de Dizaines contenues dans la Colonne précédente, et retenant les Centaines; et continuez ainsi en allant vers la gauche, et à la dernière Colonne posez le Nombre en entier.

Pour faire la Preuve de l'Addition, il faut recommencer l'Opération en sens contraires, c'est-à-dire, si l'on a commencé l'Opération par en bas, et en montant, il faut la recommencer

par en haut, et en descendant.

	Ajoutez	ensemble	les Nombres	suivants	-	
	2	23	9876	136082		1357904
	5	78	2468	752806		4680135
	7	76	3016	247193	1200	2468097
	9	21	6524	580683		3543285
	1	12	1123	469316	1 100	8642097
	8	67	6531	356205		5319864
	3	65	6976	641704	. 1 1	7531902
	4	46	3486	763917		2345604
G		200	40000	2042006		2000000
Sommes	39	388	40000	3947906		3888888 8

1. L'Amérique a été découverte en l'année 1492, en quelle année y aura-t-il 400 ans ?

Réponse. En 1892.

2. Un homme est né en 1782, en quelle année a-t-il eu 60 ans?

Rép. En 1842.

3. Ajoutez ensemble les nombres 6789, 8304, 7411, 2694, 8135. Rép. 33333.

4. Un Propriétaire de Terres reçoit de ses Fermiers une année 734 Minots de Blé, l'année suivante 365, la suivante 629, la suivante 396, 487 l'année d'après, et la dernière année 845; combien a-t-il reçu de Minots de Blé en tout?

Rép. 3456. 5. Une Personne me doit 723 Minots de Blé, une autre 250, une troisième 8200, et une quatrième 32600. Combien me doivent-elles en tout?

Rép. 41773. 6. Une Terre a produit 199 Minots de Blé, 220 d'Orge, 168 d'Avoine, 216 de Pois et 184 de Seigle. Combien de Minots de Grain la Terre a-t-elle produit en tout?

Rép. 987.

DE LA SOUSTRACTION.

bie

pre

foi

qu

le

rés

me

les nes

pli Mι ďľ Pro dui cat de d'o

Son

can

est

LA Soustraction est une Opération par laquelle on retranche un Nombre d'un autre, pour en connaître la

REGLE.

Posez le plus petit Nombre sous le plus grand, en sorte que les Unités soient sous les Unités, les Dizaines sous les Dizaines, &c., et tirez un Trait dessous. Commencez à la droite et retranchez chaque Chiffre du Nombre inférieur du Chiffre correspondant supérieur, et posez au-dessous la Différence, et ainsi de suite en allant vers la gauche.

Mais si le Chiffre inférieur était plus grand que le Chiffre supérieur, il faudrait ajouter 10 au Chiffre supérieur, et de cette somme retrancher le Chiffre inferieur, poser au-dessous la différence, et ensuite ajouter 1 au Chiffre inférieur suivant à gauche.

Pour faire la Preuve de la Soustraction on ajoute le petit Nombre à la Différence, et si la somme est égale au grand

EXEMPLES.

-			45.	ALMPLES.	•		
De ∙Otez	786 541	De Otez	3687 2343	De	56218	De	8200000
Reste	245	Reste	1344	70	38429	Olez	7632897
Preuve	786	Preuve	-		17789	Reste	567103
1. Un		me oot -		Preuve	56218	Preuve	8200000

1. Un homme est né en l'année 1739, et est mort en l'année 1815. Quel age avait-il?

2. L'Amérique a été découverte en 1492, et Québeca été fondé en 1608. Combien y a-t-il eu de temps entre ces deux Epoques?

3. Le Déluge a eu lieu l'an du monde 1656, et Notre Seigneur est né l'an du monde 4000. Combien de temps après le Delug : Notie Seigneur est-il né ? 4. On me doit 8675 Livres, et j'en dois 4337 : quelle est la

différence entre ce que je dois et ce qui m'est dû?

5. J'ai reçu d'une personne 3642 Livres, d'une autre 6363, 2115 d'une troisième, et j'en avais 6000. mes Créanciers 7862 Livres, à un autre 3450, et 2364 à un J'ai donné à un de autre. Combien me reste-t-il? Rép. 4444 Livres.

r laquelle on connaître la

en sorte que les Dizaines, droite et rehiffre corresnce, et ainsi

ne le Chiffre s, et de cette sous la diffént à gauche. ute le petit e au grand

> 8200000 7632897

567103

8200000

l l'année ns. beca été ces deux Ans. Ire Sei-

os après Innées. 9 est la

ivres. 9 6363, un de 1 à un vres. 6. Québec a été fondé en 1608, et a capitulé en 1759. Combien s'est-il passé de temps entre ces deux époques?

Rép. 151 Années.

DE LA MULTIPLICATION.

La Multiplication est une Opération par laquelle on prend un Nombre qu'on appelle *Multiplicande* autant de fois qu'il y a d'Unités contenues dans un autre Nombre que l'on appelle *Multiplicateur*.

Le Multiplicande est le Nombre que l'on multiplie, et le Multiplicateur est celui par lequel on multiplie, et le résultat de l'Opération s'appelle Produit.

Le Multiplicateur et le Multiplicande sont généralement appelés Termes ou Fecteurs

RÈGLE.

Posez le Multiplicateur sous le Multiplicande, de sorte que les Unités de l'un soient sous les Unités de l'autre, les Dizaines sous les Dizaines, etc., et tirez un trait dessous. Multipliez tous les Chiffres du Multiplicande pa chaque Chiffre du Multiplicateur, commençant par les Unités, retenant autant d'Unités qu'il y a de Dizaines au Produit pour les ajouter au Produit du Chiffre suivant du Multiplicande. Posez les Produits du Multiplicande entier par chaque Chiffre du Multiplicateur les uns sous les autres, ayant soin de mettre les Unités de chacun de ces Produits sous le Chiffre du Multiplicateur d'où il provient. Ajoutez tous les Produits ensemble, leur Somme sera le Produit Total.

Pour en faire la Preuve, faites du Multiplicateur le Multiplicande et du Multiplicande le Multiplicateur, et si l'Opération est bien faite les Produits doivent être les mêmes.

TABLE DE MULTIPLICATION.

		_												
2	fois	1	font	2	3	fois	3	font	9	4	fois	4	font	16
		2		4			4		12			5		20
		3		6			5		15			5		24
		4		8			6		18			7		28
		5		10			7		21			8		32
		6		12			8		24			9		36
		7		14			9		27			10		40
		8		16		1	0		30			11		44
		9		18		1	1		33			12		48
		10		20		1	12		36					
		11		22									•	
		12		24										

## Second	Solution Solution		U	
Multipliez 4761 par 2 7416 8 620316954 Produit 9522 59328 2481267816 1240633908 1860950862 Produit 200982693096 Multipliez 984 489 984 8856 1956 7872 3912 3936 4401 481176 481176 Preuve. Multipliez 8647302 par 6 Rép. 51883812 78964782 par 136 Rép. 10739210352 536271809 par 6798 Rép. 2338158091672	Multipliez 4761 par 7416 8 620316954 324 Produit 9522 59328 2481267816 1240633908 1860950862 Multipliez 984 par 489 489 489 984 8856 7872 3936 4401 481176 4	6 fois 6 font 36 7 8 40 9 45 50 11 12 60 6 fois 6 font 36 7 8 42 8 9 54 10 60 11 66	8 fois 8 font 10 11 12	56 10 9 font 8 63 11 99 70 12 100 84 11 110 12 120 64 72 80 11 fois 11 font 121 88 12 132
Multipliez 984 489 984 8856 1956 7872 3912 3936 4401 481176 481176 Preuve. Multipliez 8647302 par 6 Rép. 51883812 78964782 par 136 Rép. 32425494 403269764 par 5798 Rép. 2338158091672	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	par 2	7416 8	2481267816 1240633908
Multipliez 8647302 953691 78964782 403269764 536271809 par 5798 par 60204 par 60204 par 238158091672	Multipliez 8647302 par 6 $Rép$. 51883812 78964782 par 136 $Rép$. 32425494 403269764 par 136 $Rép$. 10739210352 536271809 par 60204 $Rép$. 2338158091672 987654321 par 123456789 $Rép$. 121932631112635269	9856 7872 3936	489 984 1956 3912 4401	Produit 200982693096
2.000203	Drago	Multipliez 8647302 953691 78964782 403269764 p 536271809 par 987654321 par 1	par 6 Rép. par 34 Rép. par 136 Rép. ar 5798 Rép. 60204 Rép. 23456789 Rép. 1	51883812 32425494 10739210352 2338158091679

1°. Lorsqu'un des Facteurs ou tous les deux ont des Zéros à la fin, ont fait la Multiplication comme s'il n'y avait point de Zéro, et ensuite on ajoute au Produit total autant de Zéros qu'il y en a aux deux Facteurs ensemble.

Mul

plus sépa comi le Pi

65

 $\begin{array}{r}
 392 \\
 1962 \\
 \hline
 2355
 \end{array}$

3

autre mièr soin la pa

Da en sé plié pour prem

8	9	font	81 90
	11	1 1	99
	12		108
	10 []	font	100
	2		110
•	~		120

11	font	121
12		132
12		144

620316954 324

2481267816 240633908 0950862

982693096

Zéros oint de s qu'il EXEMPLES.

Multipliez	7654300	153086	229629000
par	168	8400	5600
612344		612344	1377774
459258		1224688	1148145
_	285922400	1285922400	1285922400000

2°. Lorsque le Multiplicateur est le produit de deux ou plusieurs Nombres de la Table, multipliez par chaque Facteur séparément. Si par exemple vous avez à multiplier par 36, comme 6 multiplié par 6 font 36, multipliez d'abord par 6 et le Produit encore par 6.

EXEMPLE.

654321	par 36 654321	654321	654321	
36	6×	<6=36 9×	$4=36$ $12\times$	3=36
3925926 1962963	3925926 6	5888889 4	7851852 3	
2355556	2355556	2355556	2355556	

3°. Lorsqu'une partie du Multiplicateur fait partie d'une autre, on peut, pour abréger, prendre le Produit de la première partie autant de fois que la seconde le contient, ayant soin de mettre les Unités de chaque Produit sous les Unités de la partie du Multiplicateur d'où résulte ce Produit.

EXEMPLES.

Multipliez 76235 par 328	627180930234 224567
609880	4390266511638
2439520	$35122132093104 \\ 140488528372416$
25005080	140844139959858678

Dans le premier Exemple ci-dessus on a à multiplier par 328: en séparant ce nombre-là, on a 32 et 8; or 32 est égal à 8 multiplié par 4. En Multipliant le Multiplicande par 8 on a 609880 pour Produit; multipliant ce dernier Produit par 4 et posant le premier Chiffre du Produit sous le 2 du Nombre 32 on a pour

Produit 2439520, et faisant ensuite l'Addition on a pour Produit total 25005080. Dans le second Exemple en séparant en trois le Multiplicateur 224567 on a 224, 56 et 7; or 8 fois 7 font 56, et 4 fois 56 font 224. Dans ce dernier Exemple ... lieu de six Multiplications que l'on aurait à faire on n'ait que trois.

fin,

La La

Quo

e le

ivid

1. Il y a 40 hommes intéressés dans le payement d'une Somme, et chaque homme paye 1271 Livres : combien payent-ils en tout?

Rép. 50840 Livres.

2. Un homme gagne 3 Piastres par mois; combien gagnera-t-il en 4 ans?

3. Une Armée de 12350 hommes ayant pillé une Ville, chacun reçut 35 Livres pour sa part. A combien se montait la Somme prise?

Rép. 432250 Livres.

4. Combien y a-t-il de Verges de Drap dans 19 Balles de 13

Pièces chaque, et chaque pièce de 56 Verges ?

Rép. 13832 Verges.

5. Une Ile contient 56 Comtés, chaque Comté 35 Paroisses, et chaque Paroisse 99 Familles de 7 Personnes. Quelle est la population de l'1le ?

Rép. 1358280 Personnes.

6. Combien de Piastres dans 99 Sacs, contenant 999 Piastres chaque?

Rép. 98901 Piastres.

DE LA DIVISION.

LA Divison est une Opération par laquelle on cherche combien de fois un Nombre qu'on appelle Diviseur est contenu dans un autre nombre qu'on appelle Dividende. Le Nombre qui exprime combien de fois le Dividende contient le Diviseur, est appelé Quotient.

REGLE.

Posez le Diviseur à la Droite du Dividende, en les séparant l'un de l'autre par une Ligne, et urez un Trait sous le Diviseur. Prenez à la gauche du Dividende un nombre de Chiffres capable de contenir le Diviseur une fois ou davantage; cherchez combien de fois le Diviseur est contenu dans ce Nombre, écrivez le Quotient sous le Diviseur, en commençant vers la gauche. Multipliez le Diviseur par le Quotient que vous venez de trouver, et posez le Produit sous le Dividende partiel d'où est provenu ce Quotient. De ce Dividende retranchez le Produit, et au Restant ajoutez le Chiffre suivant du Dividende. Ce Restant, ainsi augmenté, sera un nouveau Dividende sur lequel vous opérerez comme sur le premier, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez abaissé tous les Chiffres du Dividende. Si, à

a pour Produit ant en trois le 7 font 56, et 4 a de six Mule trois.

ement d'une es : combien lo Livres. abien gagne-

Piastres.
e Ville, chae montait la
50 Livres.
Balles dé 13

Verges.
Paroisses, et
lle est la poDersonnes.
it 999 PiasPiastres.

n cherche
Diviseur
pelle Divifois le Dint.

es séparant e Diviseur. es capable ez combien ez le Quone. Multirouver, et rovenu ce t au Reservel vous usqu'à ce e. Si, à

fin, il y a un Reste, vous le mettrez après le Quotient, metent le Diviseur dessous, et les séparant par un Trait.

La Preuve de la Division se fait en multipliant le Diviseur par le Quotient ou le Quotient par le Diviseur, et ajoutant le Reste (dil y en a un) au Produit ; et si le Produit est la même chose le Dividende, l'Opération a été bien faite.

EXEMPLES.

ividende. Diviseur. 74082(6	Dividende. Diviseur 54873(8
6 12347 Quotient. 14 6 74082 Preuve.	48 68581 Quotient. 68 8 8 64 - 54872
20 18 28 24	47 40
42 42 42	1 Reste
00 Dividende. Diviseur. 433074(534 4272 811 Quotient. 587 534	534 811 534 534
534 534 000	4272 433074 Prouve.
Dividende. Diviseur. 101097(864 864 117 9 1469 864	864 117 6048 864 864
6057 6048 9 Reste,	101088 9 101097 Preuve.

REMARQUES.

1º. Lorsque le Diviseur n'excède pas 12, on peut faire l'Opération sans mettre d'autres Chiffres que le Quotient, que l'on pose immédiatement sous le Dividende, et au bout du Quotient l'on met le Reste, s'il y en a.

EXEMPLES.

Dividende. Diviseur. 7040862 (6		Dividende. 1 364401327		riseur.
1173477 6	Quotient.	45550165 8	3	Quotient.
7040862	Preuve.	364401320 7		
		264401207	2	Deprine

2°. Lorsque le Diviseur est le Produit de deux ou plusieurs Nombres qui n'excèdent point 12, on peut diviser par chaque Facteur séparément ; c'est-à-dire, on divise le Dividende par un des Facteurs, on divise ensuite par l'autre Facteur le Quotient qui en résulte, et ainsi de suite, s'il y a plus de deux Facteurs; observant de mettre le Reste, s'il y en a, après chaque Quotient où il se trouve. Pour avoir ce qui reste en dernière analyse; s'il n'y a que deux Facteurs, multipliez le dernier Reste par le premier Diviseur, et ajoutez-y le reste de la première Division, s'il y en a. S'il y a trois Facteurs, multipliez le dernier Reste par le deuxième Diviseur, et au Produit ajoutez le Reste de la deuxième Division; multipliez cette Somme par le premier Diviseur, et ajoutez le Reste de la première Division à ce nouveau Produit; et ainsi de suite, observant la même marche s'il y avait plus de trois Facteurs.

EXEMPLES.

1. Divisez 72534 par 36

$$4 \times 9 = 36$$
 $6 \times 6 = 36$
 72534 (4 1er. Divisr. 72534 (6 1er Divisr.
 $18133 + 2$ (9 2e. Divisr. $12089 + 0$ (6 2e. Divisr.
 $2014 + 7$ $2014 + 5$
 $7 \times 4 + 2 = 30$ Reste. $2014 + 5$
 $5 \times 6 + 0 = 30$ Reste. Rép. 2014 $\frac{39}{39}$

peut faire l'Oquotient, que

au bout du

iseur.

Quotient.

reuve.

ou plusieurs
par chaque
vidende par
teur le Quois de deux
en a, après
qui reste en
ultipliez le
le reste de
teurs, mulau Produit
pliez cette
e de la prenite, obser-

isr.

eure.

2014 30

2. Divisez 64867 par 144.

3. Divisez 763420 par 420.

$$3 \times 5 \times 7 \times 4 = 420.$$
 $6 \times 5 \times 7 \times 2 = 420.$ 763420 (3 ler Divr. 763420 (6 ler Divr. $254473 + 1$ (5 2e. $127236 + 4$ (5 2e. $25447 + 1$ (7 3e. $25447 + 1$ (7 3e. $3635 + 2$ (2 4e. $1817 + 2$ $1817 + 1$ $2 \times 7 + 4 = 18$; $1 \times 7 + 2 = 9$; $18 \times 5 + 3 = 93$; $9 \times 5 + 1 = 46$; $93 \times 3 + 1 = 280$ Reste. $46 \times 6 + 4 = 280$ Reste. $Rép. 1817 \frac{2}{2}$ 8.

3°. Lorsqu'il y a des Zéros à la fin du Diviseur, retranchez autant de Chiffres à la droite du Dividende, et faites la Division avec les Nombres qui restent, et à la fin de l'Opération ajoutez au Reste les Chiffres que vous aurez retranchés du Dividende.

EXEMPLES.

Divisez 783423 par 28900.

A2

Divisez	00/149/00 00 00
DIV1062	82647801612 par 9. Rém 019300000
-	
	1862086 par 13. Rép. 47341.
	432174 par 10 nep. 109034 8.
	EE1000
	620104 F 02. Ren. 9094611
	DOMORAGE I'' UV MAN 17EDDIA
	987654321 par 9999 Rép. 1750316
	34020011400 man 000000 200 901104996
	193/15C/700 TOUR I I MINUTED TO
	100000 Par 186300, Rép. 66010 9378
	123456789 par 186300. Rép. 11805918275 192867465 par 123000. Rép. 6621 26 189 39 5
	192867465 par 123000. Rép. $6621\frac{28}{28}\frac{83}{300}$. $1568\frac{23}{123}\frac{60}{000}$.

EXEMPLES.

1. Il y a 1596 arpents de terre à partager entre 21 hommes : combien doivent-ils avoir chacun?

Rép. 76 Arpents.

To l'a 25

87

co

te

qυ

no

ra <u>4</u> Fr

le

m

gr in

m ra

N no

 \mathbf{Fr} pltai no

 $\mathbf{pl}_{\mathbf{l}}$

ils

rat

ce Si

qu ŀΕ

 T_{ϵ}

2. Un père en mourant laisse une somme de 8766 livres à partager entre neuf enfants. Quelle est la part de chacun ?

Rép. 974 livres.

3. Un homme a fait 24 milles en un jour : combien de jours mettra-t-il à faire 1152 milles ?

Rép. 48 jours.

4. Un homme a fait 1728 milles en 72 jours; combien a-t-il fait de milles par jour ?

Rép. 24 milles.

5. Quel est le nombre qui multiplié par 24 donnera 1887480 ?

Rép. 78645.

6. Une bande de voleurs composée de 23 personnes, y compris le capitaine et le second, ayant volé une somme de 4536 livres, le capitaine partage la somme en 12 parties égales, dont il prend 3 pour sa part, le second 2, et le reste se partage également entre les autres voleurs. Quelle est la part de chacun?

Rép. { le capitaine 1134 livres. le second 756 _____ chaque autre 126 ____

DES FRACTIONS.

LES FRACTIONS ne sont autre chose que des parties de l'Unité ou de quelque Nombre que ce soit considéré comme un Tout, et sont représentées par deux Nombres l'un au-dessus de l'autre, séparés par un Trait entre deux; comme 1, 2, 3, 4, 8, Le Nombre inférieur s'appelle Dénominateur, et il désigne la Qualité des parties qui composent le Tout, si ce sont des Tiers, par exemple, ou des Quarts, &c. Le Nombre supérieur s'appelle Numérateur; il marque la Quantité de parties que

contient la Fraction.

Une Fraction est moindre que l'Unité lorsque son Numérateur est moindre que son Dénominateur; elle est plus grande que l'Unité lorsque son Numérateur est plus grand que son Dénominateur, et enfin elle est égale à l'Unité lorsque le Numérateur est égal au Dénominateur. Ainsi 2, est moindre que 1; 4 est plus grand que 1, et 3 est égal à 1. La première de ces Fractions, c'est-à-dire, lorsque le Numérateur est moindre que le Dénominateur, est-ce qu'on appelle une Fraction proprement dite. Les deux autres, lorsque le Numérateur est plus grand que le Dénominateur ou lui est égal, sont des Fractions improprement dites. Si deux Fractions ont le même Dénominateur, la plus grande sera celle qui a le plus grand Numérateur; ainsi 3 est plus grand que 2; mais si elles ont le même Numérateur, la plus grande sera celle qui a le plus petit Dénominateur; ainsi \(\frac{1}{2} \) est plus grand que \(\frac{1}{2} \). Il s'en suit qu'une Fraction sera d'autant plus grande que son Numérateur sera plus grand et son Dénominateur plus petit; et qu'elle sera d'autant plus petite que son Numérateur sera plus petit et son Dénominateur plus grand; ainsi 4 est plus grand que 13; car plus le Numérateur est grand et le Dénominateur petit, plus ils approchent de l'égalité, plus par conséquent la Fraction approche de l'Unité, et plus elle s'en éloigne dans le cas opposé.

On appelle Fractions simples celles qui n'ont qu'un Numé-

rateur et un Dénominateur; comme ½, 72, 13.

On appelle Fractions composées, ou Fractions de Fractions, celles qui font partie d'autres Fractions; comme les 3 de 3. Si une personne possède les trois quarts d'un Emplacement, et que j'achète les deux tiers de ce qu'elle possède, ma part de l'Emplacement sera alors les \(\frac{2}{3}\) de \(\frac{3}{4}\).

Tout Nombre entier peut être réduit en une Fraction, en regardant ce Nombre comme le Numérateur d'une Fraction dont

le Dénominateur serait l'Unité. Ainsi 4 = ‡

Le Numérareur et le Dénominateur d'une Fraction s'ppellent Termes de la Fraction.

l hommes :

3089068.

534 8 l6.

617.

53888.

28000

Arpents.

66 livres a hacun 🖁 livres.

n de jours

ours.

ien a-t-il

lles. 887480 !

y comde 4536 egales, partage part de

On appelle Nombre mixte celui qui est composé d'un Nombre entier et d'une Fraction; comme $2\frac{1}{3}$, $6\frac{7}{8}$, $9\frac{13}{28}$.

Si l'on multiplie ou si l'on divise les deux Termes d'une Fraction par un même Nombre, la valeur de la Fraction sera toujours la même; car si l'on multiplie par 2 les deux Termes de la Fraction 1, on aura la Fraction 2 qui égale 1: en effet, dans la Fraction 1 on prend une partie de l'Unité, et dans la Fraction ? on en prend deux; mais aussi dans cette dernière Fraction les parties sont deux fois moindres, car un Quart est la moitié d'une Demie, ainsi la Fraction n'a point changé de valeur. Par la même raison $\frac{6}{3} = \frac{2}{3}$, en divisant par 3 les deux Termes de la Fraction 4.

PROBLÈME I.

Réduire un Nombre mixte en une Fraction.

Regle.—Multipliez le Nombre entier par le Dénominateur de la Fraction, et au Produit ajoutez le Numérateur; cette Somme placée au-dessus du Dénominateur sera la Fraction requise, qui sera une Fraction improprement dite.

EXEMPLES.

1. Réduisez 41 en une Fraction.

Multipliez 4 par 3, Dénominateur de la Fraction, ce qui vous donnera 12; ajoutez le Numérateur 1, vous aurez 13, qui sera le Numérateur de la Fraction requise, sous lequel vous

		7.02
56	A × 3 4 Réduisez 5½ en une Fraction. Réduisez 19½ en une Fraction. Réduisez 22½ en Fraction. Réduisez 27½ en Fraction. Réduisez 47½ en Fraction. Réduisez 100½ en Fraction. Réduisez 514½ en Fraction. Réduisez 514½ en Fraction.	$1=13$ $Rép.$ $\frac{13}{4}$ $Rép.$ $\frac{47}{4}$ $Rép.$ $\frac{27}{4}$ $Rép.$ $\frac{11}{11}$ $Rép.$ $\frac{25}{6}$ $Rép.$ $\frac{61}{13}$ $Rép.$ $\frac{61}{13}$ $Rép.$ $\frac{63}{19}$ $Rép.$ \frac

PROBLÈME 2.

le

Trouver la valeur d'une Fraction improprement dite en Nombre entier

REGLE. Divisez le Numérateur par le Dénominateur, et le Quotient sera le Nombre entier requis ; et s'il y a un Reste, mettez-le au-dessus du Diviseur en forme de Fraction à la

osé d'un Nom-

Termes d'une a Fraction sera deux Termes e ½: en effet, ité, et dans la cette dernière an Quart est la ngé de valeur. deux Termes

énominateur ateur ; cette Fraction re-

on, ce qui rez 13, qui equel vous

13. 47.7 8. 7.9. 111. 250. 616. 131.9.

bre entie_r

ir, et le Reste, on à la

EXEMPLES.

1. Trouvez la valeur de 276.

2. Trouvez la valeur de ³⁸⁴⁸.

3848 21 174 168	183 ½T.	$R\acute{e}p.~183~rac{\hbar}{2.1}.$
68 63		
5	Reste.	

3. Trouvez la valeur de 1242? Rép. 561.

Quelle est la valeur de \$\frac{928}{29} ?
 Quelle est la valeur de \$\frac{529}{29} \frac{97}{2}\$
 Quelle est la valeur de \$\frac{52}{514} \frac{26}{4} ?
 Quelle est la valeur de \$\frac{86}{60} \frac{9}{3} \frac{9}{3} ?
 Rép. 32.
 Rép. 236₂%.
 Rép. 1209.
 Rép. 1433.

8. Quelle est la valeur de $\frac{1047654}{321}$? $Rép. 3263 \frac{23}{321}$.

PROBLÈME 3.

Réduire des Fractions au même Dénominateur.

Rècle.—Multipliez les deux termes de chaque fraction par le produit des dénominateurs de toutes les autres.

EXEMPLES.

1. Réduisez ½ et 3 au même dénominateur.

Multipliez 1 et 2 de la fraction $\frac{1}{2}$ par 3, dénominateur de $\frac{2}{3}$, ce qui vous donnera $\frac{2}{3}$; multipliez ensuite 2 et 3 de la fraction $\frac{2}{3}$ par 2, dénominateur de $\frac{1}{2}$, et vous aurez $\frac{1}{3}$. Les fractions seront donc $\frac{3}{3}$ et $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$, et $\frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

2. Réduisez 3, 4 et 4 au même dénominateur.

Multipliez 2 et 3 de la fraction 2 par 20, produit des dénominateurs des deux autres, et vous aurez 40; multipliez 3 et 4 de la fraction 3 par 15, produit des dénominateurs des deux autres, vous aurez 45; multipliez ensuite 4 et 5 de la fraction 4 par 12, produit des dénominateurs des deux autres, ce qui vous donnera $\frac{48}{60}$.—Vous aurez les fractions $\frac{40}{60}$, $\frac{45}{60}$, $\frac{48}{60}$.

3. Réduisez 7, 10, 16 et 11 au mêmo dénominateur.

 $Rép._{10560}^{9240},_{10560}^{9504},_{10560}^{5760},_{10560}^{9680}$

4. Réduisez 1/3, 3/5, 5/7, 7/9 et 1/2 au même dénominateur.

 \hat{Rep} . $\frac{3465}{10395}$, $\frac{6237}{10395}$, $\frac{7425}{10395}$, $\frac{8085}{10395}$, $\frac{450b}{10395}$.

la

Ί

n

pi

50

5. Réduisez 1, 2, 3, 4, 4 et 5 au dénominateur.

 $Rép. \frac{360}{720}, \frac{480}{720}, \frac{540}{720}, \frac{576}{720}, \frac{600}{720}.$

- 6. Réduisez $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{5}{10}$ et $\frac{6}{11}$ au même dénominateur. \hat{Rep} . $\frac{55440}{332640}$, $\frac{95040}{332640}$, $\frac{124740}{332640}$, $\frac{147840}{332640}$, $\frac{166320}{332640}$, $\frac{181440}{332640}$.
- 7. Réduisez $\frac{2}{23}$, $\frac{5}{26}$, $\frac{7}{29}$ et $\frac{9}{31}$ au même dénominateur.

 $Rép. \frac{46748}{537602}, \frac{103385}{537602}, \frac{129766}{557602}, \frac{156078}{537602}.$

8. Réduisez $\frac{1}{7}$, $\frac{5}{11}$, $\frac{9}{15}$, $\frac{13}{18}$, $\frac{17}{23}$ et $\frac{21}{27}$ au même Dénomina-

Rép. 1946835, 6194475, 8176707, 1324315, 10072755, 13627845, 13627845, 13627845, 13627845, 13627845, 13627845, 13627845

PROBLÈME.

Trouver le plus grand commun Diviseur des deux Termes d'une Fraction.

Regle. - Divisez 'e plus grand Terme de la fraction par le plus petit, et ce diviseur par le restant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien : le reste qui divisera exactement le reste précédent sera le plus grand commun diviseur cherché. Par exemple, dans la fraction 18, pour trouver le plus grand commun diviseur, divisez 48 par 18, le quotient est 2, avec 12 de reste; divisez 18 par le reste 12, le quotient est 1, et 6 de reste; divisez 12 par le reste 6, le quotient est exact: 6 est donc le plus grand diviseur de 18 et de 48.

Si le dernier reste était l'Unité, ce serait une marque que les deux nombres n'ont d'autre Diviseur commun que l'Unité,

PROBLÈME 5.

Réduire une Fraction à sa plus simple Expression.

Règle.—Divisez les deux Termes de la Fraction par leur plus grand commun Diviseur, et la Fraction qui en résultera sera réduite à sa plus simple Expression. Ainsi l'on réduira la Fraction $\frac{18}{8}$ à sa plus simple Expression en divisant ses deux Termes par leur plus grand commun Diviseur 6, ce qui donnera $\frac{3}{8}$.

EXEMPLES.

- 1. Réduisez $\frac{48}{56}$ à sa plus simple Expression Rép. 4.
- 2. Réduisez $\frac{72}{96}$, $\frac{84}{172}$ et $\frac{60}{125}$ à leur plus simple Expression. $Rép. \frac{3}{4}, \frac{21}{48}, \frac{12}{25}$.
- 3. Réduisez $\frac{180}{380}$, $\frac{120}{180}$, $\frac{60}{80}$, $\frac{24}{30}$ et $\frac{120}{144}$ à leur plus simple Expression. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$.
 - 3. Réduisez $\frac{296}{399}$ à sa plus simple Expression . $Rép. \frac{8}{27}$.

Ajouter deux ou plusieurs Fractions ensemble.

REGLE.—Réduisez-les au même Dénominateur, ajoutez ensemble les Numérateurs, et mettez le Dénominateur commun sous la Somme des Numérateurs.

EXEMPLES.

1. Ajoutez ensemble 1 et 1.	Rép. §.
2 Ajoutez ensembre 2 et 3.	$Rep. \frac{17}{12} = 14$
3. Ajoutez ensemble $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{6}$.	$R\acute{e}p. \ 1_{20}^{9}.$
4. Ajoutez $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{7}$, $\frac{8}{11}$ et $\frac{923}{924}$.	Rép. 4.
5. Ajoutez $\frac{7}{8}$, $\frac{9}{20}$, $\frac{11}{11}$, $\frac{13}{13}$ et $\frac{15}{18}$.	Rép. 2 47494.
6. Ajoutez $\frac{8}{17}$, $\frac{9}{19}$, $\frac{10}{27}$ et $\frac{11}{20}$.	Rép. 1131653.

PROBLÈME 7.

Soustraire une Fraction d'une autre.

REGLE. Réduisez les Fractions au même Dénominateur, retranchez le Numérateur de la plus petite de celui de la plus

luit des dénonultipliez 3 et urs des deux de la fraction utres, ce qui

ateur. 9680 9560

iteur. 185 - 8505 10595.

ninateur. , 181440.

énomina-

eur.

10072755 3627845, 0599435, 3627845

d'une

par le ite jusexactediviseur le plus it est 2, est 1, exact:

t que Unité. grande, et mettez le Dénominateur commun sous la Différence des Numérateurs.

EXEMPLES.

1.	De 1 retranchez 1.		,	Rép. 1.
. 2.	De ‡ retranchez !.			Rép. 1.
	De 4 retranchez 21.	.,	,	Rép. 12.
	De 53 retranchez 43.			Rép. 11.
	De 13 retranchez 18.	1 1	•	Rép. 195.
	De 61 retranchez 51.			Rep. 29.

PROBLÈME 8.

Multiplier une Fraction par une autre.

Ràcle.—Multipliez le Numérateur du Multiplicande par le Numérateur du Multiplicateur pour avoir le Numérateur du Produit; multipliez ensuite le Dénominateur du Multiplicande par le Dénominateur du Multiplicateur, et vous aurez le Dénominateur du Produit, que vous poserez sous le Produit des Numérateurs.

EXEMPLES.

1.	Mu	ltipliez	3	par	2.
----	----	----------	---	-----	----

$$Rép. \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Re Num

tient

natet tient

du D

mina

Remarques.—1°. Multiplier n'étant autre chose que prendre le Multiplicande autant de fois qu'il y a d'unités dans le Multiplicateur, multiplier 3 par 2, c'est prendre 3 deux tiers de fois, ou prendre les 3 de 3 qui seront 2 ou 1. On voit de là que pour réduire les Fractions de Fractions à une Fraction simple, il ne s'agit que de les multiplier les unes par les autres. Numérateurs par Numérateurs et Dénominateurs par Dénominateurs. 2°. Un Nombre entier pouvant être considéré comme une Fraction dont il serait le Numérateur ayant l'Unité pour Dénominateur, il suffit, pour multiplier une Fraction par un Entier, ou un Entier par une Fraction, de multiplier le Numérateur de la Fraction par l'Entier : Ainsi $5 \times \frac{7}{10} = \frac{5}{1} \times \frac{7}{10} = \frac{1}{10}$ $\frac{35}{15} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{4}$. 3°. Pour multiplier un Nombre mixte par un Entier ou par un Nombre mixte, il suffit de réduire le Nombre mixte en Fraction improprement dite, et ensuite pro céder à la Multiplication comme ci-dessus.

Ainsi
$$3\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{3} = \frac{7}{2} \times \frac{16}{3} = \frac{119}{3} = \frac{56}{3} = 18\frac{2}{3}$$
.

2.	Multipliez 8 par 76.	: ::	Rép.	31.
3.	Multipliez les 4 des 4 de 35 par 4.		Rép.	16.

Différence

ép. 1. ép. 13. ép. 13.

p. 195.

nde par le r du Proiplicande le Dénodes Nu-

 $a=\frac{1}{2}$.

de prendans le
ux tiers
oit de là
ion simautres,
dénomicomme
ité pour
par un
Numéte par
uire le

3½. 16.

te pro

4. Multipliez les 4 des 14 de 21 par les 4 des 4 de 34.

Rép. 11.

5. Multipliez les $\frac{2}{5}$ de $\frac{1}{5}$ de 21 par le $\frac{1}{16}$ de 15. Rép. 1.

6. Multipliez les 4 de 1 de 71 par les 4 des 2 de 61.

Rip. 3.

PROBLÈME 9.

Diviser une Fraction par une autre.

Regle.—Multipliez le Dénominateur du Diviseur par le Numérateur du Dividende, pour avoir le Numérateur du Quotient; multipliez le Numérateur du Diviseur par le Dénominateur du Dividende et vous aurez le Dénominateur du Quotient. Ou bien, renversez le Diviseur, c'est-à-dire, faites du Dénominateur le Numérateur et du Numérateur le Dénominateur, et procédez comme en la Multiplication.

EXEMPLES.

1. Divisez 4 par 3.	Rép. 4.
2. Divisez $\frac{2}{3}$ par $\frac{4}{3}$.	Rép. 14.
3. Divisez 4 par #.	Rép. 41.
4. Divisez ‡ par 6.	Rép. 16.
5. Divisez \(\frac{3}{4} \) par 4\(\frac{1}{2} \).	Rép. 1.
6. Divisez 3 ² / ₃ par 5.	Rép. 11.
7. Divisez le $\frac{1}{3}$ de 4 par le $\frac{1}{4}$ de 3.	Rép. 17.
8. Divisez les 3 des 3 de 1 par le 1 de 2.	Rép. 1.

DES FRACTIONS DECIMALES.

3

au

res et

d'a

de

Dé

au rep Dé

tio 149

pė:

3.

4.

5.

6.

7.

9

10.

du sui teu

nou

LES FRACTIONS DECIMALES sont celles qui ont pour Dénominateur l'Unité suivie d'un ou de plusieurs Zéros. Ainsi 10, 150, 1000, sont des Fractions Décimales; mais pour simplifier, on n'exprime point le Dénominateur, on met seulement le Numérateur, en mettant un Point à la gauche et ensuite l'Entier, s'il y en a un, ou un Zéro s'il n'y a pas d'En-Ainsi au lieu de 3 on écrit 0.3; au lieu de 242 on écrit 2.42.

Le Dénominateur d'une Fraction Décimale est l'Unité suivie d'autant de Zéros qu'il y a de Chiffres à la droite du Point. Ainsi le Dénominateur de 0.346 sera 1000; cette Fraction

Comme dans la Numération des Nombres entiers la valeur des Chiffres va en augmentant de droite à gauche en proportion décuple, de même dans les Fractions Décimales leur valeur décroît dans la même proportion, mais de gauche à droite. Ainsi 0.5 exprime cinq Dixièmes; 0.05 exprime cinq Centièmes; 0.005 cinq Millièmes, &c.

On voit clairement que des Zéros à la gauche d'une Fraction Décimale en changent la valeur, que 05, 0.05 et 0.005 ne sont pas la même chose; mais que lorsqu'ils sont à la Iroite ils n'en changent point du tout la valeur, ainsi 0.5, 0.50, 0.500, &c., ou 15, 50°, 1000, &c., sont toujours 1.

PROBLÈME 1.

Réduire une Fraction ordinaire en Fraction Décimale.

REGLE - Ajoutez un Zéro au Numérateur de la Fraction, clivisez ensuite ce Namérateur ainsi augmenté par le Dénominateur, et vous aurez la première Décimale du Quotient; s'il y a un Reste ajoutez-y un Zéro, et continuez ainsi la Division en ajoutant toujours un Zéro au Reste.

EXEMPLES.

1. Réduisez la Fraction 3 en Fraction Décimale.

Ajoutez un Zéro au Numérateur 3, ce qui vous fera 30, qui divisé par le Dénominateur 4 donnera 7, et 2 de reste ; ajoutant un Zéro au Reste 2, vous aurez 20, qui divisé par 4 donnera 5. Ainsi 0.75 sera la Fraction Décimale cherchée.— Lorsque l'on parvient à terminer la Division sans aucun reste, on appelle la Fraction Décimale qui en résulte terminée ou

ALES.

nt pour Dénopros. Ainsi 10, ais pour simon met seulegauche et eny a pas d'Ena de 242 on

'Unité suivie ite du Point. ette Fraction

ers la valeur en proporimales leur e gauche à 5 exprime

ne Fraction 005 ne sont a Jroite ils 50, 0.500,

ale.

Fraction, le Dénoluotient ; ainsi la

30, qui ; ajou-4 donchée. reste, inée ou

2. Réduisez la Fraction 1 en Fraction Décimale :-

Ajoutant un Zéro au Numérateur 1, on a 10, qui divisé par 3 donnera 3, et 1 de reste; ajoutant 0 à ce Reste, on aura encore 10, et divisant par 3 on aura encore 3 et 1 de reste et continuant ainsi on trouvera toujours 3 pour le Quotient, et la Fraction sera 0.33333 &c., de sorte qu'il est impossible d'avoir une Fraction Décimale finie qui exprime la valeur de \(\frac{1}{3} \). On connaît qu'il est impossible de trouver une Fraction Décimale finie lorsqu'on voit reparaître les mêmes Chiffres au Quotient et dans le même ordre; et les mêmes Chiffres reparaissent ainsi, pour le plus tard, au rang désigné par le Dénominateur de la Fraction. Si l'on voulait réduire la Fraction \(\frac{1}{7} \) en Fraction Décimale, on aurait 0.142857 et ensuite 142857 &c., à l'infini. On appelle ces Fractions infinies ou périediques.

3. Réduisez 7 en Fraction Décimale. Rép. 0.875.

4. Réduisez † en Fraction Décimale. Rép. 0.4444 &c.

5. Réduisez $_{\frac{1}{25}}$ en Fraction Décimale. Rép. 0.008.

6. Réduisez $\frac{1}{333}$ en Fraction Décimale. Rép. 0.123123123 &c.

Réduisez 5 5 en Fraction Décimale. Rép. 0.0126126126 &c.
 Réduisez 5 en Fraction Décimale. Rép. 0.38888 &c.

9. Réduisez $15_{2}^{3}_{5}$ en Fraction Décimale. Rép. 0.38888 &C.

10. Réduisez $22 \frac{7}{300}$ en Fraction Décimale. Rép. 22.02333

PROBLÈME 2.

Réduire des Fractions Décimales en Fractions ordinaires.

REGLE.—Mettez les Décimales, ou les Chiffres à la droite du Point, pour Numérateur, et pour Dénominateur l'Unité suivie d'autant de Zéros qu'il y a de Chiffres au Numérateur, et réduisez ensuite la Fraction à sa plus simple Expression.

N. B.—Il ne s'agit ici que des Fractions Décimales finies: nous parlerons des autres plus loin.

EXEMPLES.

- 1. Réduisez 0.125 en une Fraction ordinaire. Rép. 195 = 18.
- 2. Réduisez 0.9375 en Fraction ordinaire. Rép. 15.
- 3. Réduisez 0.00224 en Fraction ordinaire. Rép. 3745.
- 4. Réduisez 0.3125 en Fraction ordinaire, Rép. 16.

5. Réduisez 0.0032 en Fraction ordinaire.

Rép. ets.

6. Réduisez 0.008 en Fraction ordinaire.

Rép. Tit.

PROBLÈME 3.

Ajoutez des Fractions Décimales.

REGLE.—Posez ces Fractions avec leurs Entiers, si elles en ont, les unes sous les autres, les Unités sous les Unités, les Dizaines sous les Dizaines, &c., les Dixièmes sous les Dixièmes, &c. Opérez ensuite de droite à gauche, comme dans l'Addition des Nombres entiers, et séparez dans la Somme autant de Décimales qu'il y en a dans le Nombre qui en contient le plus.

EXEMPLES.

1. Soient 302.7, 35.702, 49.1786, 2.35, 0.75, et 4 à ajouter ensemble.

302.7 35.702 49.1786 2.35 0.75 4

Rép. 394.6806

2. Trouvez la Somme de 0.057, 9.9875, 8 et 2.03.

Rép. 20.0745.

3. Ajoutez ensemble 54.75, 46.875, 32.4, 19.025 et 46.95.

Rép. 200.

4. Ajoutez ensemble 47.25, 28.5625, 54.65, 50.575, 112.45 et 120.0125. Rép. 413.5.

5. Ajoutez ensemble 276, 54.321, 0.651 et 113.25.

Rép. 444.222.

6. Ajoutez ensemble 66.35625, 56.09062, 35.684375 et 12.868755. Rép. 171.

PROBLÈME 4.

Soustraire des Fractions Décimales.

REGLE.—Disposez les comme ci-dessus, et opérez comme dans la Soustraction des Nombres entiers. Si le Nombre supérieur n'avait pas autant de Décimales que le Nombre inférieur, il faudrait y ajouter autant de Zéres qu'il en faut pour l'égaler au nombre inférieur.

1. So

2. 0

3. D

4. D 5. D 6. D

bres er y en a avait j Multip gauch le Prod ensem

REG

688. 148.

elles ités,

s les nme s la nbre

ajou-

745. 3.95.

200. 2.45 3.5.

22. et

71.

me

suféour

EXEMPLES.

1. Soit 25.032 à retrancher de 32.04. 32.040 25.032

Rép. 7.008

2. Otez 0.986 de 24.

24.000 0.986

Rép. 23.014

3. De 99188.27244 retranchez 55978.2601.

 4. De 1 retranchez 0.005.
 Rép. 43210.01234.

 5. De I828 retranchez 1.828.
 Rép. 1826.172.

 6. De 28.005 ôtez 0.28005.
 Rép. 27.72495.

PROBLÈME 5.

Multiplier des Fractions Décimales.

Regle.—Opérez la Multiplication comme avec les Nombres entiers, et séparez au Produit autant de Décimales qu'il y en a, tant au Multiplicande qu'au Multiplicateur S'il n'y avait point au Produit autant de Décimales qu'il y en a au Multiplicande et au Multiplicateur, il faudrait ajouter à la gauche du Produit autant de Zéros qu'il en faudrait pour que le Produit contînt autant de Décimales que les deux Facteurs ensemble.

EXEMPLES.

1. Multipliez 57.69 par 22.5.

57.69 22.5

28845 11538 11538

Rép. 1298.025

2. Multipliez 0.872 par 0.985.

.872

.985

4360 6976

7848

Rép. .858920

 Multiplier 282.5 per 2.64.
 Multiplier 117.36 per 812.5. Multipliez 0.0674 par 0.321.

Rép. 95355.Rép. 0.0216354. Rep. 0.0032.6. Multipliez 0.0008 par 4.

Rép. 745.8.

PROBLÈME 6.

Diviser des Fractions Décimales.

Regle.—Faites la Division comme avec les Nombres entiers, et au Quotient séparez autant de Décimales qu'il y en a le plus au Dividende qu'au Diviseur. Si le Quotient ne contient pas assez de Décimales, ajoutez à la gauche autant de Zéros qu'il en faut pour que le Quotient ait autant de Décimales que le Dividende en contient de plus que le Diviseur.

REMARQUES.

1°. S'il y a autant de Décimales au Dividende qu'au Diviseur, le Quotient sera sans Décimales; et si, dans ce cas, le Dividende était plus petit que le Diviseur, le Quotient serait une Fraction que l'on pourrait réduire en Fraction Décimale d'après le Problème 1er.

2°. S'il y avait moins de Décimales au Dividende qu'au Diviseur, il faudrait ajouter quelques Zéros au Dividende pour avoir au moins autant de Décimales au Dividende qu'au Diviseur ; et même si l'on voulait avoir quelques Décimales au Quotient, on pourrait ajouter au Dividende assez de Zéros pour qu'il y eût plus de décimales au dividende qu'au diviseur.

3°. Si en divisant une Fraction Décimale par une autre, ou par un Entier, ou en faisant une Division quelconque, on trouve un Reste, on peut continuer d'opérer sur ce Reste comme sur un Reste de Division ordinaire, en ajoutant un Zéro à chaque nouveau Reste, et le Quotient de ce Reste par le Diviseur sera une Fraction Décimale.

EXEMPLES.

1. Divisez 32.175 par 8.25. 32.175 (8.25 24.75- 3.9 Rép. 7425 7425

 Divisez 55811.85 Divisez 47117.5 Divisez 17.8848 Divisez 100.05 Divisez 0.920178 	par 86.53 par 47. par 0.192 par 0.012 par 218.	$egin{array}{ccc} R \hat{e} p & R \hat{e} p \ R \hat{e} p & R \hat{e} p \end{array}$. 645. . 1002.5. . 93.15. . 8004. 0.004221.
--	--	--	---

DES

LES dans le contin

Nou fraction termin males une de duit de

N. 1 sultant quelqu 2 sont 3125,

Parı

Décim répété appell où il tions (appell gauch Chiffr Fracti 0.136 qui ne cimal Décir n'est

Ch au li dénor

pério

Po plus répet prem comp 0.3630.3,

DES FRACTIONS DÉCIMALES PÉRIODIQUES.

LES FRACTIONS DÉCIMALES PÉRIODIQUES sont celles dans lesquelles on voit un ou plusieurs Chiffres revenir continuellement dans le même ordre.

Nous avons vu, au problème 1, page 21, qu'il y a des fractions que l'on ne peut pas réduire en Fractions Décimales terminées ou finies. On ne peut réduire en Fractions Décimales finies que les Fractions dont le dénominateur est 2 ou une de ses puissances, 5 ou une de ses puissances, ou le produit de ces deux nombres ou de leurs puissances.

N. B.—Par puissance d'un nombre on entend le produit resultant de la Multiplication de ce nombre par lui-même, quelque nombre de fois que ce soit: ainsi, les puissances de 2 sont 4, 8,16,32, etc.; les puissances de 5 sont 25,125,625,-3125, etc.

Parmi les fractions qui ne peuvent se réduire en Fractions Décimales finies, il y en a où il ne se tronve qu'un Chiffre de répété; telle est la Fraction Décimale 0.32333, etc. = \frac1 : on appelle ces Fractions Périodiques simples. Il y en a d'autres où il y a plusieurs Chiffres de répétés; telles sont les Fractions 0.363636 etc. $= \frac{1}{11}$, 0.142857142857, etc. $= \frac{1}{11}$: on less appelle Périodiques composées. Enfin il y en a qui, à la gauche des Chiffres qui se répètent, contienneut d'autres Chiffres qui n'entrent point dans la répétition: telles sont les Fractions 0.233333, etc. $=\frac{7}{30}$, 0.026666, etc. $=\frac{2}{75}$, 0.1363636, etc. = $\frac{3}{24}$, 0.12363636, etc. = $\frac{34}{243}$. Les Chiffres qui ne se répètent point s'appellent la partie finie de la Décimale, et les autres la partie périodique; et on appelle ces Décimales Mixtes; Mixtes simples si la partie périodique n'est que d'un seul Chiffre, et Mixtes composées si la partie périodique est de plus d'un Chiffre.

Chaque chiffre de la partie finie a 10 pour dénominateur, au lieu que chaque Chiffre de la partie périodique a 9 pour dénominateur.

Pour simplifier, on ne répète point la partie périodique plus d'une fois, mais on met un point sur le Chiffre qui est répèté, dans les Décimales Périodiques simples, et sur le premier et le dernier Chiffre de la période dans les périodiques composées. Ainsi, au lieu d'écrire 0.3333, etc., 0.2333, etc., 0.363636, etc., 0.123636, etc., 0.4763763, etc., on écrit 0.3, 0.23, 0.36, 0.1236, 0.4763.

en-

y en it ne itant Déeur.

Dicas, seéci-

a'au
nde
a'au
ales
eros
eur.
tre,
on
este
un

PROBLÈME 1.

Réduire des Fractions Décimales Périodiques en Fractions ordinaires.

Ajo

ord

cor

la

1.

REGLE.—Si la décimale est une périodique simple, mettez un 9 pour dénominateur, et réduisez la fraction à sa plus simple expression, si elle en est susceptible. Si c'est une périodique composée, mettez autant de 9 pour dénominateur qu'il y a de chiffres dans la période, et réduisez-la à sa plus simple expression. Enfin, si c'est une périodique mixte, simple ou composée, soustrayez la partie finie de la décimale entière, le reste sera le numérateur de la fraction; pour le dénominateur, mettez autant de 9 qu'il y a de chiffres dans la période, suivis d'autant de Zéros qu'il y a de chiffres dans la partie finie.

EXEMPLES.

1. Réduisez 0.6 en fraction ordinaire. $0.6 = \frac{4}{3} = \frac{2}{3} R \acute{e} p$.

2. Réduisez 0.3 24 en fraction ordinaire. 0.3 2 4 = $\frac{324}{3}$ = $\frac{1}{3}$ Rép.

3. Réduisez 0.136 en fraction ordinaire.

Reste 125 Numérateur.

4. Réduisez 0.59 25 en fraction ordinaire.

Reste 5920 Numérateur.

5. Quelle est la valeur de 2.53? $Rép. 2_{35}^8$.

6. Quelle est la fraction ordinaire qui équivaut à 25.00972?

 $Rep. 25 = \frac{9}{92} 5.$

7. Quelle est la valeur de $9.02\dot{6}$? $R\acute{e}p. 9_{75}^2$.

8. Quelle est la valeur de 3.49? $Rép. 3\frac{1}{2}$.

9. Quelle est la valeur de 9.9? Rép. 10.

Remarque.—On voit par ces deux derniers exemples que lorsque la périodique est 9, elle augmente d'une unité le chiffre qui la précède, soit que ce soit un entier ou une décimale. En effet 3.49 n'est autre que $3 + \frac{1}{10} + \frac{9}{10}$ de $\frac{1}{10}$; or, réduisant au même dénominateur, on aura $3 + \frac{3}{10} + \frac{9}{10} = 3$ 4 Donc toutes les fois qu'à la fin d'une division on viendra à avoir 9 pour périodique, il suffira d'augmenter d'une anité le chiffre qui précédera le 9.

PROBLÈME 2.

Ajouter, soustraire, multiplier et diviser des Fractions Décimales Périodiques.

REGLE.—Réduisez les Fractions Décimales en Fractions ordinaires d'après le Problème précédent; opérez ensuite comme avec les Fractions ordinaires, puis réduisez la Somme, la Différence, le Produit ou le Quotient en Fraction Décimale.

EXEMPLES.

1. Ajoutez ensemble 0.3 0.36, 0.45, et 0.09.

2. De 0.1 26 ôtez 0.027.

$$\begin{cases}
0.126 = \frac{126}{999} \\
0.027 = \frac{27}{9999}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
Difference = \frac{99}{9999} = 0.099 \text{ Rép.}$$

3. Multipliez 0.36 par 0.23.

$$\begin{array}{l}
0.36 = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}. \\
0.23 = \frac{2}{90} = \frac{7}{30}.
\end{array}$$

$$Produit = \frac{28}{330} = 0.084 Rép.$$

4. Divisez 0.36 par 0.27.

$$\begin{array}{c}
0.3\dot{6} = \frac{3}{9}\frac{3}{9} = \frac{1}{3}\frac{1}{9}.\\
0.27 = \frac{2}{12} = \frac{3}{3}.
\end{array}$$
Quotient = $\frac{12}{9}$ = 1.34 Rép.

5. Combien font 3.75 et 3.75?

Rép. 7.505.

6. Quelle est la différence entre 3.75 et 3.75?

Rép. 0.005.

7. Quel est le produit de 3.75 par 3.75?

Rép. 14.083.

8. Quel est le quotient de 3.75 divisé par 3.75?

Rép. 1.00148.

9. Quelle est la somme de 0.405 et de 0.405?

Rép. 0.81096.

00972?

dinaires.

mettez sa plus

est une

inateur

sa plus

mixte,

écimale pour le

dans la

dans la

s que nité le ne dé-

1₀; or, 1₀; or, 1₀0 = 100 on d'une

Le la Liv Cours Le Cours de l'A

Da Louis New A l Coura maïq Le le Co On entre

10. Quelle est la différence entre 0.405 et 0.405 ?
Rép. 0.00015.
11. Quelle est le produit de 0.405 per 0.405?
Rép. 0.16441.
12. Quel est le quotient de 0.405 par 0.405?
Rép. 1.00037.
TABLES DES MONNAIES, POIDS ET MESURES.
TABLES DES MONNAIES.
COURS ACTUEL.
2 Farthings font 1 Sou.
2 Sous " 1 Penny d.
12 Pence " 1 Chelin s. 20 Chelins " 1 Louis £
5 Chelins Courant font 1 Piastre, et 4 Piastres font 1 Louis
Courant
Dans ce Pays l'on compte l'Argent d'après le Cours ci-
dessus, que l'on appelait ci-devant, et que quelque-uns
appellent encore, Cours d'Halifax, parce que ce Cours avait
lieu à Halifax avant qu'il fût introduit ici, mais que l'on ap-
pelle maintenant Cours actuel de la Prevince, ou simple- ment Courant. Ce même Cours a aussi lieu dans le Haut-
Canada et dans le Nouveau-Brunswick.
Le Cours de la Monnaie de Compte en Angleterre, que
l'on appelle Sterling, se subdivise comme le Cours actuel de
de la Province; mais il vaut un Neuvième de plus : ainsi
neuf Louis Sterling valent dix Louis Cours actuel. Pour changer le Sterling en Courant, ajoutez un Neu-
vième; et pour changer le Courant en Sterling, retranchez un
Dixième.
ANCIEN COURS.
12 Deniers font 1 Sou
20 Sous 1 Livre ou Franc lb.
24 Livres Ancien Cours font 20 Chelins Cours actuel.—
Il y a denx autres Cours qui ne sont plus en usage que dans
les Anciens Titres de Concession ; ce sont le Tournois et le Parisis. Le Tournois vaut un Neuvième de plus que l'An-
cien Cours, et le Parisis un Quart de plus que le Tournois.
Ainsi 9lbs. Tournois valent 10lbs. Ancien Cours, et 4lbs.
Parisis valent 5lbs. Tournois.

Le Franc actuel de France vaut un Huitième de plus que la Livre Ancien Cours: ainsi 8 Francs valent 9lbs. Ancien Cours ou 8lbs. 2s. Tournois.

Le Cours de l'Armée vaut un Quatorzième de plus que le Courant, et un Vingt-huitième de moins que le Sterling: 28s. de l'Armée font 30s. Courant ou 27s. Sterling.

Dans le Cours de New-Yorl, le Chelin est de 15 Sous et le Louis de 12s. 6d. Courant ; ainsi 5s. Courant font Ss. de New-York.

A la Jamaïque le Cours est de 26 par cent de moins que le Courant, c'est-à-dire, £100 Courant valent £126 de la Jamaïque.

Le Cours d'Irlande est plus fort d'un Trente-neuvième que le Courant, et plus faible d'un Treizième que le Sterling

On peut voir par les Tableaux qui suivent, les rapports entre le différents Cours mentionnés ci-dessus.

ouis

eiuns vait appleaut-

que l de insi uel. leu-

ans t le Anois. lbs.

80 Chelins de New York valent 4	63 Chelins de la Jamaïque. 3 Livres Anciens Cours. 27 ····· Tournois. 2 Francs actuels de France. 5 Chelins Courant. 39 ···· d'Irlande. 7 ···· de l'Armée. 9 ···· Sterling. 27 ··· Livres Parisis;
	4
63 Chelins de la Jamaïque valent 21	80 Chelins de New-York, 20 Livres Ancien Cours. 6 Tournois. 160 Francs. 50 Chelins Courant, 65 d'Irlande. 20 de l'Armée. 5 Sterling. 24 Livres Parisis.
3 Livres Ancien Cours valent 20	4 Chelins de New-York. 21 de la Jamaïque. 9 Livres Tournois. 8 Francs. 5 Chelins Courant. 13 d'Irlande. 7 de l'Armée. 3 Sterling. 18 Livres Parisis.

27 Livres Tournois 6		7 10 80 25 65 70	Chelins de New-York de la Jamaïque. Livres Ancien Cours. Francs. Chelins Courant d'Irlande de l'Armée Sterling. Livres Parisis.
2 Francs actuels de France 160	1	89 81 15 7 27	Chelins de New-York. de la Jamaïque. Livres Ancien Cours. Tournois. Chelins Courant. d'Irlande. de l'Armée. Sterling. Livres Parisis:
5 Chelins Courant 50		63 6 27 16 39 14 9	Chelins de New-York de la Jamaïque. Livres Ancien Cours Tournois. Francs. Chelins d'Irlande de l'armée Sterling. Livres Parisis.
39 Chelins d'Irlande 65	1	84 16 72 28 40 12	Chelins de New-York de la Jamarque. Livres Ancien Cours Tournois. Francs. Chelins Courant de l'Armée Sterling. Livres Parisis.
7 Chelins de l'Armée 20		27 9 81 8 15 17 27	Chelins de New-York. de la Jamaïque. Livres Ancien Cours. Tournois. Francs Chelins Courant. d'Irlande. Sterling. Livres Parisis.

Ta

9 Chelins Sterling		6 Chelins de New-York.
5		7 · · · · · de la Jamaïque.
3		4 Livres Ancien Cours.
5		6 · · · · · Tournois.
27	3	2 Francs.
9		O Chelins Courant.
12	7	3 ····· d'Irlande
27	2	8 ····· de l'Armée.
25	2	4 Livres Parisis.
27 Livres Parisis		Chelins de New-York.
24	3	5 · · · · de la Jamaïque:
18		Livres Accien Cours.
4		5 · · · · · Tournois.
81		0 Francs.
108		
288		
162	17	5 · · · · · de l'Armée.
24		5 · · · · Sterling.

Tableau de la valeur des différents Chelins et Livres ci-dessus énumérés, en Sous du Pays.

Le Chelin de New-York	vaut	15	Sous.
Le Chelin de la Jamaïque,	66	19_{21}	66
La Livre Ancien Cours,	66	20	66
La Livre Tournois,	"	224	66"
Le Franc actuel de France,	"	22 i	66
Le Chelin Courant,	66	24	- 66
Le Chelin d'Irlande,	66	24-8	66
Le Chelin de l'Armée,	. "	$\frac{24^{-8}}{25^{5}}$	66
Le Chelin Sterling,	"	$26\frac{2}{3}$	66
La Livre Parisis,	66	$26\frac{2}{3}$ $27\frac{2}{3}$, "

MONNAIE FÉDÉRALE DES ETATS-UNIS.

10 Mills	font	1	Cent.
10 Cents	""	1	Dime.
10 Dimes	"	1	Piastre.
10 Piastre	66	1	Aigle.

MONNAIES D'OR.

Monnaics.	Poids.		Poids. Valeur.									in in
	Gros.	Grains.		terli				rant		ncie our	8.	Pièces d'Angleterre
Le Souverain, * Le Demi-Souverain, La Guinée,	5 2 5	2‡ 13‡ 6	£ 0 1	8. 0 10	d. 0 0 0	1 0 1	2 11 3	$\frac{2\frac{9}{8}}{1\frac{1}{8}}$	26 13 28	13 6	d. 4 8 0	gleterr
La Demi-Guinée, Le tiers de Guinée,	2	15 18	0	10 7	6	0	11 7	4 8 91	14	0 0 6 0	8	e. de
La Portugaise, La demi-Portugaise, Le quart de Portugaise,	18 9 4	$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 12 \end{matrix}$	3 1 0	12 16 18	0 0 0	4 2 1	0 0 0	0	96 48 24	0	0	Portugal.
Le huitième de Por- tugaise,	2 6 11	6 18 6	012	9 7 5	0 0 0	0 1 2	10 10 10	0	12 36 60	0	0	
Le demi-Aigle, Le quart d'Aigle,	5 2	15 19 <u>‡</u>	10	2 11	6	$\tilde{1}$	5 12	6	30 15	0	0	d'Amér.
Le double Louis d'Or monnayé avant 1793 Le Louis d'Or monnayé	10	8	2	0	93	2	5	4	54	8	0	
avant 1793, La Pistole monnayée	5	4	1	0	445	1	2	8	27	4	0	de F
avant 1793,	4	4	0	16	$5\frac{1}{10}$	0	18	3	21	18	0	France
monnayée depuis 1792. La Pièce de 20 Francs	8	6	1		63	1	16	2	43	8	.0	6
monnayée depuis 1792 Le Doublon d'Espagne,.	17	. 0	0	16 7	370 03	0	18 14	6	21 89	14	0	ا م
Le demi-Doublon, · · ·	8	12	1	13	$6\frac{3}{10}$	1	17	3	44	14	0	Esp
Le quart de Doublon, Le huitième de Doublon.	2	6 3	0	16 8	$9\frac{1}{20}$	0	18 9	7₫ 3₽	22 11	7	6	Espagne.

Pour chaque Grain au-dessus ou au-dessous du Polds il sera alloué 21 pence pour les pièces d'Angleterre, de Portugal et d'Amérique ; et 21 pence pour les pièces de France et d'Espagne.

^{*} Cette pièce est nouvelle; son poids est fixé en Angleterre tel que marqué ci-dessus, et sa valeur est d'un Louis Sterling; mais le cours n'en a point été réglé par la loi ici, et cette pièce étant un objet de spérnition et de commerce pour les marchands du pays, la valeur en change presque tous les jours.

[†] Les Aigles et demi-Aigles américains monnayés avant 1834. valent £2 15s. et £1 7s. 6d. Ceux monnayés en 1834, et postérieurement valent les prix cités ci-haut.

Table des valeurs des grains pour les pièces d'or d'Angleterre, de Portugal et d'Amérique, pesées seules.

e. q.	Grains.	Grains.	Gratins.
1 0 2t 2 0 4t 3 0 6t 4 0 9 5 0 11t 6 1 1t 7 1 3t 8 1 6 9 1 10t 11 2 0t 12 2 3 13 2 5t	14 2 7± 15 2 9± 16 2 0 17 3 2± 18 3 4± 19 3 6± 20 3 9 21 3 11± 22 4 1± 22 4 3± 24 4 6 25 4 8± 26 4 10±	27 5 0‡ 28 5 3 29 5 5½ 30 5 7½ 31 5 9‡ 32 6 0 33 6 2½ 34 6 4½ 35 6 6 9 37 6 11½ 38 7 1½ 39 7 3₹	40 7 6 41 7 8‡ 42 7 10‡ 43 8 0‡ 44 8 3 45 8 5‡ 46 8 7‡ 47 8 9‡ 48 9 2‡ 50 9 4‡ 51 9 6₹ 52 9 9

Pièces d'Angleterre. de Portugal. d'Amér.

alloué e ; et

l que cours jet de ur en

alent

Table des valeurs des grains pour les pièces d'or de France et d'Espagne, pessors seules.

Grains.	8.	d.	Grains.	Grains.	Grains.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0	2. 2 4.4	14 2 6.8 15 2 9.0	27 4 11.4 28 5 1.6	40 7 4.0 41 7 6.2
3	ŏ	6.6	16 2 11.2	29 5 3.8	42 7 8.4
4	ŏ	8.8	17 3 1.4	30 5 6.0	43 7 10.6
5	Ŏ	11.0	18 3 3.6	31 5 8.2	44 8 0.8
6	1	1.2	1 19 3 53	32 5 10.4	45 8 3.0
7	1	3.4	20 3 8.0	33 6 0.6	46 8 5.2
8	1	5.6	21 3 10.2	34 6 2.8	47 8 7.4
9	1	7.8	22 4 0.4	35 6 5.0	48 8 9.6
10	1	10.0	23 4 2.6	36 6 7.2	49 8 11.8
11	2	0.2	24 4 4.8	37 6 9.4	50 9 2.0
12	2	2.4	25 4 7.0	38 6 11.6	51 9 4.2
13	2	4.6	26 4 9.2	39 7 1.8	52 9 6.4

Par acte du Parlement Provincial, passé le quatorze Avril mil huit cent huit, chapitre huit, dans les payements en Or au-dessus de £20 courant, l'Or pourra être pesé en gros; e'est-à-dire, la monnaie d'Or de la Grande-Bretagne, de Portugal et d'Amérique ensemble, à raison de 89s. par once troie; la monnaie d'Or de France et d'Espagne ensemble, à raison de 87s. 8½ par once; et il sera fait une déduction de la moitié d'un grain sur chaque pièce ainsi pesée en gros, comme compensation pour la perte qui en résulterait à celui qui reçoit le payement. La valeur de cette déduction est facile à trouver par les tables suivantes.

TABLE DE LA VALEUR DE L'OR DE LA GRANDE-BRE-TAGNE, DE PORTUGAL ET D'AMÉRIQUE, PESÉ EN GROS, A RAISON DE 89s. PAR ONCE.

Grains. Chelins. Pence. Farthings.	Gros. Louis. Chelins. Penee. Farthings. Décimales.	Onces. Louis. Chelins.	Livres. Louis.	Chelins.
1 0 2 0.9 2 0 4 1.8 3 0 6 2.7 4 0 8 3.6 5 0 11 0.5 6 1 1 1.4 7 1 3 2.3 8 1 5 3.2 9 1 8 0.1 10 1 10 1 11 2 0 1.9 12 2 2 2.8 13 2 4 3.7 14 2 7 0.6 15 2 9 1.5 16 2 11 2.4 17 3 1 3.3 18 3 4 0.2 19 3 6 1.1 20 3 8 2. 21 3 10 2.9 22 4 0 3.8 23 4 3 0.7 24 ft. un gros.	1 4 5 1.6 2 8 10 3.2 3 13 4 0.8 4 17 9 2.4 5 1 2 3 0.0 6 1 6 8 1.6 7 1 11 1 3.2 8 1 15 7 0.8 9 2 0 0 2.4 10 2 4 6 0.0 11 2 8 11 1.6 12 2 13 4 3.2 13 2 17 10 0.8 14 3 2 3 2.4 15 3 6 9 0.0 16 3 11 2 1.6 17 3 15 7 3.2 18 4 0 1 0.8 19 4 4 6 2.4 20 font une once.	1 4 9 2 8 18 3 13 7 4 17 16 5 22 5 6 26 14 7 31 3 8 35 12 9 40 1 10 44 10 11 48 19 12 ft. 1 liv.	1 53 2 106 3 160 4 213 5 267 6 320 7 373 8 427 9 480 10 534 11 587 12 640 13 694 14 747 15 801 16 854 17 907 18 961 19 1014 20 1068 21 1121 22 1174 23 1228 24 1281	8 16 4 12 0 8 16 4 12 0 8 16 4 12 0 8 16 4 12 0 8 16 4 12 0 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Ta en gi

123456789101122222233333111516171819221223344.

La pias
Le che
La pias
La pias
La pièc
La piè
depui
La piè
Tour

La pièc La pièc La pia L'Escal TABLE de la valeur de l'Or de France et d'Espagne pesé en gros, à raison de 87s. 8½ par once.

de nce , à de

ros, elui est

RE-

	5.00,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			-3 [, tta 0 a.							
Grains.	Chelins. Pence.	Farthings.	Gros.	Louis.	Pence.	Farthings.	Onces.	Louis.	Chelins.	Pence.	Livres.	Louis.	Chelins.	Pence.
123456789101121314515167181922122234	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 1 2 3 3 0 1 2 2 3 0 1 2 2 3 0 1 2 2 3 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 10 2 7 0 4 9 2 6 11	21 31 32 01 31 11 20 21 31 31 20 21 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 17 21 26 30 35	7 15 3 10 18 6 13 1 9 17 4 1iv	8½ 5 1½ 10 6½ 3 11½ 8 4½ 1 9½.	1 23 34 55 67 89 100 111 122 13 14 15 16 17 18 20 20 21 22 23 24	52 105 157 210 263 315 368 421 473 526 631 684 736 789 842 894 947 999 1052 1105 1157 1210 1263	12 5 17 10 2 15 7 0 12 5 17 10 2 15 7 0 12 15 7 0 12 15 7 0 10 2 15 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6060606060606060606060

MONNAIES D'ARGENT.

			Va	leur.	
Monnaies.		our		Anc o	ours.
	£	8.	d.	lbs.	8.
La piastre ou couronne d'Angleterre,	0	5	6	6	12
Le chelin d'Angleterre, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	1	1	6
La piastre américaine, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	5	0	6	0
La piastre française monnayée avant 1793,		5	6	6	12
La pièce de 6 livres, monnayée depuis 1792,		5	6	6	12
La pièce de 5 livres Tournois, monnayée					
depuis 1792		4	8	5	12
La pièce de France de 4 livres 10 sous					
Tournois	İ	4	2	5	0
La pièce de France de 36 sous Tournois		1	8	2	ŏ
La pièce de France de 24 sous Tournois, · · · ·		ĩ	ĭ	l i	Š.
La piastre d'Espagne,		5	ō	6	ñ
L'Escalin d'Espagne,		ĭ	ň	1	À
Li Escanti d'Espagne,	i	•	U		-2
	1			1	
	1				

TABLES DES POIDS.

POIDS DE TROIE.

24 Grains font 1 Gros. 20 Gros " 1 Once. 12 Onces " 1 Livre.

On se sert de ce Poids pour peser l'Or et l'Argent et les Pierres précieuses.

POIDS D'APOTHICAIRES.

20 Grains font 1 Scrupule.
3 Scrupules "1 Dragme.
8 Dragmes "1 Once.
12 Onces "1 Livre.

La Livre et l'Once du Poids d'Apothicaires sont les mêmes que celles du Poids de Troie; mais elles sont différemment subdivisées.

Ce Poids sert aux Apothicaires dans la composition de leurs Médecines; mais dans l'achat et la vente de leurs Drogues ils se servent du Poids qui suit.

POIDS D'AVOIR-DU-POIDS.

			1	Dragme,		27.34375	Grains	Troie.
16	[†] Dragmes	font	1	Once,		437.5	66	66
	Onces	"	1	Livre,		7000	46	66
28	Livres	66	1	Qrt. de Quinta	1=	34.027	Livres	66
4	Quarts	66	1	Quintal,	-	136.1	66	66
	Quintaux			Tonneau,	_	2722.2	- 66	66

Ce Poids sert a peser tous les Effets et Marchandises, la Viande, la Farine, le Pain, le Biscuit, et toutes autres Denrées quelconques vendues au Poids ; les Objets mentionnés au Poids de Troie exceptés.

La Livre d'Avoir-du-Poids; vaut 14 Onces, 11 Gros, et 16 Grains Troie; et la Livre Troie est égale à 13 Onces et 2145, Dragmes d'Avoir-du-poids. En sorte que l'Once Troie est plus forte que l'Once d'Avoir-du-poids; mais la Livre Troie est plus faible que la Livre d'Avoir-du-poids.

7560 est de Poids o Grains Onces Avoir-o Marc 1

Troie.

3 Gro 12 Pou 3 Pie 51 Ver

40 Per 8 Sta 3 Mil

Chaîne est de 4 dont ch

En H 4 Fall ou 595

En I Verges

> 30 *E* 11 P

11 M 55 M 35 M

1	Once Troie contient	480	Grains	Troie.
1	Once d'Avoir-du-poids	4371	"	66
	Livre Troie		66	66
	Livre d'Avoir-du-Poids		46	66
	175 Onces Troie font 192 C	nces d	Avoir-d	u-Poids.
	175 Livres Troie-144 I	ivres d	Avoir-	lu-Poids.

7560 Grains Troie font 1 Livre Poids de Marc. Cette Livre est de 16 Onces, l'Once de 8 Gros et le Gros de 72 Grains Poids de Marc. La Livre Poids de Marc est donc de 9216 Grains Poids de marc. On la divise aussi en 2 Marcs de 8 Onces chaque.—100 Livres Poids de Marc font 108 Livres Avoir-du-Poids ou 131½ Livres Troie: ou 16 Livres Poids de Marc font 21 Livres Troie.

400lbs. Poi is de Marc=432lbs. Avoir-du-Poids=525lbs. Troie.

TABLES DES MESURES.

nêmes

nment

e leurs

rogues

Troie.

"

"

ses, la

s Den-

nés au

, et 16 t 2| | 4,

oie est

Troie

MESURES DE LONGUEUR.

MESURES ANGLAISES.

			1	Grain d'Org	e,	_	0.3121	Pouce	s F.
3	Grains d'Or	ge font	1	Pouce,			0.9363	66	**
12	Pouces	"	1	Pied,		_	11.2359	66	66
3	Pieds	"	1	Verge,			33.7079	**	66
51	Verges	66		Perche,		_	15.4494	Pieds	Fra.
40	Perches	**	1	Stade, (Fur	long)	_	617.9775	"	66
8	Stades	"	1	Mille,			4943.8202	66	66
3	Milles	66	1	Lieue,			4831.4607	44	"

Dans le Mesurage des Terres on se sert en Angleterre d'une Chaîne, que l'on met au nombre des Mesures : cette Chaîne est de 4 Perches ou 66 Pieds, et elle est divisée en 100 Mailles, dont chacune est par conséquent de 7_{100}^{-92} ou 7.92 Pouces.

En Ecosse 37.2 Pouces Anglais font 1 Ell, 6 Ells 1 Fall, 4 Falls 1 Chaîne, 10 Chaînes 1 Stade, et 8 Stades 1 Mille ou 5952 Pieds Anglais.

En Irlande '7 Verges font une Perche: par conséquent 2240 Verges font 1 Mille.

30 Ells d'Ecosse font 31 Verges Anglaises.

11 Perches d'Irlande font 14 Perches Anglaises.

11 Milles d'Irlande font 14 Milles Anglais. 55 Milles d'Ecosse font 62 Milles Anglais.

35 Milles d'Ecosse font 31 Milles d'Irlande.

MESURES FRANÇAISES.

			1	Ligne		0:089	Pouces	Anglais.
12	Lignes	font	1	Pouce	=	1.068	"	66
	Pouces	. "	1	Pied		12.816	66	66
	Pieds	66	1	Toise		6.408	"	"
	Toises	66	1	Perche		19.224	66	66
	Perches	44	1	Arpent		192.24	66	66
	Arpents	"		Lieue	=	16148.16	c 6	66

	Pieds Français		1068 Pieds Anglais.
1375	Perches Françaises	font	1602 Perches Anglaises.
	Arpents	foni	801 Chaînes.
5500	Lieues Françaises	font	5607 Lieues Anglaises.
801	Perches d'Irlande	font	875 Perches Françaises.

La Lieue Anglaise étant de 15840 Pieds Anglais, et la Lieue Française du Canada étant de 15120 Pieds Français ou 16148.16 Pieds Anglais, la différence entre la Lieue Française et la Lieue Anglaise est de 308.16 Pieds Anglais, ou 288 48 Pieds Français.

MESURE DE SUPERFICIE.

MESURES ANGLAISES.

144 P	ouces	quarrés j	font		Pouce of Pied qu		_	0.876 0.876	7 Pieds	
9 P	Pieds	•	66	1	Verge,		_	7.890)4 "	, "
301 V	erges		66	1	Perche			238.688	11 "	64
	erches	,	46	1	Vergée	(Rood))—	29.467	3 Perche	8.
4 V	ergées	3	66	1	Acre,			1.178		ts.
	cres		44		Mille,	1.	-	754.362	9 6	v 66
9 N	filles		"	1	Lieue,		-	0.962	2 Lieues	Frs.
4356	Pieds	quarrés	font	1	Chaîne	quarré	e,	et 10	Chaînes	font 1
Acre.							_			

Un pouce, un Pied, etc., quarré, c'est un Pouce, un Pied, etc., en longueur et en largeur.

MESUEES FRANÇAISE.

144	Pouces quarrés	font		Pouce quarré, Pied quarré,	_	0.007921 1.140624	pds.	ang.
	Pieds	66		l'oise,	-	41.062464	46 .	. 84
9	Toises	66	1 I	Perche,		369.562176	66	66
100	Perches	6.6	1 /	Arpent,	36	3956.2176	661 -	. 66
	Arpents	66		Lieue,	_	1.039	lieues	ang.

			39		
1	62500	Pieds Français	font	71289	Pieds Anglais.
	1890625	Perches Françaises	font	2566404	Perches Anglaises.
Amalaia	7562500	Perches Françaises	font	641601	Chaînes Anglaises.
Anglais.		Arpents	font	641601	Acres Anglais.
66	121	Acres d'Irlande	font	196	Acres anglais.
"		Acres d'Irlande		1225000	Arpents.
"		Acres d'Irlande	font	1225	Acres d'Ecosse.
"	3025	Acres d'Ecosse	font		Acres Anglais.
"		Acres d'Ecosse	font		Arpents.
		MESURE	S DE	DRAP.	
is.		21 Pouces An	glais	font 1	Nail.
glaises.		4 Nails			Quart.
alainas		4 Quarts		" 1	Verge.
glaises.				" 1	Aune Anglaise.
nçaises.		5 Quarts 5 Verges			Aunes.

ais, et la

Français le Fran-

lais, ou

ces

ches. pents.

ues Frs.

s font l , etc., en

ang.

ieues ang.

abo

Frs.

Frs.

MFSURES DE SOLIDES.

MESURES ANGLAISES.

1728 Pouces cubes font 1 Pied cube ou solide. 27 Pieds "1 Verge.

Un Pouce, un Pied, etc., cube ou solide, c'est un Pouce, un Pied, etc., en longueur, largeur et profondeur.

MESURES FRANÇAISES.

1728 Pouces cubes font 1 Pied cube. 216 Pieds "" 1 Toise.

1000 Pieds cubes Français font 1218.186432 Pieds cubes Anglais.

1000 Toises cubes font 9745.491456 Verges Cubes.

MESURES DE LIQUIDES.

MESURES DE VIN D'ANGLETERRE.

2 2 42 63 84	Gallons Gallons	66	11111111	Pinte Pot Gallon Tierçon Barrique Tonne	=======================================	57.75 115.5 231. 5.614583 8.421875 I1.22916	Pouces "" "" Pieds "" ""	cubes.
126	Gallons Gallons		1	Pipe		16.84375		

On se sert en Angleterre, pour la Bière et l'Aile, d'un autre Gallon qui contient 282 Pouces cubes.

La Chopine d'Ecosse contient 103.404 Pouces cubes: 2 Chopines font 1 Pinte, et 4 Pintes font 1 Gallon.

tie

Ba

Se

il e l'a

tie

la Vi

gla

su

Et

 $\mathbf{2}$

4

4

Cł

sta

en

tre

su

ch

4

Le Gallon d'Irlande contient 217.6 Pouces cubes.

MESURES DE CAPACITÉ.

MINOT DU CANADA.

96 Pouces cubes Français = 116.94589 Pouces cubes Anglais, font 1 Pot.

20 Pots = 2338.91795 Pouces cubes Anglais, font 1 Minot. Le Minot du Canada devrait être comme ci-dessus: mais il est bon de remarquer que lorsque, en 1795, la Chambre d'Assemblée a recommandé des Étalons des Poids et Mesures pour la Province, elle a recommandé entre autres:-" Un "Minot de 18½ Pouces Mesure Anglaise de Diamètre sur

"8.701 Pouces de Profondeur, qui contiendra 1920 Pouces "Français cubes, égaux à 2338.917 Pouces Anglais cubes.—

"Un Demi-Minot de 124 Pouces Anglais de Diamètre sur " 9.529 Pouces de Profondeur, qui coutiendra 1169.4585

" Pouces Anglais cubes. "?

D'après ces Dimensions le Minot contient 2338.85073 Pouces cubes Anglais, et le Demi-Minot 1169.38423 Pouces cubes Anglais. De sorte qu'en se servant du Minot du Pays on y perd sur le minot tel qu'il devrait être, et en se servant du Demi-Minot, qui est la Mesure la plus généralement employée, on y perd plus du double de ce que l'on ferait avec le Minot.

2338.91795 Pouces. Le minot devrait contenir 2330.85073 Le Minot d'Etalon contient Deux Demi-Minots d'Etalon contiennent 2338.76846

MINOTS ANGLAIS OU DE WINCHESTER.

]	L	Chopine	_	33.6003	Pouce	s cub.
2	Chopines f	ont	1	Pinte		67.2006	"	"
2	Pintes	"	1	Pot		134.4013	66	"
2	Pots	"	I	Gallon		268.8025	66	66
8	Gallons	"	1	Minot	9000	2150.42	66	66
8	Minots	"	1	Setier (Quarter)		9.9556	Pieds c	ubes.
				ahaatan dait amai				

Le Minot de Winchester doit avoir 18½ Pouces de Diametre sur 8 Pouces de Hauteur, et doit par conséquent contenir, comme ci-dessus, 2150.42 Peuces cubes.

Le Minot d'Irlande contient 2178 Pouces cubes.

La Mesure dont on se sert en Ecosse est le Firlet; il contient 4 Pecks et le Peck 4 Lippies; 4 Firlets font 1 Boll, 16 Bolls 1 Chalder.—11 y a deux Firlets, un pour le Blé, le Seigle, les Pois, les Fèves, le Sel et les Graines de Fourrage: il contient 21½ Chopines d'Ecosse ou 2197.335 Pouces cubes; l'autre pour l'Orge, l'Avoine, les Fruits et les Patates, contient 31 Chopines ou 3205.524 Pouces cubes.

Les Poids et Mesures établis par la Loi dans ce Pays sont la Livre Troie, la Livre Avoir-du-Poids, le Gallon Mesure de Vin, le Minot du Canada, le Pied Français et la Verge Anglaise. On peut néanmoins se servir des autres Poids et Mesures par convention; c'est-à-dire, de ceux dont il y à des

Etalons.

au-

An-

inot.

ris il

l'Asures 'Un sur uces es. sur 4585

5073 uces Pays vant

em-

ec le

ces.

cub.

66

"

bes.

ètre

nir.

MESURES IMPÉRIALES.

	1	Chopine		34.65925	Pouces	cub.
2 Chopines f	ont 1	Pinte		69.3185	66	46
4 Pintes	" 1	Gallon		277.274	66	66
2 Gallons	" 1	Quart de M	inot =	554.548	66	66
4 Quarts					46	•6
8 Minots	" 1	Setier (Qur	(t.), =17	7745.536	"	66
Par un Ac	te du	Parlemen	t Impéri	ial de la 5	ie. Geo.	IV.
Chap. 74, qu	ai dev	ait avoir eff	et le le	r. Janvier,	1826,	il est
statué que le	s Me	sures ci-des	sus seroi	nt à l'aven	ir les s	eules
employées ta						
tres Objets of	ni se	détaillent à	la Mesu	re.		

115500 Gallons Mesure Impériale font 138637 Gallons Me-

sure de Vin.

141000 Gallons même Mesure font 138637 Gallons Mesure

537605 Gallons même Mesure font 554548 Gallons de Winchester.

413616 Gallons même Mesure font 138637 Gallons d'Ecosse. 108800 Gallons même Mesure font 138637 Gallons d'Irlande.

94 Gallons mesure de vin font 77 gallons mesure de bière

107521 Gallons même mesure font 92400 Gallons Winchester. 4924 Gallons même Mesure font 1375 Gallons d'Ecosse.

1088 Gallons même Mesure font 1155 Gallons d'Irlande.

107521 Gallons Mesure de Biere font 112800 Gallons Winchester.

17234 Gallons même Mesure font 5875 Gallons d'Ecosse.

544 Gallons même Mesure font 705 Gallons d'Irlande.

1654464 Gallons de Winchester font 537605 Gallons d'Ecosse. 87040 Gallons même Mesure font 107521 Gallons d'Irlande.

6800 Gallons d'Ecosso fent 25851 Gallons d'Irlande.

8000 Minots du Canada font 8701 Minots de Winchester. 887276800 Minots du Canada fent 935540221 Minots Impériaux.

79200000 Minots du Canada font 85049111 Minots d'Irlande. 125562000 Minots du Canada font 133648603 Firlots de Blé. 1282209600 Minots du Canada font 935540221 Firlots d'Orge. 554548 Minots de Winchester font 537605 Minots Impé-

554548 Minots de Winchester font 537605 Minots Impériaux.

Déc

Cub

côté

Liti

cub

de l

mu

Le l

1 1

 \mathbf{L}

L

108900 Minots de Winchester font 107521 Minots d'Ir-

439467 Minots de Winchester font 430084 Firlots de Blé. 801381 Minots de Winchester font 537605 Firlots d'Orge. 136125 Minots Impériaux font 138637 Minots d'Irlande.

2197335 Minots Impériaux font 2218192 Firlots de Blé. 801381 Minots Impériaux font 554548 Firlots d'Orge.

I46489 Minots d'Irlande font 145200 Firlots de Blé. 267127 Minots d'Irlande font 181500 Firlots d'Orge.

104635 Firlots d'Orge font 152644 Firlots de Blé.

MESURE DE TEMPS.

60 Secondes font 1 Minute.

60 Minutes " I Heure.

24 Heures " 1 Jour. 7 Jours " 1 Semaine

7 Jours "1 Semaine. 4 Semaines "1 Mois.

52 Semaines, un Jour et 6 Heures, ou 365 Jours et 6 Heures font une année.

Les mois ont, les uns 31 Jours, les autres 30, et un en a 28 et quelquefois 29. Ceux qui ont 31 Jours sont Janvier, Mars, Mai, Juillet, Août, Octobre et Décembre; ceux qui en ont 30 sont Avril, Juin, Septembre et Novembre, et celui qui en a 28 est Février, qui tous les quatre ans en a 29, à cause des 6 Heures que l'Année a de plus que les 365 Jours: ces 6 Heures, au bout de quatre Ans font, 24 Heures ou un Jour. On appelle cette Année-là Bissextile.

SYSTÈME MÉTRIQUE OU DÉCIMAL DE FRANCE.

Le Système Métrique est ainsi appelé parce qu'il est fondé sur le Mètre, qui est la dix-millionième partie du Quart du Méridien terrestre, l'Unité principale des Mesures Linéaires est le premier Elément de ce Système. Le Mètre se divisse en dix parties que l'on appelle Décimètres: le Décimètre en dix parties que l'on appelle Centimètres, et le Centimètre en dix parties que l'on appelle Millimètres. Dix Mètres font un Décamètre; 10 Décamètres font un Hectomètre; 10 Hectomètres font un Kilomètre, et 10 Kilomètres font un Myria-mètre.

ester. s Im-

ande. e Blé. Orge. mpé-

d'Ir-

e Blé. Orge. ande. Blé.

ande. lé. e.

et 6

28 et lars, nont et des es 6

our.

ondé et du uires viss e en

e en e en font lecriaL'Unité des Mesures de Superficie est un Quarré ayant le Décamètre pour côté; or lui donne le nom de Are.

L'Unité des Mesures de Solidité, relatives au Bois, est un

Cube ayant pour côté le Mètre: on l'appelle Stère.

L'unité des Mesures de Capacité est un cube ayant pour côté la dixième partie du Mètre : on lui a donné le nom de Litre.

L'Unité des Poids, appelée Gramme, est un Centimètre cube d'eau distillée, pesée dans le vide, et à la température de la Glace fondante.

L'Are, le Stère, le Litre et le Gramme se subdivisent et se multiplient comme le Mètre.

MESURES LINÉAIRES.

•		
	Pouces Anglais.	Pouces Français.
Le Millimètre vaut	0.039371	0.036864
Centimètre "	0.39371	0.368642
Décimètre "	3.9371	3.686423
Mètre	39.371	36.864232
Décamètre "	393.71	368.642222
Hectomètre "	3937.1	3686.423220
Kilomètre "	39871.	36864.232209
Myriamètre	393710.	368642.322097
	3 Pieds 0.864 Pouce	
l Mètre vaut	1 Verge 3.371 Pouce	as Anglais
	1 Amont 7 Derohas 1	Pied 2.423 Pouces Frs.
1 Hectomètre vaut	19 Perches 14 Pieds 7.	1 Douges Angleis
	19 Perches 14 Pieus 7	1 Pouces Augus.
l Kilomètre vaut	17 Arpents 12 Pieds 0	.232 Pouces Français.
	4 Stades 38 Perches 1	3 Pieds 11 Pouces Ang. 6 Perches 12 Pieds 2.322
1 Myriamètre vaut 7920 Hectomètre115344 Hectomètre	Anglais. s font 39371 Chaînes	
1 Pov	ice Anglais,	0.0254 Mètres.
1 Pie	d	0.3048 "
		0.9144 "
	che, =	5.0291
		01.1633
		99.3063 "
. 1. 110	ue, (482	27.9190
1 Por	oe Français	0.0271 Mètres.
	de season l	0.3255
	SO 0 2 2 2 2	1.9531 ""
1 Per		5.8593
		0.0000
I Ar	pent \	58.5934 "

4921.8440

Lieue

1	Nail,	ſ	0.05715	Mètres.
1	Quart.	1	0.22859	**
1	Verge,	= {	0.91438	. 66
1	Aune Anglaise,	į	1.14297	66

MESURES AGRAIRES.

Le Milliare Centiare Déciare Arc Décare Hectare Kilore	10 Décimèt 1 Mètre quantité 10 Mètres quantité 10 Décamè 10 Décamè	uarrés,	és, vaut	. 0	Anglaises. .00395 .03953
Centiare Déciare Arc Décare Hoctare	1 Mètre quality 10 Mètres quality 1 Décamè	uarrē, Juarrés,	(1)	_	
Déciare Arc Décare Hoctare	10 Mètres d 1 Décame	uarrés,			
Arc Décare Hectare	1 Décamè	warren,			.39538
Décare Hectare					.95387
Hectare					.53871
			l'es,		.38711
	10 Trestome	tre quar	10,		.87113
		tres qua	12 000		.71138
Myriare (1 AMomet	re quarré		33930	11190
					Françaises.
	Le Milliare,	vaut	0.00		
	Centiare,	"	0.02	912	
	Déciare,	64	_0.29	127	
	Are,	- 66	2.91	274	
	Décare.	66	29.12	747	
	Hectare,	66	291.27	478	
	Kilare,	48	2912.74	780	
	Myriare,	66	29127.47	806	
1 Are vaus	2 Perch 1 2 Acres	rançais. 75 Perc	Pieds 108 hes 11 (5.162 Pouc Verges 6 1	es quarrés Pieds 56.41
1 Hectare vaut	2 Arper	Pouces Ar ats 91 Per Pouces Fra es 18 Pe	nglai rches 2 T ançais. erches 21	oises 17 I	Pieds 4.164 Pieds 97
1 Myriare vaut	7 291 Ar	Pouces Appents 27 28.443 Po	Perches	4 Toises nçais.	10 Pieds
1 Pouc	e quarré Ang	lais.	0.00645	Milliares.	
1 Pied,			0.92899	**	
1 Verg			8.36088	66	
1 Perol	he.		0.25292	Ares.	
1 Verg		= {	10.11667	"	
1 Acre,		1	40.46667		
l Mille				Kylares.	
l Lieu		1		Myriares.	

1	Pouce quarré	Français,	=	0.0074	Milliares.
1	Pied,		=	1.0596	
1	Toise,		=	3.8146	Centiares.
I	Perche,	•	=	3.4332	Déciares.
1	Arpent,		=	3.4332	Décares.
1	Lieue,				Myriares.

MESURES DE SOLIDITÉ POUR LES BOIS.

monines.

Pouces quarrés ds 56.41

s 4.164 eds 97

Pieds

		. 1	Pieds	cubes Anglais.
Le Millistère	[1]	Décimètre cube,	vaut	0.03531
Centistère	10	Décimètres cubes,	66	0.35317
Décistère	100	Décimètres cubes,	. 66	3.53171
Stère	1 1	Mètre cube.	"	35.31714
Décastère =	10	Mètres cubés	66	353.17145
Hectostère	100	Mètres cubes,	66	3531.71458
Kilostére		Décamètre cube,	66	35317.14586
Myriastère		Décamètres cube	s, "	353171.45869
	#*****			s français.

			Pieus cuces irai
Le	Millistère	=	0.02899
	Centistère	=	0.28991
	Décistère	=	2.89915
	Stère	=	28.99157
	Décastère	==	289.91577
	Hectostère	=	2899.15771
	Kilostère	=	28991.57710
	Myriastère	=	289915.77102

1 Stère vaut

28 Pieds 1713.445 pouces cubes français.

1 Décastère vaut

1 Décastère vaut

1 Toise 73 pieds 1582.452 pouces cubes français.

I Pouce cube anglais	0.0164 Millietères.
1 Pied	28.3149 "
1 Verge	764.5012 "
1 Pouce cube français	0.0199 "
1 Pied	34.4928 "
1 Toise	7450.4398 "

MESURES DE CAPACITÉ.

	Pouces cubes anglais.
	ntimètre cube vaut 30.061028
Centilitre 10 Ce	ntimètres cubes 0.610280
	A' A C 100000
	cimètre cube — 61.028028
	cimètres cubes — 610.280280
	cimères cubes — 6102.802806
	etre cube — 61028.028061
	etres cubes — 610280.280618
Myrianite (10 Mi	Pouces cubes français.
Le Millifitre	0.050097
Centilitre	0.500974
Décilitre .	5.009744
Litre	50.097445
Décalitre =	500.974452
Hectolitre	5009.744523
Kilolitre	50097.445233
Myrialitre -	500974.452339
(0.29)	951 Pintes Mesure d'Ecosse.
0.80	556 ——Mesure de Bière.
0.88	Mesure Impériale. Mesure de Winchester.
1 litre vaut $\begin{cases} 0.36 \\ 0.96 \end{cases}$	081 — Mesure de Winchester.
1.0	568 ——Mesure de Vin.
1.19	
$\begin{cases} 0.73 \end{cases}$	
2.10	
2.0	
1 Décalitre vaut. $\left\{\begin{array}{c} 2.2 \\ 2.2 \end{array}\right\}$	704 Wiesure Imperiale.
2.6	
2.80	
	38 Firlots d'Orge.
	993 Minots du Canada.
	513 Minots Mesure Impériale.
2.7	774 Firlots de Blé.
2.8)20 Minots d'Irlande.
2.8	380 Minots de Winchester.
1 Setier de Vin	0.2366 Litres.
1 Chopine —	0.4731
1 Pinte —	0.9463
1 Pot	1.8926
1 Gallon —	3.7851
1 Tiercon ==	158.9761
	238,4642
1 Barrique —	
	317.9523 ———
1 Pipe —	476.9284
1 Tonneau	953.8568 ——

e. hester.

ester.

1 Chopine de Winchester 1 Pinte 1 Pot 1 Gallon 1 Minot 1 Setier 1 Chopine de Winchester 1 1.1011 2.2023 4.4046 35.2366 281.8928	
1 Pot 1 Gallon 2.2023 —— 4.4046 —— 1 Minot 35.2366 ——	
1 Minot 35.2366 ——	
1 Setion 981 8998	
1 Chopine Impériale 0.5679 Litres.	
1 Pinte 1.1358 ——	
1 Gallon 4.5434 ———	
1 Quart de Minot 9.0868 ——	
1 Minot 3.6347 Décalitres.	,
1 Setier 2.9078 Hectolitres	j.

POIDS.

Grains Trove.

Le Milligramme Centigramme	vau				,	
				Troi	e.	
Gramme		15.4440	lbs.	02.	gros.	grains.
		154.4402	0	0	6	10.4402
Hectogramme		1544.4023	0	3	4	8.4023
Kilogramme	-	15444.0234	2	8	3	12.0234
Myriagramme		154440.2344	26	9	15	0:2344

Avoir-du-Poids.

			lbs.	02.	dragmes
1	Gramme	-	0		0.5648
1	Décagramme	=	0	0	5.6481
	Hectogramme		0	3	8.481
	Kilogramme	=	2	3	4.81
	Myriagramme	_ =	22	1	0.1

10 Myriagrammes font 56481 Dragmes.10 Myriagrammes font 1 Quintal 3 Quarts 24 livres 10 onces I Dragme.

200 Myriagrammes font 1 Tonneau I9 Quintaux 1 Quart 16 livres 9 onces 4 Dragmes.

1	Grain Troie	=	0.0647	Grammes.
1	Gros	-	1.5540	
1	Scrupule	-	1.2950	
1	Dragme		3.8850	
1	Once	-	31.0800	
	Livre	=	372.9598	

1	Dragme Avoir-du-Poids	=	1.7705	Grammes.
	Once	=	28.3281	
1	Livre	==	453.2498	
1	Quart de Quintal	=	12690.9934	
	Quintal	=	50763.9737	
1	Tomieau	=	1015279.4743	

MONNAIES.

L'Unité Monétaire est une Pièce d'Argent du Poids de cinq grammes, contenant neuf dixièmes d'argent pur et un dixième d'alliage. On lui a donné le nom de Franc. Le Franc se divise en 10 décimes, et le décime en 10 centimes.

		Gran	nmes	Grains		Troie.
10.01		Centime				
10 Centimes fon		Décime		0.5	=	7.7220
10 Décimes —	- 1	Franc	-	5.	=	77.2201

SYSTÈME USUEL OU BINAIRE.

Ce nouveau systême est fondé sur le systême Métrique: seulement, au lieu de diviser les poids et mesures par 10, comme dans le systême Métrique, on les divise par 2, 4, 8, etc.; et au lieu de la nouvelle nomenclature, on emploie les noms des anciens poids et mesures, en y ajoutant le terme Usuel. Ainsi le demi-kilogramme est appelé la livre usuelle, le double du mètre s'appelle la toise usuelle.

POIDS.

Poids Usuels.	Poids de Troie.							
		Grammes.	l	bs.	oz.	Gros.	Grains.	
Le Kilogramme	=	1000	=	2	8	3	12.023	
La Livre Usuelle	==	500	=	1	4	1	18.012	
La Demi-Livre	=	250	=		8	0	21.006	
Le Quarteron	=	125	=		4	0	10.503	
Le Demi-Quarteron	==	62.5	=		2	0	5.251	
L'Once	=	31.25	=		1	0	2.626	
La Demi-Once	=	15.625	=			10	1.313	
Le Quart d'Once		7.8125	==			5	0.656	
Le Gros	-	3.90625	=			2	12.328	

Le Be

mmes.	Poids Usuels. Poi	ds d'Avoi	r-du-poids.
		lbs. oz	dragmes.
	Le Kilogramme	123	4.810
	La Livre Usuelle	111	10.405
	La Demi-Livre	0 8	13.202
	Le Quarteron	0 4	6.601
	Le Demi-Quarteron =	0 2	3.301
	L'Once	0 1	1.650
	La Demi-Once	0 0	8.825
	Le Quart d'Once	0 0	4.413
le cinq	Le Gros	(0 0	2.206
ixième			

anc se

Troie. 0.7722 7.7220 7.2201

rique :
par 10,
b, etc.;
noms
Usuel.
lle, le

rains. 12.023 18.012 21.006 10.503 5.251

2.626 1.313

0.656

2.328

MESURES LINEAIRES.

Mesures Usuelles.	D	lesure A	nglaise.
	Mètres.	Pieds.	
La Toise Usuelle	(2.	6	6.742
Le Pied —	0.3	1	1.1236
Le pouce —	0.027	0	1.0936
L'Aune Usuelle	1.2	3	11.2452
La Demi-Aune	0.6	3	11.6226
Le Quart d'Aune =	0.3 =	10	11.8113
Le Demi-Quart d'Aune	0.15	0	5.9056
Le Seizième d'Aune	0.075	Ö	2.9528
Le Tiers d'Aune	0.4	ĭ	3.7484
Le Sixième d'Aune	0.2	Ō	7.8742
Le Douzième d'Aune	0.1	(ŏ	3.9371
Mesures Usuelles.	1	Mesure F	rançaise.
		Pouces	
La Toise Usuelle	6	1	8.7416
Le Pied	1 1	0	3.4569
Le Pouce —	0	1	0.2881
L'Aune Usuelle	3	8	2.8449
La Demi-Aune	1	10	1.4225
Le Quart d'Aune	$= \{ 0$		0.7112
Le Demi-Quart d'Aune			6.3556
Le Seizième d'Aune	0		9.1778
Le Tiers d'Aune	0 1		8.9483
Le Sixième d'Aune	Ō		4.4742
Le Douzième d'Aune	(ŏ		8.2371

MESURE DE CAPACITÉ.

Le Boisseau Usuel = 12½ Litres = 0.3262 Minot du C. Le Litron Usuel = 7½ Décilitres = 0.2064 Gal. de vin. Avec les Demis et les Quarts en proportion.

ANCIENNES MESURES DE CAPACITÉ.

40	Pouces cubes for	t 1	Litron.
16	Litrons	- 1	Boisseau.
		- 1	Minot.
	Minots	1	Mine.
	Mines	1	Setier.
	Setiers.	1	Muid.

l'on dans et le cim

rédi

Il y a des objects qui ne se détaillent ni au poids ni à la Mesure, mais seulement au nombre, comme suit :--

12	font	-	1	Douzaine.
12	Douzaines ou 144		1	Grosse.
	Grosses ou 1728		1	Grande Grosse
100	font	-	1	Cent ordinaire.
120	10,34		1	Grand Cent.
10	Cents			Millier.

Il y a d'autres objets dont le Poids, la Mesure ou la Quantité est réglée par la loi ou la coutume, tels que les suivants:

11	te est réglée par la lo	i ou la cou	iume, te	is que les suivants
1	Main de Papier est d	le 24	Feuille	g -
1	Rame	20	Mains.	
1	Balle	10	Rames.	
1	Voie (Chaldron)de C	Charbon 36	Minots	du Canada
1	Pipe de Chaux	12	Minots	du Canada.
1	Quart de Lard ou de			Avoir-du-poids.
	Quart de Farine	196	Livres	
1	Botte de Foin	15	Livres	Poids Français.
1	Botte de Paille	12	Livres	roids Français.
1	Corde de Bois	. 8	Pieds F	rançais de longueu
	•	4: 1		hauteur.

DE L'ÉVALUATION DES FRACTIONS.

Evaluer une fraction, c'est trouver la valeur d'une fraction en une dénomination plus basse que celle à laquelle appartient cette fraction. Or, cela se fait en multipliant le numérateur de la fraction par le nombre qui exprime combien d'Unités de la dénomination suivante plus basse sont contenues dans la dénomination à laquelle appartient la fraction, et divisant le produit par le dénominateur de la fraction; s'il y a un reste après la division, on le multiptie par le nombre qui exprime combien cette dernière dénomination contient d'Unités de la suivante, et on divise le produit par le même dénominateur, et ainsi de suite, et tous les différents quotients donneront la valeur de la fraction.

Pour les fractions décimales, on multiplie les décimales et l'on sépare au produit autant de décimales qu'il y en avait dans la fraction, et l'on continue l'opération sur les décimales et les différents entiers qui restent après la séparation des décimales donnent la valeur de la fraction.

Quant aux décimales périodiques, le plus simple est de les réduire en fractions ordinaires, et d'opérer ensuite comme ci-

dessus.

EXEMPLES.

1. Combien font les 187 d'un Louis?

Rép. 15 chelins 7 Pence.

2. Combien font les 0.96875 d'une li vre avoir-du-poids?

.96875 16 581250 96875 Onces 15.50000 16

Dragmes 8.00000 Rép. 15 Onces 8 Dragmes.

3. Combien sont les 4 d'une Guinée?
Rép. 18 chelins 8 Pence.

4. Combien sont les 3 de la Moidore?

Rép. £1.

à la

Quanants :

is. gueur

ds.

pparuménbien ontection, ; s'il

; s'il mbre ntient nême quo-

- 5. Combien sont les 0.3756 d'un Louis?
 Rép. 7 chelins 6.144d.
- 6. Combien sont les 0.875 d'un Doublon?
 Rép. £3 5s. 21d.
- 7. Combien font les Ar d'un acre?
 Rép. 1 Vergée 32 Perches 22 Verges.
- 8. Combien font les 0.23 6 d'un acre?
 Rép. 37 Perches 24 Verges 64 Pieds.
- 9. Combien sont les 0.5625 d'un quintal ? Rép. 2 Quarts 7 Livres.
- Quel est le tiers et demi d'une Guinée ?
 Rép. 11s. 8d.

PROBLÈME.

Réduire une Fraction d'une Dénomination en une Fraction d'une Dénomination plus haute ayant la même valeur.

REGLE.—Multipliez le dénominateur de la fraction donnée par le nombre qui exprime combien la dénomination demandée contient d'Unités de la dénomination donnée; la fraction qui en résultera, réduite à sa plus simple expression si elle en est susceptible, sera la fraction requise.

Si la fraction est une fraction décimale, divisez-la par le nombre qui exprime combien la dénomination demandée contient d'Unités de la dénomination donnée; le quotient donnera la fraction décimale demandée.

EXEMPLES.

1. Réduisez # d'un penny en une fraction de louis.

Comme 240 pence font 1 louis, multipliez le dénominateur 6 par 240, ce qui vous donnera 1440, et vous aurez la fraction $\frac{1}{140} = \frac{1}{288}$. En effet les $\frac{1}{8}$ d'un penny égalent $\frac{1}{288}$ d'un louis.

- 2. Réduisez 0.72 d'un penny en une fraction de louis. Rép. 0.72 divisés par 240 = 0.003 d'un louis.
- 3. Réduisez † d'un Gros en une fraction de livre troie. Rép. 100.
- 4. Réduisez 0.576 d'un grain en une fraction de livre troie. Rép. 0.0001.

5. de q

6

7.

8.

9. Moid

10 avoi

LA nomi

Lo haute dant haute cende

10

haute dique une rédui ajout et 6 d louis, nomb a end aurez

ıéduı font 1 1992 5. Réduisez 4 d'une once avoir-du-poids en une fraction de quintal.

Rép. Rép. 6. Quelle partie d'un louis est le quart d'une Guinée?

- 7. Quelle partie d'un doublon est le tiers d'une Moidore?

 Rép. 10.
- 8. Quelle partie d'une guinée sont 0.6 d'un louis?

 Rép. 0.5 71428.
- 9. Quelle partie d'une portugaise sont les 0.375 d'une Moidore?

Rép. 0.140625.

10. Quelle partie d'un quintal sont les 0.672 d'une once-avoir-du-poids?

Rép. 0.000375.

DE LA RÉDUCTION.

LA REDUCTION enseigne à amener les nombres d'une dénomination en une autre sans en changer la valeur.

Lorsque les nombres sont réduits d'une dénomination plus haute en une plus basse, cela s'appelle Réduction descendante; mais lorsqu'on les amène d'une plus basse à une plus haute, cela s'appelle (quoiqu'improprement) Réduction ascendante.

RÈGLE.

1°. Pour réduire un nombre d'une dénomination plus haute en une plus basse, multipliez-le par le nombre qui indique combien d'Unités de la dénomination plus basse en font une de la dénomination plus haute, et si dans le nombre à réduire il y a quelques Unités de la dénomination plus basse, ajoutez-les au produit. Si, par exemple, vous avez 8 louis et 6 chelins à réduire en chelins; comme 20 chelins font 1 louis, multipliez 8 par 20, qui vous donneront 160, qui est le nombre de chelins que contiennent 8 louis; mais comme il y a encore 6 chelins outre les 8 louis, ajoutez 6 à 160 et vous aurez 166 chelins, qui valent 8 louis et 6 chelins; s'il fallait réduire le même nombre (£8 6s.) en pence, comme 12 pence font 1 chelin, multipliez 166 chelins par 12 et vous aurez 1992 pence, qui valent encore 8 louis et 6 chelins.

erges.

Pieds.

ivres.

d'une

onnée on dee ; la ession

oar le andée otient

ateur action louis.

louis. .

troie.

2°. Pour amener un nombre d'une dénomination plus basse à une plus haute, divisez-le par le nombre qui exprime combien d'Unités de cette dénomination font une Unité de la dénomination plus haute, et posez le reste; divisez ensuite le quotient par le nombre qui exprime combien d'Unités de ce quotient en font une de la dénomination plus haute, et posez le reste comme auparavant. Procédez ainsi jusqu'à la dénomination la plus haute; et le dernier quotient avec les différents restes donnera la valeur du nombre proposé.

EXEMPLES.

1. En £351 13s. $8\frac{1}{2}$ d. combien de farthings ? £351 13 $8\frac{1}{2}$ 20

7033 12

84404 4

Rép. 337618 farthings.2. En 337618 Farthings combien de louis, chelins, etc.?

 $\frac{337618}{84404} (4)$

7033 8p (20

£351 13s. Rép. £351 13s. 8\frac{1}{3}d.

3. En £12 combien de Farthings?

Rép. 11520.

4. En 6169 pence combien de louis?

Rép. £25 14s. 1d.

5. En 35 Guinées combien de pence?

Rép. 9800.

6. En 12 Moidores combien de Farthings?

Rép. 17280.

7. Dans 4 doublons combien de pence?

Rép. 3576.

8. Dans 8 aigles américains combien de sous, de cents, de pence et de farthings?

Rép. 9600 sous. 8000 cents. 4800 pence. 19206, irthings.

9. En 1407092 farthings combien de louis?

Rép. £1465 14s. 5d.

10. En 420 Moidores combien de Guinées?
Rép. 540.

12

11

14

L'Ad féren toise

tres, sous pèce suiva la so tinue la so

La

1. £4 £125 dette

grai grai gros n plus xprime é de la ensuite

ensuite tés de ute, et

qu'à la vec les

etc. ?

d.

nts, de *hings*. 11. En 25 lieues françaises combien de pouces?

Rép. 4536000.

12. En 27 acres combien de Vergées et de Perches?

Rép. 108 Vergées, 4320 Perches.

En 93³ Verges combien d'aunes anglaises ?
 Rép. 75.

14. En 8012131 grains combien de livres troie?

Rép. 1390 lbs. 11 oz. 18 gros 19 grains.

DE L'ADDITION COMPOSÉE.

L'Addition des nombres qui contiennent des grandeurs de différentes espèces, comme des louis, des chelins, etc.; des toises, des pieds, etc.

RÈGLE.

Ecrivez les nombres de même nature les uns sous les autres, les pence, par exemple, sous les pence, les chelins sous les chelins, etc. Prenez la somme des plus petites espèces, et voyez combien elle contient d'Unités de l'espèce suivante, que vous retiendrez, et posez le restant; ajoutez à la somme de l'espèce suivante les unités retenues, et continuez ainsi jusqu'à la plus haute espèce dont vous poserez la somme entière.

La preuve se fait comme dans l'Addition simple.

EXEMPLES.

£ 🤌 .	s. d.	\pounds s. d.	lbs.	oz.	dr
324	7 7	1897 8 41	32	4	8
212 1	0 11	7632 19 11%	68	6	12
124	6 8	$2100 \ 0 \ 1\frac{1}{4}$	120	15	8
83 1	8 4	4506 11 101	342	11	13
7	3 4	129 13 41	129	3	8

752 6 10 16266 13 81 693 10 1

1. Pierre doit à Jean £9 6s. 3\(\frac{3}{2}d\), pour du fromage; £4 3s. 0d. pour du thé; £3 2s. 3d. pour du beurre; £125 0s. 0\(\frac{1}{2}d\), pour du sucre. Quel est le montant de sa dette?

Rép. £141 11s. 7\(\frac{1}{2}d\).

2. Quelle est la somme de 48 livres 11 onces 18 gros 21 grains; 42 lbs. 10 oz. 14 gros; 40 lbs. 9 oz. 16 gros 20 grains; 36 lbs. 8 oz. 15 gros 23 grains; 38 lbs. 10 oz. 10 gros et 53 lbs. 17 gros 13 grains?

Rép. 261 livres 4 onces 13 gros 5 grains.

3. Un Marchand achète 3 quintaux 2 quarts 5 lbs. de sucre; 3 quarts 14 lbs. de thé; 1 quart 23 lbs. de café; 2 quarts 3 lbs. 13 oz. 9 dr. d'épices; 13 quintaux 1 quart 24 lbs. de houblon; 3 quintaux 19 lbs. 7 oz. 13 dr. de couperose; Quel est le poids du tout?

Rép. 22 quintaux 5 lbs. 5 oz. 6 dr.

4. De A à Bil y a 3 lieues 7 arpents 8 perches 2 toises; de B à C 2 lieues 3 arpents 6 perches 1 toise 4 pieds; de C à D 11 lieues 80 arpents 9 perches 2 toises 5 pieds; de D à E 6 lieues 3 perches 4 pieds. Combien y a-t-il de A à E?

Rép. 23 lieues 8 arpents 8 perches 1 toise 1 pied

5. Un arpenteur ayant mesuré 4 pièces de terre, trouva qu'une contenait 8 arpents 36 perches 120 pieds en superficie; une autre 36 arpents 42 perches 130 pieds: la troisième 115 arpents 52 pieds, et la quatrième 108 arpents 98 perches 100 pieds. Combien les 4 pièces de terre contenaient-elles ensemble?

Rép. 268 arpents 77 perches 78 pieds.

-6. Un homme a acheté quatre lopins de terre; l'un contient 7 acres 3 vergées 24 perches (mesure anglaise) en superficie; un autre 20 acres 24 verges 7 pieds; le troisième 18 acres 1 vergée 16 perches, et le quatrième 15 acres 5 perches 8 verges. Combien a-t-il acheté de terre en tout?

Rép. 61 acres 1 vergée 6 perches 2 verges 4 pieds 108 p.

7. J'ai dans un vaisseau 6 gallons 1 pot et 1 pinte de vin; dans un autre 10 gallons 1 pinte et 1 chopine; dans une autre 8 gallons et 1 chopine, et 16 gallons et 3 pintes dans un autre. Combien ai-je de vin en tout?

Rép. 1 tierçon ou 42 Gallons.

8. Une personne voulant bâtir, achète un terrain qu'elle paye £2544, elle donne £212 pour les lods et ventes, £652 5s. 9d. au maçon, £615 7s. 6d. au menuisier et au charpentier, £192 17s. 8d. pour les ferrures, £75 6s. 8d. pour la peinture, £259 7s. 10d. pour des meubles et £248 14s 7d pour d'autres dépenses non prevues. A combien se monte la dépense entière?

Rép. £4800.

DE LA SOUSTRACTION COMPOSÉE.

RÈGLE.

Posez le plus petit nombre sous le plus grand, mettant les nombres de même nature les uns sous les autres, et tirez un

trai non la d

le sup de pen que (qu non ens

hau dan L

Ot Res

£56 £10

sucre Com

tuga guin chac moir

4. et 4

perc

trait dessous. Commencez à la droite, et soustrayez chaque nombre inférieur du nombre correspondant supérieur, et posez la différence.

Si quelque nombre de la ligne inférieure est plus grand que le nombre correspondant supérieur, augmentez le nombre supérieur d'autant d'Unités qu'il en faut pour faire une unité de la dénomination plus haute qui suit; si c'était dans les pence, par exemple, que le nombre inférieur fut plus grand que le nombre supérieur; comme 12 pence font un chelin, (qui est la dénomination plus haute qui suit,) augmentez le nombre supérieur des pence de 12, et faites la soustraction, et ensuite ajoutez 1 au nombre inférieur de la dénomination plus haute qui suit, c'est-à-dire, au nombre inférieur des chelins dans le cas présent.

La preuve se fait comme dans la soustraction simple.

EXEMPLES.

De Otez	£ 9	8. 8 3	$rac{d.}{6rac{1}{2}}$	De Otez	£ 16 10	s. 11 12	d. 61 83	De Otez	<i>lb.</i> 18 12	oz. 12 11	<i>dr</i> . 8 14	
Resté	1	5	21	Rest	e 5					0		

- On me devait £849 6s. 8¾d., j'ai reçu en un payement £56 2s. 6d., en un autre £32 17s. 5¼d., et en un troisième £101 6s. 2d. Combien me reste-t-il dû?
 Rép. £659 0s. 7¼d.
- 2. J'ai acheté 2 tonneaux 5 quintaux 1 quart 7 lbs. de sucre, et j'en ai vendu 1 tonneaux 19 quintaux et 20 lbs. Combien m'en reste-t-il?

3. On me doit £50; on me donne en un payement 2 portugaises pesant chacune 4 grains de plus que le poids, 3 guinées pesant chacune 2 grains de moins, 5 doublons pesant chacun 6 grains de plus, et un louis d'or pesant 5 grains de moins. Combien me reste-t-il dû?

Rép. £18 9s. 10½d.

4. De 50 lieues 2 milles 1 stade ôtez 19 lieues 18 perches et 4 verges.

Rép. 31 lieues 2 milles 21 perches 11 verge.

5. De 6 lieues et 12 arpents ôtez 2 lieues 70 arpents 6 perches et 12 pieds.

Rép. 3 lieues 25 arpents 3 perches 6 pieds.

00.

coupe-

dr.

toises;

de C

de Da

pied.

trouva

uperfi-

isième

erches t-elles

 $108 \ p$.

le vin ;

ne au-

ans un

qu'elle

s, £652

char-

. pour

148 7d

onte la

lons.

s. n conen- suisième 5 per-

E?

ant les rez un 6. De 350 lbs. avoir-du-poids ôtez 350 lbs. troie. Rép. 62 lbs. avoir-du-poids.

7. Je me suis défait de 5 arpents 46 perches et 8 toises, qui faisaient partie d'un terrain de 11 arpents 25 perches et 35 pieds. Combien me reste-t-il?

Rép. 5 arpents 78 perches 1 toise et 35 pieds.

8. J'achète deux parts de terre, dont l'une contient 17 acres
2 vergées et 15 perches, et l'autre 12 acres 3 vergées et 30
perches; je revends la différence entre ces deux parts, à laquelle j'ajoute 5 acres 3 vergées et 20 perches. Combien me
reste-t-il?

Rép. 20 acres.

DE LA MULTIPLICATION COMPOSÉE.

RÈGLE.

Posez le multiplicateur sous la plus petite espèce du multiplicande. Multipliez cette plus petite espèce par le multiplicateur, et voyez combien le produit contient d'unités de l'espèce suivante; vous les retiendrez et poserez le restant; multipliez ensuite l'espèce suivante, et ajoutez au produit les unités retenues, et ainsi de suite jusqu'à la plus haute dénomination.

EXEMPLES.

1. Combien font 5 lbs. de sucre à 1s. 3d. la livre?

Rép. 6s. 3d.

2. 9 lbs. de tabac.à 2s. 8d. la livre?

Rép. £1 4s.

qui

6.

8

ordi

che

le c

y a le d

mir

son de

I

3. 20 tonneaux de potasse à £50 8s. 4d. par tonneau.

£ s. d.
$$50 8 4$$

$$4 \times 5 = 20$$

$$201 13 4$$

$$5$$
Resp. £1008 6 8

- 4. Comp 31: font 28 verges de drap à 19s. 4d. la verge?

 Rép. £27 1s. 4d.
- 5. Combien font 17 quintaux de fromage à £4 18s. 8d. le quintal?

 Rép. £83 17s. 4d.
 - 6. Combien font 144 rames de papier à £1 6s. 8d. la rame? Rép. £192.
 - 7. Combien font 120 guinées, la guinée étant de £1 3s. 4d ? Rép. £140.
 - 8. Combien font 163 doublons?

s, qui et 35

rieds.

acres

et 30 à la-

n me

mul-

nultiés de

tant;

it les

déno-

es.

Rép. £607 3s. 6d.

DE LA DIVISION COMPOSÉE.

RÉGLE.

Placez le diviseur et le dividende comme dans la division ordinaire; commencez par la dénomination la plus haute et cherchez combien de fois elle contient le diviseur, et posez le quotient, qui sera de même nature que le dividende; s'il y avait un reste ou que le dividende partiel fût plus petit que le diviseur, réduisez ce reste ou ce dividende en une dénomination plus basse, en ajoutant les unités du dividende qui sont de la même dénomination, et faites la division; et ainsi de suite.

La preuve se fait comme dans la division simple.

EXEMPLES.

1. Divisez £79 17s. 2d. par 7.

£ s. d. 79 17 2 (7

Rép. £11 8 2

2. Divisez £99 1s. par 8.

Rép. £12 78. 71d.

3. Divisez £239 19s. 4d. par 12.

Rép. £19 19s. 111d.

4. Divisez £1088 2s. 6d. par 25.

£ s. d. 1088 2 6 (25	Ou bien	£ 1088	s. 2	d. 6 (5
88 Rep. £43 10 6		217	12	6 (5
75	Rép.	£43	10	6
13 20				
262				
250				
12 12				
150				
150				

5. Divisez 2 livres 1 once et 4 dragmes par 14.

Rép. 2 onces 6 dragmes.

com

coû

 \mathbf{DE}

tion

pai

de

ce

2,

CO

foi

es

6. 20 quintaux de tabac me coûtent £120 10s. 10d. combien coûte le quintal?

 $R\acute{e}p.$ £6 0s. $6\frac{1}{2}d.$

- 7. Si 1 quintal coûte £18 18s. combien coûte la livre? Rép. 3s. $4\frac{1}{2}d.$
- 8. 27 toises 5 pieds 10 pouces d'un ouvrage ayant coûté £91 11s. $0\frac{1}{2}d$., quel est le prix de la toise?

 Rép. £3 10s. 6d.

Lorsque le diviseur contient des unités de différentes espèces réduisez-le à sa plus petite espèce, ensuite multipliez le dividende par le nombre qui désigne combien de fois la grande espèce du diviseur contient la plus petite, et divisez le produit par le diviseur, conme ci-dessus.

Dans l'exemple présent, réduisez le diviseur en pouces, ce qui vous donnera 1870; comme 72 pouces font une toise, multipliez le dividende par 72, (pour cela multipliez par 6 et le produit par 12,) et divisez le produit par 1870 et vous aurez la somme cherchée.

£ 91	s. 11	$\begin{array}{c} d. \\ 0\frac{1}{2} \\ 6 \end{array}$	tois. (25	pds. p. 5 10
549	6	3 12	155 12	
6591 5610	15 Pá	-	(1870	
981 20	nej	p. x.	3 10 0	
19635 18700				
935 12				
1I220 11220				

9. Si 17 quintaux 1 quart 12 lbs. coûtent £34 8s. 6d. combien coûte le quintal?

Rép. £1 19s. 8d.

10. Si 3 toises et 2 pieds coûtent £7 3s. 4d. combien coûte la toise?

Rép. £2 3s.

DE LA MULTIPLICATION COMPOSÉE PAR LES PARTIES ALIQUOTES.

Cette règle enseigne à faire les opérations de la Multiplication composée d'une manière plus abrégée et plus expéditive, par le moyen des *Parties Aliquotes*.

On appelle Parties Aliquotes d'un tout ou d'un nombre, des parties qui sont contenues un certain nombre de fois dans ce tout ou ce nombre, exactement et sans aucun reste. Ainsi 2, 3, 4, 6, sont des Parties Aliquotes de 12, parce que 2 est contenu six fois dans 12; 3 y est contenu quatre fois, 4 trois fois, et 6 deux fois. En général chaque facteur d'un produit est une partie Aliquote de ce produit.

com-

6 (5

6 (5

coûté

·e ?

pèces e diande pro-

es, ce toise, r 6 et aurez Il y a aussi des nombres d'une dénomination qui sont Parties Aliquotes de nombres d'une dénomination supérieure. 3 pence, par exemple, sont Partie Aliquote d'un chelin, car quatre fois 3 pence font un chelin; 4 chelins sont Partie Aliquote d'un louis, car cinq fois 4 chelins font 1 louis; 4 onces avoir-du poids sont Partie Aliquote d'une livre, car quatre fois 4 onces font 1 livre. De là il suit que l'unité ou 1 est une Partie Aliquote de tout nombre entier, car l'unité est toujours contenue exactement et sans reste dans quelque nombre entier que ce soit.

Cette règle contient plusieurs cas:

TABLE DES PARTIES ALIQUOTES.

	1	
Parties d'un penny. $ \frac{1}{4}d. $ est $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}d. $ Parties d'un chelin. $d.$ s. 1 est $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{2}$ 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	gros. grains. once. $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
2 *	1 5 0 1	Parties d'une livre
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	avoir-du-poids. onces. lbs.
6 ½		1 est 16
-	Parties d'une livre	4 1 8 1
Parties d'un louis.	oz. gros. lbs. $1 ext{ 0 est } \frac{1}{12}$	Parties d'un quart
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	lbs. quart.
2	3 0 1	2 3½ ·
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	31 1
$3\frac{3}{4}$ $\frac{1}{63}$	0 0 ‡	7 : 1
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Parties d'une once troie.	14 ½
6 $\frac{1}{40}$	gros. grains. once.	Parties d'un quintal.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 0 est 10	lb. quintal.
10 30	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13 est 142

ont Par- périeure. elin, car rtie Ali- 4 onces r quatre est une toujours bre en-	
5. Once.	
lbs.	
quart uart.	
quintal. ntal.	

P artie	s d'un	quintal.	Partie	s d'une	porche.	pi
lbs. 2 312 4 7 8 14 16 28 56	est	uintal. 56 32 28 16 17 17 17 20 mncau	0 0 0 0 0 0 1 2 Partis	. p. 1 03 son 1½ 15 22 6 23 41 2½ 2½ 24	t vist	P. pr
auinta	ux. tor	meau.	pouce	g.	pied.	0
1	est	20	1	est est	12	ő
11		_16	11	000	1 4	ő
2		10	23		î	0
$2\frac{1}{2}$		18	$\tilde{3}$	• •	ì	l ŏ
4		i	4	• •	ì	0
5		î	6	• •	1	lő
10		1	U		2	0
Parti	es d'un anglais. s.		pied 0	s. p. 6 sont	toise.	0000
1	est	12		9	į	o
11		8		Ŏ	į	l
2		1		6	ř	Ö
3		1		0	į	0
4		$\frac{1}{3}$		0	i	l
6		$\frac{1}{2}$			~	l
					,	1 6
Partie	s d'une	verge.	Partie	es d'une	perche.	1
. 1			1 . ,		- araha	10
pied		rerge.	pieds		perche.	1 6
0	1 est		0	1 es	~ 10	li
0	2	18	0	$\frac{1\frac{1}{2}}{2}$	714	1
0	3	12	0	2	178	1
	4	3	0	3 4	1/2	
	$\frac{4\frac{1}{2}}{c}$	8	0		5 4	6
	6	6	0	41	48	9
	9	4	0	6	3,6	9
	0	312	0	8	27	
1	6	2	0	9 :	$\frac{1}{24}$	1

pied		o. p	erche.
I	0	est	TB
1	11		10
1	6		13
2	0		1
2	3		1 8
3	0		ř
4	6		1
6	0		1
1 1 2 2 3 4 6 9	1½ 6 0 3 0 6 0		2
	-		

Parties d'un arpent.

PREMIER CAS.

Lorsque le prix est moindre qu'un penny.

REGLE.—Divisez le nombre donné par les Parties Aliquotes d'un penny; divisez ensuite le quotient par 12 pour avoir des chelins, et les chelins par 20 pour avoir des louis. Si le prix n'est pas une Partie Aliquote d'un penny, coupez-le en deux Parties, dont l'une soit Partie Aliquote d'un penny, et l'autre Partie Aliquote de la première ou d'un penny.

EXEMPLES.

1. Combien font 4506 Verges de Galon à $\frac{1}{2}d$. la Verge? Comme $\frac{1}{2}d$. est la moitié d'un penny, divisez 4506 par 2, et le quotient par 12 et ensuite par 20; et vous aurez la Réponse en louis, chelins et pence.

$$\frac{\frac{1}{2} \text{ est } \frac{1}{2} \text{ de } 1d. \mid 4506 \text{ d } \frac{1}{2}d.}{2253 \mid 12}$$

$$187-9d. \mid 20$$

Rép. £9 7s. 9d.

2. Combien font 3004 verges à 3d. la verge?

Comme $\frac{3}{4}d$. ne sont point Partie Aliquote d'un penny, prenez $\frac{1}{2}d$. et $\frac{1}{4}d$. qui ensemble valent $\frac{3}{4}d$. $\frac{1}{2}d$. est la moitié d'un penny, et $\frac{1}{4}d$. est le quart d'un penny, ou la moitié de $\frac{1}{4}d$. Ainsi prenez la moitié de $\frac{3004}{4}$ pour $\frac{1}{4}d$. et vous aurez $\frac{1}{502}$; prenez ensuite pour $\frac{1}{4}d$. le quart de $\frac{3004}{4}$ ou la moitié de $\frac{1}{502}$, vous aurez $\frac{7}{51}$, que vous ajouterez à $\frac{1}{502}$; la somme $\frac{22}{53}$, divisée par $\frac{1}{2}$ et ensuite par $\frac{20}{5}$, donnera la réponse en louis, chelins et pence.

R lin, expr

l'au

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

10.

cher prix suite pren qui du p part quel ains quo

> 1 Qui

lins

3.	Combien font 3456	à 1d. ?	Rép. £ 3 12s.
	1984		Rép. £ 4 2s. 8d.
5.		à 4d. ?	$R\acute{e}p.$ £12 8s.
			Rép. £ 1 16s. 0 d.
	1347		$Rép. £ 2 16s. 1 \frac{1}{2}d.$
			Rep. £ 4 4s. 21d
			Rép. £ 1 2s. 41d.
			Rép. £11 10s. 34d.

DEUXIÈME CAS.

Lorsque le prix est en pence ou en pence et farthings

Regle.—1°. Si le prix est une Partie Aliquote d'un chelin, divisez le nombre qui désigne la quantité par celui qui exprime combien de fois le prix est contenu dans un chelin, vous aurez la réponse en chelins, et en divisant par 20 vous l'aurez en louis.

2°. Si le prix n'est point une Partie Aliquote d'un chelin, cherchez la Partie Aliquote du chelin qui approche le plus du prix; elle vous servira pour diviser le nombre. Voyez ensuite combien de fois le reste du prix est contenu dans cette première Partie Aliquote, et divisez le quotient par le nombre qui exprime combien de fois il y est ainsi contenu. Si le reste du prix ne se trouve point une Partie Aliquote de la première partie, cherchez celle qui approche le plus du reste, afin quelle vous serve à diviser le quotient comme ci-dessus, et ainsi de suite pour ce qui vous restera du prix. Les différents quotients ajoutés ensemble vous donneront la réponse en chelins, que vous réduirez en louis en divisant par 20.

EXEMPLES.

1. Comb t 1728 livres de sacre à 4d. la livre?

Comme 4d. font un tiers de chelin, divisez 1728 par 3, ce qui vous donnera 576 chelins, qui divisés par 20 feront £28 16s.

e ? par 2, la Ré-

iquotes oir des le prix n deux l'autre

prenoitié ié de aurez noitié soma ré-

 $\frac{3}{4}d$.

 $egin{array}{c} 12 \ d \mid 20 \end{array}$

-9d.

2. Combien font 1707 livres de tabac à $10\frac{1}{2}d$. la livre? Comme $10\frac{1}{2}d$. ne sont pas Partie Aliquote d'un chelin, il faut prendre 6d. qui sont la moitié d'un chelin, et qui approchent le plus de $10\frac{1}{2}d$. il reste $4\frac{1}{2}d$. qui ne sont point contenus exactement dans 6d.; mais en prenant 3d. et $1\frac{1}{2}d$. qui ensemble valent $4\frac{1}{2}d$. on aura 3d. moitié de 6d. et $1\frac{1}{2}d$. moitié de 3d. Divisant done 1707 par 2 on aura 853s. 6d. qui sera la valeur de 1707 livres à 6d. la livre; prenant la moitié de 853s. 6d. on aura 426s. 9d. valeur de 1707 livres à 3d. la livre; prenant enfin la moitié de 426s. 9d. on aura 213s. $4\frac{1}{2}d$. valeur de 1707 livres à $1\frac{1}{2}d$. Ajoutant ces trois différentes sommes ensemble on aura 1493s. $7\frac{1}{2}d$. et réduisant les chelins en louis, £74 13s. $7\frac{1}{2}d$. valeur de 1707 livres à $10\frac{1}{2}d$. la livre.

6d. sont $\frac{1}{6}$ de 1s. | 1707 à 101d.

	der bont g de 18.	110.41	0 200.	
	$3d. = \frac{1}{2} de \ 6d.$		valeur à 6d	
	$1\frac{1}{2}d. = \frac{1}{2} de \ 3d.$		- 3d	-
	401.		1 110	a.
	$10\frac{1}{2}d$.	1493 7	1 20	
	Ré	p. £74 13	s. 7½d. vale	$ur \stackrel{.}{a} 10 \frac{1}{4} d.$
3.	Combien font 437 a		Rép. £ 1	16s. 5d.
4.	8612 d	$1\frac{1}{4}d.$	Rép. £ 44	17s. $1d$.
5.	4121 d	$1\frac{1}{2}d$?	Rep. £ 25	15s. $1\frac{1}{2}d$.
6.	1861 d		Rép. £ 13	11s. $4\frac{3}{4}d$.
	4761 d		$R\acute{e}p$. £ 39	13s. $6\dot{d}$.
8.	6181 d	21d?	Rép. £ 57	18s. $11\frac{1}{4}d$.
	7613 d		Rép. £ 95	3s. $3d.$
10.		$3\frac{1}{2}d$?	Rép. £ 90	
11.			Rép. £135	6s. 8d.
12.		43d?	Rép. £140	18s. 83d.
	7181 d		Rép. £149	12s. 1d.
14.		$5^{1}_{A}d$?	Rép. £177	12s. $11\frac{1}{3}d$.
15.	8120 d	6d?	Rép. £203	•
	1218 d	$6\frac{1}{2}d$?	Rép. £ 32	19s. 9d.
17.	7101 à	7d ?	Rép. £207	2s. 3d.
18.		73d?	Rép. £197	18s. $3\frac{3}{4}d$.
19.	7102 d		Rép. £236	14s. 8d.
20.	$\dots \dots $	$8^{1}_{4}d$?	Rép. £209	15s. $9\frac{3}{4}d$.
	9001 à		\hat{Rep} . £337	
22.	$\dots \dots $	91d?	Rép. £241	9s. $11\frac{1}{2}d$.
23.	$\dots \dots 8121 \dot{a}$	10d ?	<i>Rép.</i> £338	7s. $6\tilde{d}$.
24.	$\dots 6715 \ a$	$10^{1}_{4}d$?		
25.	$\dots \dots 1261 \ d$	11d?	Rép. £ 57	15s. 11d.
26.	$\dots \dots 1234 \hat{a}$	$11\frac{1}{2}d$?	<i>Rép.</i> £ 59	2s. 7d.

 L_0

RE

multi parez rez de 2° chezopéres bre de 3° lins, j prene rez po suivas

1.

Aliqui comm tés en

2.

TROISIÈME CAS.

Lorsque le prix est en cheline, en cheline et pence, ou en cheline, pence et farthings.

Regle.-1°. Si le prix est un nombre pair de chelins, multipliez la quantité par la moitié du nombre de chelins, séparez le premier chiffre de la droite, doublez-le, et vous aurez des chelins, et les chiffres à gauche seront des louis.

2°. Si le prix est un nombre impair de chelins, retranchez-en un, et avec le nombre pair de chelins qui restera opérez comme ci-dessus, puis ajoutez un vingtième du nom-

bre donné pour le chelin retranché.

3°. Lorsque le prix est en chelins et pence, ou en chelins, pence et farthings, s'il est une Partie Aliquote d'un louis, prenez cette Partie Aliquote; mais s'il ne l'était point, opérez pour les chelins d'après une des deux règles précédentes, suivant le cas, ou bien pour les chelins prenez les Parties Aliquotes d'un louis, et pour les pence et farthings, opérez comme dans le deuxième cas. Les différents résultats ajoutés ensemble donneront la réponse.

EXEMPLES.

1. Combien font 248 verges de drap à 6s. la verge?

248 à 6s.

£74.4

88.

Rép. £74-8s.

2. Combien font 566 verges à 7s. la verge?

566 d 7s.

£169.8

168.

£169—16s.

 $\frac{1}{26}$ de 566 = 28 - 6

Rép. £198-2s.

re? nelin, il i approt contequi en-. moitié jui sera oitié de

à 3d. la $3s.\ 4\frac{1}{2}d.$ férentes chelins la livre.

04d.5d.

> 1d. 13d.

43d.6d.

 $11\frac{1}{4}d$. 3d.

94d.8d.

 $8^{3}_{4}d.$ 1d.

 $1\frac{1}{4}d$. 9d.

Bd. $3\frac{3}{2}d$. 8d.

93d.d.

 $\overset{1}{\widetilde{d}}.$

 $\overset{3}{\overset{4}{d}}d.$

d.

3. Combien font 329 gallons de vin à 3s. 4d. le gallon ? 3s. 4d. est $\frac{1}{6}$ de £1 | 329 à 3s. 4d.

			-	4								
5.	Combien	font	121	@	18.	?	$R\'ep.$	£	6	1s.		
6.			2178	@	18.	3d ?	$R\acute{e}p.$	13	6	2s.	6d.	
7.			7281	@	18.	4d ?	$R\acute{e}p.$	48	5	8s.		
8.			3201	@	18.	6d?	\hat{Rep} .	24	0	18.	6d.	
9.			1696	0	18.	8d ?	\hat{Rep} .		1	6s.	8d.	
10.			8713	@		9^3_4d ?			9	12s.	$3\frac{3}{4}d$.	
11.			2643	0		? -	$R\acute{e}p.$	26	4	6s.		
12.			3462	@	2s.	6d ?	Rép.		2	15s.		
13.			121	0	38		\hat{Rep} .	1	8	3s.		
14.	8888 **		3150	@		4d ?	$R\acute{e}p$.	52				
15.			2375	@	_	$7\frac{1}{4}d$?	$R \hat{ep}$.	42	27	19s.	$10\frac{3}{4}d$.	
16.			4735	@		$11\frac{3}{4}d$					$4\frac{1}{4}d$.	
17.			3271	@		?		81	7	158.	-	
18.			1765			9d ?	$R \dot{ ilde{e}p}.$		7	88.	9d.	
19.			2710	<u>@</u>		8d ?	Rép.		3		8d.	
20.			3715	@		$4\frac{1}{2}d$ 3			1	8s.	$1\frac{1}{2}d$	
21.			77	<u>@</u>		$6\frac{1}{4}d$		4	0	10s.	$1\frac{1}{4}d$.	
22.			2572	<u>@</u>					52	3s.	6d.	
23.			1503	$\widetilde{\omega}$	16s	$10\frac{1}{3}d$	$R\acute{e}p.$	135	52	10s.	$7\frac{1}{2}d.$	
24.			6390	@	188.	? ~	$R\acute{ep}$.	572	24			
25.			2710	@	198.	214 3	Rép.	260	2	148.	7d.	
26.			430	0	19s.	$6\frac{1}{4}d$	Rép.	419)	13s	$11\frac{1}{2}d$	

3. for 4... 5... 6... 7... 9... 10... 11... 12... 13. 14...

15. .

Lors

et e

R

QUATRIÈME CAS.

Lorsque le prix est en louis, chelins, pence et farthings.

REGLE.—1°. Lorsque le prix est en louis seulement, multipliez la quantité par les louis, et vous aurez la réponse en louis.

2°. Si le prix contient, outre les louis, quelques dénominations plus basses, multipliez d'abord la quantité par les louis, et pour le reste du prix opérez d'après une des règles précédentes suivant la nature du cas. La somme des différents résultats donnera la réponse.

llon?

allon ?

1s. 2s. 6d. 3s.

1s. 6d. 6s. 8d.

2s. 3¾d. 6s. 5s.

 $9s. \ 10\frac{3}{4}d.$

3s.

6s. 4\frac{1}{4}d. 5s. 8s. 9d.

 $6s. 8d. 8s. 1\frac{1}{2}d$

 $8s. \ \frac{1}{4}d. \ 8s. \ 6d.$

)s. $7\frac{1}{2}d$.

 $\begin{array}{cccc} 1s. & 7d. \\ s & 11 \frac{1}{2}d \end{array}$

gs. dement, réponse

dénomipar les s règles s diffé-

EXEMPLES.

1. Combien font 356 quintaux de raisin à £4 le quintal ? $356 \ \vec{a} \ \pounds4$

Rép. £1424

2. Combien font 329 quintaux à £4 6s. 8d. le quintal ?

6s. 8d. sont $\frac{1}{3}$ de £1 | 329 à £4 6s. 8d. $\frac{4}{1316}$ | $\frac{1}{109}$ 13 4 | $\frac{1}{13}$ $\frac{$

6s. 8d. sont 1/2 de £4 1316 109 13 4

 $Rép. \pm 1425 13s. 4d.$

3. Combien font8328 @ £1 58. ? Rép. £10410. I1104. 12s. ? 4......6940 @ Rép.13s. 4d ? Rép. **5.....3456** @ 1 *5*760. 6.....8715 @ 16s. 2d? Rép. 15759 12s. 6d. 7,.........7814 @ 1 17s. 3d ? Rép. 14553 11s. 6d.2 8..... 3187 @ 6s. 8d ? Rép. 7436 68. 8d.9.... 3907 @ 3 14s. 6d ? Rép. 14553 118. 6d.4 13s. 4d? Rép. 29745 6s. 10...........6374 @ 8d.12364 198. 11......2345 @ 5 5s. $5\frac{1}{2}d$? Rép. 93d.7 0s. 03d? Rép. 12......1234 @ 8641 17s. 13d? 11 11s. $11\frac{3}{4}d$? Rép. 71565 118. 13.6170 @ 54d.14......1953 @ I29s. $0\frac{1}{2}d$? Rép. 24318 188. 43d.19 19s. 113d? Rép. 199969 118. $8^{1}_{4}d$. 15......9999 @

CINQUIÈME CAS.

Lorsqu'il y a une fraction dans la quantité dont on demande le prix.

Regle.—Opérez d'après les règles ci-dessus sur l'entier, et ensuite pour la fraction vous prendrez des parties propor-

tionnelles du prix, que vous ajouterez au résultat.—Ou bien, cherchez la valeur de la fraction en chelius et pence si la réponse doit être en louis, ou en pence si la réponse doit être en chelins, et prenez ensuite les Parties Aliquotes comme ci-dessus.

EXEMPLES.

1. Combien font $234\frac{3}{4}$ verges de drap à 5s. 8d. la verge?

5s. sont $\frac{1}{4}$ do £1	$234\frac{3}{4}$	à	5s. 8d.	
$6d\frac{1}{10} de 5s.$ $2d\frac{1}{3} de 6d.$	58	10	0	
$2d - \frac{1}{3} de 6d$.	5	17	0	
	1	19	0	
$5s. \ 8d.$	i			
Pour ½ verge		2	10	
Pour 1 verge		1	5	
		-		
			. 3d.	
Ou bien 5s, sont \(\frac{1}{4} \) de £\(\bar{1} \)	234	15	0	
			_	
$6d\frac{1}{10} de 5s.$	58		9	
$2d\frac{1}{3} de 6d.$	5	17	$4\frac{1}{2}$	
	1	19	$1\frac{1}{2}$	
$Rcute{e}p.$	£66	10s.	-3d.	

Réponses.

ha au

sul du mi de

£2

2.

14 2

voi

58.

6d

 P_{γ}

				100	JOINE C	
2. Combien				_		
font @	£0	2s.	6d?	£ 34	3s.	$1\frac{1}{2}d$.
		17s.	8d?	3640	12s.	6d.
4 $139_4^{\tilde{3}}$ @		19s.	4d?	274	16s.	10d.
$5. \ldots 371\frac{3}{4}$		13s.	7d?	1739	9s.	$7\frac{1}{4}d.$
6284 0		10s.	6d?	718	78.	3d.
7 $542\frac{7}{8}$ @		16s.	8d?	452	78.	11d.
8		3s.	9d?	932	11s.	8d.
9 365 6 @		14s.	6d?	1361	3s.	61d.
10		68.	$3\frac{3}{4}d$?	4177	68.	$5\tilde{1}d.$
11895 \$ @		58.	93d?	2946	18s.	9d.
12 694 7 @		6s.	$9\frac{1}{9}d$?	3013	198.	0d.
13 498 6 @	. 5	3s.	64d ?	2581	48.	0d.
14		88.	53d?	2893	6s.	1d.
15			115d?	1864	158.	9^2d .

SIXIÈME CAS.

u bien,

i la r**é**it être

comme

erge?

38.

14d.

6d.

 $7\frac{1}{4}d. \\ 3d. \\ 11d. \\ 8d.$

64d.

 $5^{1}_{4}d.$

9d.

 $0d. \\ 0d.$

1d.

 $9^{2}_{3}d.$

10d.

Lorsque la quantité dont on demande le prix est de plusieurs dénominations.

REGLE.—Multipliez le prix par la dénomination la plus haute, comme dans la multiplication composée, et pour les autres dénominations prenez les Parties Aliquotes, et les résultats ajoutés ensemble donneront la réponse.—Ou bien, réduisez les dénominations inférieures en fraction de la dénomination la plus haute, et opérez comme dans le cas précédent.

EXEMPLES.

1. Combien font 8 quintaux 2 quarts et 16 livres de sucre à £2 5s. 6d. le quintal?

Rép. £19 13s. 3d. p. de 8 qx. 2 qs. 16 lbs.

Ou bien, réduisant 2 quarts 16 lbs. en fraction de quintal, vous aurez.

5s.
$$\frac{1}{4}$$
 de £1 $\begin{vmatrix} 8 \begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix} \hat{d}$ £2 5s. 6d. 5s. $\frac{1}{4}$ de £1 $\begin{vmatrix} 8 \begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix} \hat{d}$ £2 5s. 6d. 5s. $\frac{1}{4}$ de £1 $\begin{vmatrix} 8 \begin{vmatrix} 12 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix} \hat{d}$ 6d. $\frac{1}{10}$ de 5s. $\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix} \hat{d}$ 6d. $\frac{1}{10}$ de 5s. $\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 4 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 4 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 4 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 4 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 4 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} \hat{d}$ $\begin{vmatrix} 4 \end{vmatrix} \hat$

2. Combien coûtent 25 toises 5 pieds 10 pouces d'un ouvrage à £3 10s, 6d. la toise? Rép, £91 11s, $0\frac{1}{2}a$

- 3. Combien font 134 onces 16 gros et 16 grains d'or à £4 9s. 1'once? Rép. £600 0s. 2d.
- 4. Combien font 128 onces 12 gros et 8 grains d'or à £4 7s. $8\frac{1}{2}d$. l'once ? Rép. £564 0s. $9\frac{1}{24}$.
- 5. Un homme a entrepris l'ouverture d'un chemin à raison de £24 15s. par mille : il en a fait 7 milles 6 stades 36 perches et 15 pieds. Combien doit-il recevoir ?
 Rép. £194 13s. 4½d.

6. Combien coûteront 1 lieue 56 arpents 8 perches et 15 pieds de chemin à £47 5s. par lieue ? Rép. £79 4s. $11\frac{1}{4}d$.

7. Combien coûteront 7 acres 3 vergées 26 perches 169 pieds et 72 pouces de terre à £45 7s. 6d l'acre?

Rép. £359 4s. 1½d.

8. Combien font 71 arpents 85 perches 303 pieds et 108 pouces de terre à £43 17s. 4d. par arpent ? £3152 4s. $7\frac{1}{2}d$.

9. Combien font 713 acres 3 vergées et 39 perches de terre à £3 16s. 8d. l'acre? $R\acute{e}p$. £2736 19s. $6\frac{1}{4}d$.

- 10. J'ai mis £97 6s. 3d. en commerce, j'ai retiré à £7 15s. 8d. par louis. Combien m'a produit la somme entière. Rép. £757 8s. $3\frac{3}{4}d$.
- 11. Combien produiront £11 11s. 11d. à raison de £11 11s. 11d. par louis ? Rép. £134 9s. $3\frac{49}{240}$.
- 12. Combien produiront £99 19s. $11\frac{3}{3}d$. à raison de £99 19s. $11\frac{3}{4}d$. par louis ? $R^{\delta}p$. £9999 15s. $10\frac{1}{3840}d$.
- 13. Combien produiront £85 14s. 3d. à raison d'une guinée par louis ? Rép. £99 19s. $11\frac{1}{2}d$.
- 14. Combien produiront £150 15s. 10d. à un doublon par louis ? £561 13s. $11\frac{3}{4}d$.

DES RAISONS ET PROPORTIONS.

Erane de l'antre pour en connaître la différence, et l'on peut diviser aussi l'une par l'autre, pour connaître leur quotient.

Le résultat de ces deux opérations s'appelle Rapport ou les son , Reison Arithmétique lorsque l'on cherche la diffé-

rence et Ainsi la l ble est 4, Géométri donne 3. s'appelle

On perfraction determined tear le correct \$\frac{1}{2} = 3\$

la Raison

Lorsque à colle quitités sont et 4, par e ces quatre l'on scrittiquement 8 à 4 est é Lorsqu'entre d'aventre d'aventre d'aventre d'aventre d'aventre d'accelle qu'entre d'accelle qu'entr

tion Géon

le même d

sont en Pi 4::6:3, Raison Gé ou, le que divisé par

Le pren ment les I les Moyen Dans to

rêmes es Proportion égaler cel et 6 font 1 Dans to

est égale a 4 : : 9 : 3 l

On dit of l'une croît inverse lo décroît. des *Propo* directe, pa

rence et Raison Géométrique lorsque l'on cherche le quotient. Ainsi la Raison Arithmétique de 6 et de 2 comparés ensemble est 4, parce que la différence de 6 à 2 est 4; la Raison Géométrique de 6 et de 2 est 3, parce que 6 divisé par 2 donne 3. La première des deux quantités que l'on compare s'appelle Antécédent, et la seconde Conséquent de la Raison.

On peut donc exprimer une Raison Géométrique par une fraction dont le numérateur est l'antécédent et le dénominateur le conséquent. Ainsi, la Raison Géométrique de 6 à 2 est § = 3 : on l'exprime aussi de cette manière 6 : 2; mais la Raison Arithmétique de 6 à 2 s'exprime ainsi, 6. 2.

Lorsque deux quantités ont entre elles une différence égale à celle qui régne entre deux autres quantités, ce quatre quantités sont alors en Proportion Arithmétique. Les nombres 8 et 4, par exemple, ont la même différence 4, que 6 et 2; ainsi, ces quatre nombres sont en Proportion Arithmétique, que l'on scrit ainsi 8.4:6.2, ce qui signifie 8 est à 4 arithmétiquement comme 6 est à 2; ou, le Rapport Arithmétique de

8 à 4 est égal au Rapport Arithmétique de 6 à 2.

Lorsqu'il règne entre deux quantités un même quotient qu'entre deux autres, ces quatre quantités sont en *Proportion Géométrique*. Les nombres 8 et 4, par exemple, ont le même quotient 2, que 6 et 3; ainsi, ces quatre nombres sont en Proportion Géométrique, que l'on exprime ainsi, 8: 4:: 6:3, c'est-à dire, 8 est à 4 comme 6 est à 3, ou, la Raison Géométrique de 8 à 4 est la même que celle de 6 à 3, ou, le quotient de 8 divisé par 4 est le même que celui de 6 divisé par 3.

Le premier et le dernier terme d'une Proportion se nomment les Extrêmes. Le second et le troisième se nomment

les Moyens.

n

I.

re

Dans toute Proportion Arithmétique la somme des Extrêmes est égale à la somme des Moyens; ainsi, dans la Proportion 8. 4:6. 2 la somme des Extrêmes 8 et 2, doit égaler celle des Moyens 4 et 6; en effet 8 et 2 font 10, et 4 et 6 font 10.

Dans toute Proportion Gécmétrique le produit des Extrêmes est égale au produit des Moyens. Dans la Proportion 12: 4::9:3 le produit de 12 par 3 est égal au produit de 4 par 9.

On dit que deux quantités sont en Raison directe lorsque l'une croît dans le même rapport que l'autre, et en Raison inverse lorsque l'une croît dans le même rapport que l'autre décroît. Il y a par conséquent des Proportions directes et des Proportions inverses. La Proportion 4: 12:: 7:21 est directe, parce que 12 est le triple de 4, de même que 21 est

le triple de 7. Mais, dans la Proportion 4: 12:21:7, 4 et 12 sont en Raison inverse de 21 et 7, parce que pour trouver la Proportion il faut changer l'ordre des deux derniers termes et dire, 4: 12::7:21.

Lorsqu'on parle d'une Raison ou Proportion, sans spéci-

fier laquelle, on entend toujours la Géométrique.

On appelle Raison composée, celle qui résulte de la multiplication de plusieurs Raisons, antécédent par antécédent, conséquent par conséquent. Si l'on multipliait la Raison 8: 4 par la Raison 10: 5, on aurait la Raison composée 80: 20. On appelle la Raison composée, doublée, lorsqu'il y a deux Raisons composantes égales; triplée, quadruplée, etc., lorsqu'il y a trois, quatre, etc., Raisons composantes égales.

Si deux fractions ont un même dénominateur et différents numérateurs, ces fractions seront en Raison directe de leurs numérateurs; c'est-à-dire, que la première sera à la seconde comme le numérateur de la première est au numérateur de la

seconde : ainsi 3 : 3 : : 2 : 3.

Mais si deux fractions ont un même numérateur et des dénominateurs différents, elles seront en raison inverse de leurs dénominateurs ; c'est-à-dire, que la première sera à la seconde comme le dénominateur de la seconde est à celui de

la première; ainsi 3: 3::7:5.

Deux fractions dont les numérateurs et les dénominateurs seront différents, seront en Raison composée de la directe des numérateurs et de l'inverse des dénominateurs; c'est-à-dire, que la première sera à la seconde comme le produit du numérateur de la première par le dénominateur de la seconde est au produit du numérateur de la seconde par le dénominateur de la première : ainsi $\frac{3}{3}:\frac{3}{7}::3\times7:2\times5$ ou $\frac{3}{5}:\frac{3}{7}::21:10$.

PROBLÈME.

Trouver un terme d'une proportion dont on connaît les trois autres.

Soit la Proportion 35: 21:: 15: x, (mettant x pour le terme inconnu que l'on cherche,) dans laquelle on connaît les trois premiers termes. Pour trouver le quatrième, il faut remarquer que le produit des Extrêmes doit être égal au produit des Moyens; par conséquent le terme cherché, qui est le dernier, multiplié par le premier terme 35, doit égaler le produit des deux moyens termes 21 et 15, qui est 315. Or, puisque le terme cherché multiplié par 35, doit donner 315, 315 divisé par 35 donnera le terme cherché; car le quotient multiplié par le diviseur donne le dividende. Or, 315 divisé par 35 donne 9: done 9 est le terme cherché.

1:7,4 et r trouver rs termes

is spéci-

la multécédent, Raison 8: e 80: 20. y a deux etc., lorsgales. différents

de leurs seconde eur de la

t des dée de leurs a à la secelui de

ninateurs
recte des
st-à-dire,
du nuseconde
nominau 2: 2::

ois autres.

or le ternnaît les l faut reu pioduit st le derle pro-15. Or, mer 315, quotient 15 divisé De là on peut déduire la règle générale suivante: Si le terme cherché est un des Extrêmes, prenez le produit des Moyens, et divisez-le par l'Extrême connu, et vous aurez l'autre Extrême. Si le terme cherché est un des Moyens, prenez le produit des Extrêmes, et divisez-le par le Moyen connu, et vous aurez l'autre Moyen.

RÈGLE DE TROIS.

LA REGLE DE TROIS, qu'on appelle aussi Règle d'Ör, à cause de sa grande utilité, est renfermée dans le problème précédent, et c'est la Méthode de trouver un terme d'une Proportion dont on connaît les trois autres. On la divise en Règle de trois simple et Règle de Trois composée.

REGLE DE TROIS SIMPLE.

LA REGLE DE TROIS SIMPLE est la Méthode de trouver un terme d'une Proportion dont on cornaît les trois autres.

RÈGLE.

Posez les trois termes connus en Proportion, de sorte que les deux premiers soient des deux espèces connues, mettant le plus grand terme le second si le terme cherché doit être plus grand que le terme connu, et au contraire mettant le petit terme le second si le terme cherché doit être plus petit que le terme connu, et le troisième de la même espèce que le terme cherché; prenez le produit des Moyens, et divisez-le par l'Extrême connu, et vous aurez le terme cherché.

EXEMPLES.

1. Si 30 hommes me coûtent 27 chelins par jour, combien 50 hommes me coûteront-ils?

Rép. 45s.

2. Si 8 hommes font un ouvrage en 12 jours, en combien de jours 16 hommes feront-ils le même ouvrage?

$$16:8::12:x=6 jours.$$

96 (16 Rép. 6 Jours.

- 3. Un homme a fait un voyage en 24 jours lorsque les jours n'étaient que de 12 heures; combien mettra-t-il de jours à faire le même voyage lorsque les jours seront de 16 heures?

 Rép. 18 Jours.
- 4. Si 6 chevaux mangent 21 minots d'avoine en une semaine, combien 20 chevaux en mangeront-ils dans le même temps?

 Rép. 70 Minots.
- 5. Un fort assiégé a des provisions pour 5 mois en allouant 12 opres par jour à chaque homme; mais ne pouvant avoir de secours que dans 9 mois, on demande combien on doit donner à chaque homme par jour, pour que les provisions leur durent ce temps?

 Rép. 63 Onces.

fo

ur

da

da

qu

11

6. Il y a 800 hommes dans un fort avec des provisions pour 2 mois ; combien faut-il en renvoyer pour que les provisions leur durent 5 mois ? Rép. 480.

7 Si 1000 pieds français font 1068 pieds anglais, combien y a-t-il de pieds anglais dans un arpent? Rép. 192.24.

- 8. Il y a un robinet à une citerne, qui la vide en 12 houres combieu en faudra-t-il de la même capacité pour la vider en un quart d'heure?

 Rép. 48.
- 9. J'ai payé 6 verges de drap 17s. 8d. Combien me coûteront 5 pièces du même drap, chaque pièce contenant $27\frac{1}{2}$ verges? $Rép. £20 4s. 10\frac{1}{3}d.$
- 10. Un édifice, bâti en 8 mois par 120 ouvriers, a été démoli, et on veut le rebâtir en 3 mois ; combien faudra-t-il d'ouvriers?

 Rép. 320.
- 11. Si un homme boit 20 chopines de vin par mois, lorsqu'il coûte 8s. le gallon, combien faut-il qu'il en boive dans le même temps, pour que la dépense soit la même, lorsque le vin coûte 10s. le gallon?

 Rép. 16 Chopines.
- 12. J'ai acheté les 3 d'un héritage qui vaut £700. Combien dois-je donner? Rép. £262 10s.
- 13. Une armée de 1000 hommes dans un fort a des provisions pour 3 mois; il en sort 400 hommes. Combien de temps leur dureront leurs provisions? ** Rép. 5 Mois.
- 14. Si les $\frac{3}{7}$ d'une verge de drap coûtent $\frac{5}{12}$ d'un louis, combien coûteront $\frac{3}{5}$ de verge? $Rép._{\frac{7}{12}}$ de louis, ou 11s. 8d.

jours urs à es ?

seême

uant voir doit leur

ions

oien . nes r en

oû-27‡

dét-il

rsms ue

m-

ri– de

s,

- 15. Si les $\frac{5}{8}$ d'un quintal de sucre coûtent £4 $\frac{7}{9}$, combien vandront $4\frac{1}{2}$ lbs?

 Rép. 6s. $1\frac{5}{4}$ d.
- 16. Une personne qui possédait les $\frac{3}{4}$ d'une propriété vendit les $\frac{3}{3}$ de sa part pour £270 : a combien estimait-elle la propriété entière ? $R\acute{e}_{I}$. £600.
- 17. En combien de jours 12 hommes feront-ils un ouvrage que 30 hommes peuvent faire en 21 jours ? $Rép. 52\frac{1}{2}$ Jours.
- 18. Si 4 perches anglaises de terre de front sur 40 de profondeur font un acre en superficie, combien faudra-t-il donner de profondeur à un morceau de terre de 93 perches de front pour qu'il contienne pareillement un acre en superficie?

 Rép. 163 Perches.
- 19. Si 27 vaches peuvent se nourrir pendant 15 jours dans un pré, combien de temps 45 vaches pourront-elles se nourrir dans le même pré?

 Rép. 9 Jours.
- 20. Si 30 hommes font un ouvrage en 11 jours, combien faudra-t-il d'hommes pour faire le double du même ouvrage dans le tiers du temps des premiers? Rép. 180 Hommes.
- 21. Si 40 arpents de terre me rendent 9 minots de blé par arpent, combien faudra-t-il de terre pour me donner la même quantité de blé à 12 minots par arpent? Rép. 30 Arpents.
- 22. A la monnaie, avec une livre d'or contenant une once d'alliage on fait $44\frac{1}{2}$ guinées. Combien sur ce pied-là vaut une livre d'or pur?

 Rép. £56 12s. $8\frac{1}{2}$ d.
- 23. Combien de verges de tapis d'une demi-verge de large convriront le plancher d'une chambre de 18 pieds de largeur sur 30 de longueur, mesure anglaise? Rép. 120 Verges.
- 24. Un fort assiégé a des provisions pour 5 mois en donnant 12 onces par jour à chaque homme; mais ne pouvant àvoir de secours que tard, on réduit chaque homme à 7½ onces par jour. Combien de temps dureront les provisions?

 Rép. 8 Mois.
- 25. Si 6 hommes ont mis 192 jours à faire un ouvrage, combien taudra-t-il d'hommes pour faire le même ouvrage en 24 jours ?

 Rép. 48 Hommes.

REGLE DE TROIS COMPOSÉE

LA REGLE DE TROIS COMPOSEE est la méthode de trouver un terme d'une Proportion dans laquelle il y a plus de trois termes connus, lesquels cependant peuvent se réduire à trois.

RÈGLE.

SU

pa

1

rè

CO

qu

tre

Rè

sée

Ca

ser

ter on

180

céd der

Prenez deux termes connus de même espèce; établissez, entre ces deux termes et celui qui est de même espèce que le terme cherché, la même proportion que s'il n'y avait que ces trois termes. Prenez deux autres termes connus de même espèce; établissez encore, entre ces deux termes et celui de même espèce que le terme cherché, la mème proportion que s'il n'y avait que ces trois termes. Continuez ainsi, faisant autant de proportions qu'il y a de doubles termes connus de même espèce, observant de mettre toujours pour le troisième terme de chaque proportion, celui qui est de même espèce que le terme cherché. Posez toutes ces différentes proportions les unes sous les autres, antécédents sous antécédents et conséquents sous conséquents. Prenez le produit des antécédents de la première raison de chaque proportion, prenez de même le produit des conséquents de la même raison, et faites cette proportion : le produit des antécédents est au produit des conséquents comme le terme de même espèce que le terme cherché est au terme cherché. Prenez le produit des Moyens, divisez-le par l'Extrême connu, le quotient sera le quatrième terme cherché.

EXEMPLES.

1. Si 14 chevaux mangent 56 minots d'avoine en 16 jours, combien 20 chevaux en mangeront-ils de minots en 24 jours?

	chevau: iours	<u> </u>	nots: x = 120
: 480 56	::	56: x = 120	
2880 2400			
26880 224 -	(224		
	: 480 56 2880 2400 26880 224	2880 2400 26880 224 224	$ \begin{array}{cccc} : 480 & : : & 56 : x = 120 \\ \hline 2880 & & \\ 2400 & & \\ \hline 26880 & (224) \end{array} $

rouver le trois à trois.

dissez,
que le
que ces
même
elui de
on que
faisant
nus de
oisième
espèce

espece proporédents les anprenez son, et au proce que produit ent sera

6 jours, jours ?

= 120

2. Si 3 hommes, en travaillant 7 heures par jour, ont fait en 2 jours, 84 toises d'un ouvrage, combien en feront 5 hommes, en 3 jours, en travaillant 4 heures par jour?

3. Si 8 jardiniers, en travaillant 8 heures par jour, ont béché, en 12 jours, 10 quarrés contenant 240 pieds chacun en superficie, combien 24 jardiniers, en travaillant 12 heures par jour, feront-ils de quarrés de 180 pieds, en 10 jours?

8 jardiniers: 24 jardiniers 8 heures : 12 heures 12 jours : 10 jours 180 pieds : 240 pieds : :: 10 quarrés: x

138240 : 691200 : : 10 : x = 50 quarrés.

REMARQUES.—1°. Ces deux derniers exemples font voir combien est faux le nom que certains auteurs donnent à la règle de Trois Composée, lorsqu'ils l'appellent Règle de Cinq puisque le premier de ces deux exemples contient sept termes connus, et le second en contient neuf: le premier exemple qui suit ces remarques en contient onze, et le deuxième treize. Mais, comme dans tous ces cas ces termes peuvent se réduire à trois, on peut donc, dans tous les cas, l'appeler Règle de Trois. Et, comme la première Raison est composée de plusieurs autres Raisons, on l'appelle Règle de Trois Composée.


2. Lorsque dans une proportion composée l'on peut diviser par un même nombre un des premiers et un des deuxièmes termes de la proportion, ou un des premiers et le troisième, on abrège beaucoup l'opération.

Ainsi dans le troisième exemple l'on a

 $\begin{array}{c}
8: 24 \\
8: 12 \\
12: 10 \\
180: 240
\end{array}$ divisant par $\left\{\begin{array}{c}
8 \\
4 \\
2 \\
60
\end{array}\right\}$ on aura $\left\{\begin{array}{c}
1:3 \\
2:3 \\
6:5 \\
3:4
\end{array}\right\}$:: 10: x.

Divisant ensuite le premier conséquent et le dernier antécédent par 3, on aura 1 pour premier conséquent, et 1 pour dernier antécédent : on aura donc :

 $\begin{array}{c}
 1 : 1 \\
 2 : 3 \\
 6 : 5 \\
 1 : 4
 \end{array}$:: 10 : x.








IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE SERVICE
Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 SIN STATE ON THE STATE OF THE S



Divisant par 3 le troisième antécédent et le deuxième conséquent, on aura 2 pour troisième antécédent et 1 pour deuxième conséquent, comme suit :

$$\begin{array}{c}
1:1\\2:1\\2:5\\1:4
\end{array}$$
:: 10: x .

Divisant par 2 le deuxième antécédent et le quatrieme conséquent, on aura 1 pour deuxième antécédent, et 2 pour quatrième conséquent.

$$\begin{array}{c}
1:1\\1:1\\2:5\\1:2
\end{array}$$
:: $10:x$.

6

jo

la

ro

12 co se

jou

24

pre

40

tra

po

cei

doi

le

ain

Divisant ensin le troisième antécédent et le quatrième conséquent par 2, on aura 1 pour troisième antécédent et 1 pour quatrième conséquent.

$$\begin{array}{c|c}
1 & : 1 \\
1 & : 1 \\
1 & : 5 \\
1 & : 1
\end{array}$$
:: 10 : x .

$$\begin{array}{c}
1 & : 5 \\
\vdots & : 10 \\
\end{array}$$

- 4. Si 130 hommes font, en 12 jours, en travaillant 6 heures par jour, un mur de 125 pieds de long sur 3 pieds d'épaisseur et 4 pieds de hauteur, combien faudra-t-il que 26 hommes travaillent d'heures par jour pour faire en 288 jours un mur de 500 pieds de longueur sur 6 de hauteur et 4 d'épaisseur?

 Rép. 10 Heures.
- 5. Si 252 hommes, en travaillant 5 jours, à 12 heures par jour, ont fait 9 fossés de 280 pieds de long sur 3 de large et 2 de profondeur, en combien de jours 24 hommes en feront-ils 5 de 420 pieds de longueur sur 6 de largeur et 3 de profondeur, en travaillant 9 heures par jour?

 Rép. 175 Jours.
- 6. Si 8 hommes travaillent pendant 3 Jours pour 30s. combien de jours 20 hommes travailleront-ils pour £15?

 Rép. 12 Jours.
- 7. Si un voyageur fait 216 milles en 3 jours, lorsque les jours sont de 12 heures, combien lui faudra-t-il de jours de 10 heures pour faire 360 milles.

 Rép. 6 jours,

8. Si 135 hommes consomment 360 quarts de fleur en 108 jours, combien de quarts en consommeront 11232 hommes en 54 jours?

Rép. 14976 Quarts.

9. Si 8 hommes fauchent 40 arpents en 7 jours, combien d'arpents 28 hommes faucheront-ils en 24 jours?

Rép. 480 Arpents.

- 10. Si 939 hommes consomment 351 quarts de fleur en 168 jours, combien d'hommes en consommeront 1404 quarts en 56 jours?

 Rép. 11268 Hommes.
- 11. Si 15 hommes consomment pour £1 8s. $1\frac{1}{2}d$. de lard en 6 jours lorsque le lard est à 10 sous la livre, combien faudrat-il d'hommes pour consommer pour £2 14s. de lard en 12 jours lorsqu'il sera à 8 sous la livre? Rép. 18 Hommes.
- 12. Si 34 hommes font un ouvrage en 27 jours, en travaillant 7 heures par jour, en combien de temps 27 hommes feront-ils le mê ne ouvrage en travaillant 17 heures par jour?

 Rép. 14 Jours.
- 13. Une garnison de 1500 hommes a des provisions pour 12 semaines en donnant 20 onces par jour à chaque homme : combien d'hommes ces mêmes provisions nourriront-elles 20 semaines, en réduisant leurs rations à 8 onces par Jour?

 Rép. 2250 Hommes.
- 14. Si 15 jeunes gens de 18 ans font un ouvrage en 60 jours, en travaillant 6 heures par jour, combien 9 hommes de 24 ans mettront-ils de Jours à faire le même ouvrage, en travaillant 9 heures par jour, et en supposant leurs forces en proportion de leurs âges?

 Rép. 50 Jours.
- 15. Si 8 hommes, travaillant 12 heures par Jour, ont coupé 40 arpents de blé en 4 jours, en combien de jours 12 hommes travaillant 14 heures par jour, en couperont-ils 210 arpents?

 Rép. 12 Jours.

RÉGLE D'INTÉRET.

LA REGLE D'INTERET enseigne à trouver la somme due pour usage ou prêt d'argent sous certaines conditions et à un certain taux, qui est de tant par cent, et qui, suivant la loi, ne doit point excéder 6 par cent ; c'est-à-dire, £6 pour l'usage ou le prêt de £100 pour une année; £12 pour deux années, et ainsi de suite.

conqua-

conpour

eures sseur nmes mur eur?

s par e et 2 nt-ils deur, irs.

com-

ae les ars de

La somme prêtée, ou sur laquelle se compte l'Intérêt, se nomme Principal, Fonds ou Capital; le taux par cent se nomme aussi Denier, et l'on appelle Montant le capital joint aux intérêts.

Cette règle contient plusieurs cas.

1ER CAS.

Le principal, le Denier et le Temps étant donnés, trouver l'Intérêt.

Regle.—Faites la proportion suivante : 100 est au denier donné, comme le principal donné est à l'intérêt cherché. Le principal multiplié par le denier et divisé par 100 vous donnera l'intérêt pour une année que vous multiplierez ensuite par le temps donné. Ou bien, multipliez le denier par le temps et dites: 100 est au denier multiplié par le temps comme le principal est à l'intérêt cherché pour le temps donné.

EXEMPLES.

1. Quel est l'intérêt de £2356 3s. 4d. à 5 par cent, pour 4 ans?

Rép. £471 4 8 pour 4 ans. Ou bien.—£100 à 5 par cent pour 4 ans donneront £20. 100:20::2356 3 4:x20

2 ans 3.

Si un te capita l'éva est de

REMA un nom née ; et quote d' d'une a le nomb 20.

cherché

2. Quel est l'intérêt de £230 10s. 5d. à 6 par cent pour 12 ans ? Rép. £165 19s. 6d.

3. Quel est l'intérêt de £1 à 5 par cent?

Si l'on veut trouver l'intérêt d'un capital quelconque pour un temps quelconque, à 5 par cent, on n'a qu'à multiplier le capital par le temps, et le produit par 0.05, et ensuite faire l'évaluation; on aura l'intérêt de la somme proposée. Il en est de même des autres taux: en voici une petite table.

	1)	1. 1. 1. 2	(0.01	200	1.1. 1. 1	
à	11/2	par cent.	0.015	$\begin{vmatrix} 4\\4\\1\\3\\5\\5\\4 \end{vmatrix} par cent.$	0.04	
	2		0.02			0.045
	$2\frac{1}{2}$		0.025		par cent:	0.05
	3		0.03		•	0.055
	31		0.035		(1.9.Ja	0.06

4. Quel est l'intérêt de £4318 pour 5 ans, à 41 par cent?

s. 11,000

â 14 Rép. £971 11s.

REMARQUES.—1°. Si l'intérêt demandé n'était que pour un nombre de mois, cherchez d'abord l'intérêt pour une année; et si le nombre de mois demandé était une Partie Aliquote d'une année, prenez cette Partie Aliquote de l'intérêt d'une année. Ou bien, multipliez l'intérêt d'une année par le nombre de mois, et divisez le produit par 12.

2°. Si l'intérêt était pour un nombre de semaines, ayant cherché l'intérêt pour une année, multipliez-le par le nombre

 $\mathbf{p2}$

int

Se

86

rêt. nier

Le on-_ uite ur le mps nué.

our 4

de semaines, et divisez le produit par 52, qui est le nombre

de semaines que contient une année.

3°. Si l'intérêt était pour un nombre de jours, multipliez l'intérêt d'une année par le nombre de jours, et divisez le produit par 365, ou par 366 si l'année était bissextile et que le dernier jour du mois de février se trouvât compris dans la période de l'intérêt.

2E CAS.

Le Principal, le Denier et le Temps étant donnée, trouver le montant.

REGLE.—Cherchez par le cas précédent l'intérêt pour le temps donné, et ajoutez-y le principal.—Ou bien, faites cette proportion: 100 est à 100 plus le denier multiplié par le temps, comme le principal est au montant cherché.

EXEMPLES.

1. Quel est le montant de £563 10s. 10d. à 3 par cent pour 4 ans ?

Par le cas précédent,

100: 12:: 563 10 10: x
12

£67,62 10 0
20

s. 12,50
12

d. 6,00

Principal £563 10 10
Intérêts 67 12 6

Rép. £631 8 4 Montant.

Ou bien

100:112::563 10 10: 2.

 $14 \times 8 = 112$

7889 11 8 8 £631,16 13 4

s. 3,33 12

d. 4,00

Rép. £631 3e. 4d.

2.

£4

à 6

Lc.

F Ter

-1

ann

3. anné

cent

Rı ajoui

Le

par l com ombre

ltipliez le proque le la pé-

nontant.
pour le
es cette
par le

ent pour

2. Quel est le montant de £563 8s. 4d. à 6 par Cent pour 5 Ans ? Rép. £732 8s. 10d.

3. A combien se monteront le principal et les intérêts de £4318 au bout de 5 ans, à 4½ par cent? Rép. £5289 11s.

4. Quels seront le principal et les intérêts de £230 10s. 5d. à 6 par cent pour 12 Ans? Rép. £396 9s. 11d.

3E. CAS.

Le Denier, le Temps et l'Intérêt étant donnés, trouver le Principal.

REGLE.—Faites la Proportion : le denier multiplié par le Temps est à 100, comme l'Intérêt est au principal.

EXEMPLES.

1. Une somme m'a produit £82 3s. 3d. d'Intérêts en 3 années à 5 par cent : quelle était la somme?

Rép. £547 15s. 0d.

- 2. Quelle est la somme qui produira £93 3s. en 3 ans à 44 par cent? Rép. £690.
- 3. Quel est le Principal de £14 6s. $2\frac{1}{4}d$. d'Intérêts de $2\frac{1}{2}$ années à $4\frac{3}{4}$ par cent?

 Rép. £120 10s.
- 4. Quelle somme donnera £332 15s. 3d. en 7 ans à 5 par cent? Rép. £950 15s.

4E. CAS.

Le dernier, le Temps et l'Intérêt étant donnés, trouver le Montant.

REGLE.—Cherchez le principal par le cas précédent, et ajoutez-y les intérêts.—Ou bien, Dites: le denier multiplié par le temps est à 100 plus le denier multiplié par le temps, comme l'intérêt est au montant cherché.

EXEMPLES.

1. Une somme mise à intérêt a produit en 4 années à 5 par cent £73 13s. 6d. d'intérêts. Quel est le montant du principal et des intérêts?

Par le cas précédent, 20 : 100 : : 73 13 6 : x

10

736 15 0
10

7367 10 0(20)

368 7 6 Principal.
73 13 6 Intérêts.

Rép. £442 1s. 0d.

Ou bi: 20 : 120 : : 73 13 6 : x

10

736 15 0
12

8841 0 0(20)

Rép. £442 1s. 0d. Montant.

PE

d'ir

par

prin

cen

£85

Le I

par che

prin

R

- 2. Quel est le montant d'une somme dont les intérêts à 4 par cent se sont montés à £271 13s. 4d. en 12½ ans?
 Rép. £815.
- 3. Une somme a produit en 4 ans à 6 par cent £87 16s. 3d. d'intérêts. Quel sera le Montant?

 Rép. £453 13s. 111d.
- 4. Une somme en 16 ans a donné £983 6s. 11½d. d'intérêts à 6½ par cent. On demande le principal et les intérêts.

 Rép. £1966 I3s. 11d.

SE. CAS.

Le Principal, les intérêts et le Temps étant donnés, trouver le Denier.

Regle — Faites la proportion suivante : le principal multiplié par le temps est à 100, comme les intérêts sont au denier cherché.

EXEMPLES.

1. Une somme de £259 17s. 6d. a produit en 4 années £77 19s, 3d. d'Intérêts, Combien par cent a-t-elle produit par Année?

- 2. La somme de £329 11s. 8d. a rapporté £151 12s. 2d. d'intérêts en 8 années. Combien a-t-elle rapporté par cent par année? Rép $5\frac{3}{4}$.
- 3. En 9 années j'ai eu £392 10s. $2\frac{1}{4}d$. d'intérêts pour un principal de £654 3s. $7\frac{3}{4}d$. Quel était le taux ou denier par cent? Rép. $6\frac{2}{3}$
- 4. A combien par cent par année £120 10s. donneront-ils £85 17s. $1\frac{1}{2}d$. en 15 ans ? Rép $4\frac{3}{4}$.

6E CAS.

Le Montant, le Denier et le Temps étant donnés, trouver le Principal.

REGLE.—Faites la proportion : 100 plus le denier multiplié par le temps est à 100, comme le montant est au principal cherché.

EXEMPLES.

1. Quelle est la somme qui a pu produire £273 6s. da principal et d'intérêts en 8 ans à 5½ par cent?

u prin-

ul.

nt. :êts à 4

6s. 3d.

ntérêts :s.

Denier.

d mulont au

2. Une Somme m'a rapporté au bout de 5 années £394 4s. de principal et d'intérêts à 4 par eent. Quelle était cette somme?

Rép. £328 10s.

3. Quelle est la somme qui produira £678 3s. de principal et d'Intérêts en 9 ans à 6\frac{2}{3} par cent? Rép. £423 16s. 10\frac{1}{2}d.

4. Quelle somme produira £339 1s. 8d. de principal et d'Intérêts en 71 ans à 4 par cent ? Rép. £260 16s. 8d.

7E. CAS.

Le Montant, le Denier et le Temps étant donnés, trouver l'Intérêt.

cer

en

té: int

REGLE.—Faites la proportion : 100 plus le denier multiplié par le temps est au denier multiplié par le temps, comme le montant est à l'intérêt cherché.

EXEMPLES.

1. Une somme mise à intérêt pendant 15 ans à 4 par cent a produit 1270 19s. 8d. de principal et d'intérêts. Quels ont été les intérêts?

2. Quels ont été les intérêts d'une somme qui a produit en 9 années £1046 13s. 10d. de principal et d'intérêts à 6\frac{2}{3} par cent?

Rép. £392 10s. 2\frac{1}{2}d.

3. Une somme a rapporté un montant entier de £442 1s. en 5 années à 4 par cent. Quels étaient les intérêts?

Rép. £73 13s. 6d.

4. Le principal et les intérêts d'une somme se sont montés en 8 années à £273 6s. à 5½ par cent. Quels ont été les intérêts?

Rép. £83 10s. 2d.

394 4s.

ncipai . 10½d. ipal et 6s. 8d.

Intérêt. altiplié nme le

SE CAS.

Le Principal, le Denier et les Intérêts étant donnés, trouver le Temps.

REGLE.—Faites la proportion : le principal multiplié par le denier est aux intérêts, comme 100 est au temps cherché.

EXEMPLES.

1. La somme de £328 10s. mise à intérêt à 4 par cent, a rapporté au bout d'un certain temps £65 14s. d'intérêts. Combien de temps est-elle restée à intérêt?

£328 I0s.
$$\times$$
 4 = 1314 : 65 14 0 : : 100 : x

26280 1314
100

131400 (26280
131400 $Rép.$ 5 Années.

2. En combien d'années la somme de £260 16s. 8d. at-t-elle produit £78 5s. d'intérêts à 4 par cent?

Rép. 7½ Années.

3. Combien faudra-t-il que £259 17s. 6d. restent à intérêt à 7½ par cent pour produire £77 19s. 3d? Rép. 4 Années.

4. En combien d'années £368 7s. 6d. donneront-ils

£73 13s. 6d. d'intérêts à 4 par cent? Rép. 5 Années.

REGLE DE COMMISSION, DE COURTAGE ET D'ASSURANCE.

LA Commission est une allouance que l'on fait de tant par cent à un agent, commis, facteur ou correspondant pour l'Achat, ou la vente qu'il fait de marchandises pour celui qui l'emploie.

LE COURTAGE est une Allouance semblable que l'on fait à une personne appelée courtier, qui aide aux marchands ou aux facteurs à se procurer des effets ou à en disposer.

L'Assurance est une somme de tant par cent que l'on donne à certaines personnes ou à certains bureaux qui s'engagent à indemniser des pertes de vaisseaux, de maisons ou d'effets qui peuvent être occasionnées par des tempêtes ou des incendies.

On appelle *prime* la somme que l'on paye pour l'assurance, et qui est de tant *par cent*: et le papier ou parchemin qui contient le contrat se nomme *Police*.

Cen

1. Q March

2. U

3. J March se mo Ces règles se sont comme la règle d'Intérêt.

EXEMPLES.

1. Quelle sera la commission due sur £502 18s. 4d. de Marchandises à vendre, à 31 par cent de coramission?

100: 31::502 18 4: x

d. 0,50 Rép. £17 12s. 0½d.

2. Un courtier vend pour £2575 16s. 8d. de marchandises : combien lui revient-il de Courtage à 4½ par cent?

100 : 4\frac{1}{4} :: 2575 16 8 : x
4\frac{1}{4}

10303 6 8
1287 18 4

£115,91 5 0

s. 18,25 12

d. 3,00 Rép. £115 18s. 3d.

ranger in the second of the range

3. J'ai mis à bord d'un vaisseau pour £1626 1s. 10½d. de Marchandises que j'ai fait assurer à 8 par cent : à combien se monte la Prime d'Assurance?

* 1,75

d. 9,00 Rép. £130 1s. 9d.

'emps. par rché.

nt, a Frêts.

d. a-

térêt iées. it-ils iées.

Par

our qui

it a ou

ent fets des

su-

ain

OH I

ou a

la c

aug

laq

SIOT

נחק

cett

son

pou

par

cor

Nore.—Il est bon d'observer qu'en général les Assurances sur les vaisseaux ou leurs cargaisons se font à tant de guinées par cent louis. En faisant attention qu'une Guinée vaut un louis et un Sixième, il ne faudra que multiplier le taux par cent par 1½, et procéder ensuite comme ci-dessus; ou bien, en procédant comme si c'étaient des Louis, ajouter un sixième à la prime totale. Ainsi, si dans la Question actuelle la prime était de 8 guinées par cent au lieu de 8 par cent; comme 8 guinées valent 9½ louis, il faudrait multiplier la somme par 9½ et diviser par 100, ce qui donnerait £151 15s. 4½d., ou bien, ajouter un sixième à £130 1s. 9d. ce qui donnera le même résultat—Il faut néanmoins remarquer, si l'on calculait en sterling, que la Guinée ne vaut qu'un vingtième de plus que le louis.

- 4. J'envoie à mon correspondant pour £876 3s. 4d. de marchandises à vendre pour moi, et je lui donne 3\frac{3}{4} par cent de commission. Combien lui reviendra-t-il?

 Rép. £32 17s. 1\frac{1}{4}d.
- 5. Mon courtier m'achète pour £2897 14s. 2d. de marchandises: combien lui dois-je à 4 par cent de courtage?

 Rép. £115 18s. 2d.
- 6. Mon correspondant m'écrit qu'il a acheté des marchandises pour moi, pour la valeur de £754 15s. 10d. Combien lui revient-il en lui allouant $2\frac{1}{2}$ par cent de commission?

 Rép. £18 17s $4\frac{3}{4}d$.
- 7. J'ai fait vendre des marchandises à l'encan, qui se montent à £245 10s. 5d.: combien me revient-il, déduction faite de la commission de l'encanteur à 5 par cent?

 Rép. £233 4s. 103d.
- 8. J'ai fait assurer ma maison, estimée à £2326 5s. à raison de 15s. par cent. Quelle somme dois-je payer par an?

 Rép. £17 8s. 11½d.

Règle pour couvrir la Commission ou l'Assurance.

Couvrir la Commission, c'est comprendre, dans la valeur de la marchandise que l'on donne à vendre à commission, la commission elle-même et les frais de transport et autres, afin que, la commission étant déduite, on retire la valeur entière de la marchandise.

Couvrir L'Assurance, c'est assurer la prime et les autres Frais avec la valeur de la cargaison. rances
uinées
aut un
ux par
bien,
xième
lle la
cent;
lier la
£151
ed. ce
rquer.

id. de r cent d.

qu'un

mare ? i.

mar-Comssion?

lui se

d.

5s. à tran ?

vaimiscrt et re la

utres

Rugle.—1°. Pour la commission.—A la valeur des effets ou marchandises, ajoutez les frais de transport, s'il y en a, ou autres frais, et faites ensuite cette proportion: 100 moins la commission est à 100, comme la valeur des effets ainsi augmentée est à un quatrième terme, qui sera la somme à laquelle vous devez évaluer vos effets, afin que, la commission étant déduite, vous retiriez votre principal et les frais.

2º. Pour l'Assurance.—Ajoutez ensemble la prime, le prix de la police, et la commission, s'il y en a : retranchez cette somme de 100, et dites : le reste est à 100, comme la somme donnée est à un quatrième terme, qui sera la somme pour laquelle vous devez assurer.

EXEMPLES.

1. J'envoie à mon agent à Montréal pour £871 12s. 6½ d. de marchandises à vendre pour mon compte: je lui donne 5 par cent de commission, et je paye £15 pour le transport. A combien dois-je évaluer mes marchandises pour ne rien perdre?

Principal, £871 12 61 Frais, 15 0 0

100 moins 5 = 95 : 100 : : 886 12 64 : a

> .79 12

950 950

Preuve.	100	: 5 ::: 933	5 10 : x		э.			
		£46,66 9	2 De £933 Otez 46	5 13	10 3½ de	comm	ission.	
		s. 13,29 12 d. 3,50	Reste £886	12	61			

2. Je fais assurer pour £2190 13s. 63d. de marchandises à 10 guinées par cent louis, la police me coûte 5s. et la commission 10s. par cent louis. Pour combien dois-je assurer pour couvrir l'assurance?

Prime, 10 Guinées = £11 13 4 Police, 5s. par cent £100, = 0 5 0 Commission, 10s par " = 0 10 0

£100 moins £12 8 4 = £87 11 8

£87 11 8 : £1 20	$00: \pounds 2190 \text{ I3 } 6\frac{3}{4}: x$
1751 12	43813
21020 4	525762 4
84080	2103051 100
	210305100 (84080 168160
	.421451 420400
	105100 84080
	.21020 20
	420400 420400

Preuve. Somme à assurer,		
Prime sur £2501 5s. @ 10 Guinées par cent,	£291 16 3	
Police, 5s. par cent, Commission, @ 10s. par	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11 5½ à déduire _
	310	11 of a aeaurre

Somme à couvrir, 2190 13 63

3. J'ai pour £1310 de Marchandises à vendre; je donne 21 par cent à mon agent pour les vendre; il m'en coûte £20 1s. 3d. pour les lui envoyer. Combien dois-je les faire valoir pour que, déduction faite de la commission, je retire la somme principale avec les frais?

Rép. £1364 3s. 4d.

4. Pour combien doit-on assurer pour couvrir £1721 15s. 4d. @ 6 guinées par cent, la police étant 5s. 3d. et la commission 10s par cent?

Rép. £1866 13s.4d.

5. On a pour £1427 13s. 3d. de marchandises à faire vendre à 3½ par cent de commission: les frais de transport et autres se montent à £22 6s. 9d. A combien faut-il évaluer les marchandises pour retirer la somme principale et les frais, après avoir payé la commission. Rép.. 1500.

6. Pour combien faut-il assurer pour couvrir £1309 18s. 6d. @ 12½ par cent, la commission étant de 9s. 6d. et la pelice de 5s. 6d. par cent? Rép.£1510.

REGLE D'ESCOMPTE.

ESCOMPTER, e'est, sur l'Offre de payement immédiat d'une somme due en un certain temps à venir, rabattre, a un certain taux convenu entre les Parties, une somme, telle que le reste mis à intérêt pour le même temps et au même taux, donne la somme due.

On appelle escompte ou rabais la somme à déduire ou à rabattre; et valeur présente la somme ainsi diminuée de l'escompte.

La Méthode ordinairement suivie dans les affaires de commerce est de chercher l'intérêt de la somme due, au taux convenu, et de déduire cet intérêt du principal pour avoir la valeur présente; mais la vraie Méthode est d'après la regle suivante:

RÉGLE.

Faite la proportion: £100 avec l'intérêt pour le temps donné est à cet intérêt, comme la somme donnée est à l'escompte cherché.

Pour avoir la valeur présente, retranchez l'escompte trouvé de la somme donnée.—Ou bien, faites cette Proportion: £100 avec l'intérêt pour le temps donné est à £100, comme la somme donnée est à un quatrième terme qui sera la valeur présente.

Pour faire la preuve, cherchez l'intérêt auquel se monte la valeur présente trouvée, au taux et pour le temps donnés, et le montant vous donnera le principal.

EXEMPLES.

1. A achète de B, à un an de terme, pour £1000 de marchandises; A offre de lui payer comptant s'il veut lui re-

mettre 5 par cent. Combien A doit-il donner?

Il paraîtrait d'abord que A ne devrait payer comptant que £950; mais il faut remarquer que B ne doit lui remettre £5 que sur chaque £100 qui rentreront réellement dans sa caisse; c'est-à-dire, que sur chaque £105 A en retiendra 5 et B 100. Il faut donc dire,

ne

£100 ne la aleur

monte nnés,

mari reit que re £5

isse;

100.

En soustrayant £952 7s. 7\$d. de £1000, on aura £47 12s. 44d. pour l'escompte ou rabais.

On l'aura aussi en faisant la proportion suivante :

105 :

5::1000:x5000 (105 -£47 12s. 44d. escompte ou rabais.

B ne recevait comptant que £950, cette somme ne donnerait, au bout de l'année, à 5 par cent, que £997 10s.; ainsi il y gagnerait plus d'attendre les £1000 au bout de l'année. Au lieu que £952 7s. 73d. à 5 par cent, lui donneront au bout de l'année £1000.

2. Quelle est la valeur présente de £438 2s. 8d. dûs en un an, en escomptant à 6 par cent? Rép. £413 6s. 8d.

3. Quelle est la valeur présente de £438 2s. 8d. dûs en 2 ans, à 5 par cent? Rép. £398 6s. 0, 7d.

4. Quelle est la valeur présente de £150 3s. 9d. payables en 3 mois, en escomptant à 5 par cent? Rép. £148 6s. 8d.

5. J'ai vendu des marchandises pour la valeur de £1641 14s. 2d. payables en 6 mois; on m'offre payement immédiat à condition que j'escompterai à 5 par cent. Combien Rép. £40 0s. 10d. dois-je déduire?

6. Pierre achète de Jacques, à un an de terme, pour £1000 de marchandise; Jacques offre à Pierre de lui escompter 10 par cent s'il veut le payer comptant : combien Pierre doit-il donner?

Rép. £909 1s. 9,2d.

7. On me doit £150, payables en trois termes, savoir: un tiers dans 4 mois, un tiers dans 8 mois, et un tiers dans un an. On m'offre de me payer comptant. Combien dois-je recevoir en escomptant à 5 par cent?

Rép. £145 3s. 8¾d.

REGLE D'INTÉRÊT COMPOSÉE.

On appelle Intérêt Composé l'intérét qui provient du principal et des intérêts de ce principal.

RÈGLE:

Cherchez le montant du principal donné pour la première année par la règle d'intérêt simple; considérez ce montant comme un principal pour la seconde année, dont vous chercherez le montant de la même manière, et ainsi de suite pour le nombre d'années donné. —Ou bien, cherchez le montant d'un louis pour une année, au tanx donné, et multipliez-le par lui-même autant de fois qu'il y a d'années, moins une, c'est-à-dire, deux fois s'il y a trois années, trois fois s'il y en a quatre, etc. Le dernier produit multiplié par le principal vous donnera le montant pour le temps donné.

Si du montant vous retranchez le principal, vous aurez l'intérêt composé pour le temps donné.

EXEMPLES.

1. A combien se monteront £500 mis à intérêt composé pendant 3 ans à 5 par cent?

£. £. £. £. £. £. 500
$$x = 25$$
 500 $x = 25$ x

po

pa

£1000 poer 10 doit-il $9_1^9_1d$ poir: un ans un s-je res. 8_2^3d .

u prin-

emière
ontant
s cherte pour
ontant
liez-le
s une,
il y en
ncipal

mposé

z l'in-

ère A

2e A.

£. & £. £. s. £. s. d. . £ s. d. $100:5::551\ 5:x=27\ 11\ 3\ 551\ 5\ 0$ 27 1I 3 £27,56 5 £578 16 3 Mont. de la 3e A. 20 500 s. 11.25 £78 16 3 Intérêt pour 3 ans. 12 d.3,00Ou bren, 100: 1.05::1:1.05 1.05 1.05 525105 1.1025 1.05 55125 11025 1.157625 500

Rép. £578 16s. 3d.

2. Quel est l'intérêt composé de £8000 pour 4 ans à 5 par cent? Rép. £1724 1s.

£578.812500

s. 16.250000

d. 3.000000

20

12

- 3. Quel est l'intérêt composé de £760 10s. pour 4 ans à 4 par cent? Rép. £129 3s. $6\frac{1}{2}d$.
- 4. Quel est le montant de £550 10s. à intérêt composé pour 3½ ans à 6 par cent? Rép. £675 6s. 5½d.
- 5. Quel est le montant de £764 pour 4 ans et 9 mois à 6 par cent, à intérêt composé? Rép. £1007 18s. 8½d.

6. Quel est le montant de £9364 7s. 6d. à intérêt composé pour 4 ans, à 6 par cent par an, l'intérêt étant payable tous les six mois?

Rép. £11862 10s. 21d.

PROFIT ET PERTE.

Cette règle enseigne aux commerçants à calculer le profit ou la perte qu'ils font dans l'achat et la vente de leurs effets, et à en augmenter et diminuer le prix en conséquence.

Cette règle comprend plusieurs cas.

1ER CAS.

Trouver le profit ou la perte par cent.

REGLE.—Prenez la différence entre le prix d'achat et celui de vente pour avoir le profit ou la perte, et faites ensuite cette proportion: le prix d'achat est à la somme gagnée ou perdue, comme 100 est à un quatrième terme qui sera le gain ou la perte par cent.

EXEMPLES.

1. J'ai acheté du coton à 4s. la verge, et l'ai revendu 6c. Combien ai-je gagné par cent?

6s. moins 4s. = 2s.

$$4:2::100: x = 50 \text{ par cent.}$$

 $\frac{2}{200}$ (4

Rép. 50 par cent de gain.

2. J'ai acheté de la farine à 9 piastres le quart, que j'ai été forcé de revendre à 7 piastres. Combien ai-je perdu par cent?

regn

CO

fai

Tre

per

¥en

2. par nposé tous 21d.

profit effets,

celui ensuite née où le gain

adu 64.

j'ai été rdu *par* 8. Une personne achète une propriété £466 13s. 4d. et la revend immédiatement à 30 guinées de profit. Combien gagne-t-elle par cent?

Rép. 7½ par cent.

4. J'ai acheté un parti de drap à 6s. Sd. la verge; mais comme il se trouvait endommagé, j'ai été obligé de m'en défaire à 6s. 3d. Comment ai-je perdu par cent?

Rép. 61 par cent.

to Various my very very ver 2E. CAS.

Trouver le Prix auquel il faut vendre pour gagner ou perdre tant par ent.

REGLE.—Dites, 100 est à 100 plus le gain ou moins la perte comme le prix d'achat est au prix cherché.

EXEMPLES.

1. J'ai payé du drap 5s. la verge ; combien dois-je le revendre pour gagner 6 par cent?

100:106::5:x=5s. 34d.

530 (100 500 Rép. 5s. 3§ d. 30 12 360 300

2. J'ai acheté du drap à 5s. la verge, que j'ai revendu à 5 par cent de perte. Combien l'ai-je vendu ?

100: 95::5:x=4s. 9d.

5 475 (100 400 4s. 9d. Rép. 75 12

900

- 3. Je veux gagner 121 par cent sur du vin que j'ai payé 7s. 6d. le gallon : combien dois-je le vendre ?

 Rép. 8s. 51d.
- 4. Un marchand a pera. 12½ par cent sur du drap qui lui a coûté 31s. 6d. la verge. combien l'a-t-il vendu?

 Rép. 2/is. 6¾d.
- 5. J'ai fait 71 par cent de profit sur une propriété que j'ai payée £466 13s. 4d. Combien l'ai-je vendue ?

 Rép. £501 13s. 4d.
- 6. J'ai perdu 64 par cent sur du drap qui me coûtait 6s. 8d. la Verge. Combien l'ai-je vendu? Rép. 6s. 3d.

3E. CAS.

Le Prix de Vente et le Gain ou la Perte étant donnés, trouver le Prix d'Achat.

REGLE.—Dites, 100 plus le profit ou moins la perte est à 100, comme le prix de vente est à un quatrième terme, qui sera le prix d'achat.

EXEMPLES.

1. En vendant du coton 4s. la verge j'ai gagné 20 par cent. Combien me coutait-il?

2. 1 10 pa

3. J'

4. U1 £1 78.

5. J'a gagné 2

6. Si cent, co

Trouver 1

REGLE
le profit de moins la ou la per nombre e s'il est n

ai payé

qui lui a

que j'ai

4d.

6s. 8d.

r le Prix

rte est à rme, qui

par cent.

2. Un marchand en vendant du drap 15s. la verge, a perdu 10 par cent. Combien lui coûtait le drap?

90:
$$100$$
:: 15 :: $x = 16s$. 8d. $\frac{15}{1500}$ $\frac{90}{600}$ $\frac{90}{16s}$. 8d. $Rép$. $\frac{600}{540}$ $\frac{60}{12}$ $\frac{720}{720}$

- 3. J'ai vendu une propriété £501 '3s. 4d., et j'ai fait 7½ par cent de profit. Combien me coût_it-elle?

 Rép. £466 13s. 4d.
- 4. Un marchand perd 121 par cent sur du drap qu'il revend £1 7s. 62d. la verge. Combien lui a coûté le drap?

 Rép. £1 11s. 6d.
- 5. J'ai vendu du vin à 80 guinées la pipe, sur lequel j'ai gagné 25 par cent. Quel était le prix d'achat?

 Rép. £74 13s. 4d.
- 6. Si en vendant du drap 4s. 9d. la verge on perd 5 par cent, combien a-t-il coûté? Rép. 5s.

4E. CAS.

Trouver un Profit ou une Perte proportionnée sur une augmentation ou une diminulion de Prix.

REGLE.—Faites la proportion suivante: Le prix sur lequel le profit ou la perte est donnée est à 100 plus le profit ou moins la perte, comme le prix sur lequel on cherche le profit ou la perte proportionnée est à un quatrième nombre. Si ce nombre est plus grand que 100, l'excédant sera le profit; et s'il est moindre que 100, la différence sera la perte par cent.

EXEMPLES.

1. En vendant une pipe de vin £70 j'ai gagné 10 par cent : combien aurais-je gagné par cent en la vendant £84 ?

70: 110: :: 84: x=132

84

440
880

9240 (70
70
132

224
210

140

Reste 32 par cent.—Rép.

COL

que

10

et c

cent

com

bre,

avoi doni

7

2. Si en vendant une Pipe de Vin £84 je gagne 8 par cent, combien gagnerais-je ou perdrais-je en la vendant £70 t 84 : t 108 : t 70 : t 290

7560 (84 756 — De 100 — 90 Otez 90

Reste 10 p. c. de perte.—Rep. 3. Si en vendant du drap 25s. la verge on perd 20 par cent, combien gagnera-t-on ou perdra-t-on en le vendant 25s? x = 112.

4. Si en vendant de la farine 28s. le quintal on perd 16 par cent, combien gagnera-t-on ou perdra-t-on en la vendant 32s. ?

Reste 4 par cent de perte.-Rép.

- 5. J'ai vendu un cheval £85, et j'ai gagné 13; par cent; combien aurais-je gagné ou perdu si je l'eusse vendu £75?

 Rép. Rien.
- 6. Si en vendant du drap 24s. la verge on perd 20 par cent: quel sera le profit ou la perte en le vendant 36s. ?

 Rép. 20 par cent de profit.
- 7. Un marchand vend du thé à 7s. 6d. la livre, et gagne 10 par cent: combien gagnera-t-il si le prix monte à 8s. 9d. et combien perdra-t-il s'il tombe à 6s. 6d. ?

Rip. { Il gagnera 28; par cent @ 8s. 9d. | Il perdra 4; par cent @ 6s. 6d.

8. J'ai vendu une balle de drap £76, et j'ai perdu 5 par cent : combien aurais-je perdu ou gagné en la vendant £80?

Rép. Rien.

SE CAS.

Augmenter le prix de manière à pouvoir accorder un escompte.

Regle.—Dites: 100 est à 100 plus le taux de l'escompte, comme la valeur de la marchandise est à un quatrième nombre, qui sera le prix que vous devez la vendre.

EXEMPLES.

1. J'ai des effets que je me propose de vendre £399 pour avoir mon profit ordinaire : combien dois-je les vendre pour donner un escompte de 5 par cent et ne rien perdre?

r cent :

–Rép.

ar cent,

e.—Rip. par cent, 25e ?

Rép.

100: 105:: 399: x = £418 19s.

105

1995
399

£418,95
20

19,00 Rép. £418 19s.

p:

pu

téi

tio

dis

pay

pou

sur

REMARQUE.—On observera que l'opération ci-dessus est d'après la vraie méthode d'escompter; mais si l'on voulait la faire d'après la méthode assez généralement usitée, il faudrait dire: 100 moins le taux de l'escompte est à 100, comme la valeur de la marchandise est au prix qu'il faudrait la vendre. Ainsi dans l'exemple ci-dessus on dirait:

95: 100: : 399: x = £420.

100

39900 (95

380 —

£420 Rép.

190

190

Les exemples qui suivent sont résolus d'après la vraie méthode d'escompte:

- 2. Un marchand a des marchandises pour £46 5s., combien doit-il les vendre pour escompter à $7\frac{1}{2}$ par cent?

 Rép. £49 14s. $4\frac{1}{2}d$.
- 3. J'ai des effets que je voudrais vendre £36 9s. 2d. pour faire un profit raisonnable: on m'offre de les prendre si je veux escompter à 8 par cent. Combien dois-je les vendre pour ne rien perdre de mon profit? Rép. £39 7s. 6d.
- 4. J'ai acheté une propriété £466 13s. 4d. sur laquelle je voudrais faire 7½ par cent des profit: je trouve à la vendre en escomptant à 6 par cent. Combien dois-je la vendre?

 Rép. £531 15s. 4d.

6E. CAS.

Trouver le Prix qu'il faut vendre pour faire un certain Profit, lorsqu'il y a un intérêt sur le Prix d'Achat.

RECLE.—Ajoutez ensemble le taux de l'intérêt et celui du profit, et dites: 100 est à 100 plus cette somme, comme le prix d'achat est à un quatrième nombre, qui sera le prix qu'il faudra vendre pour retirer, après que l'intérêt aura été déduit, le profit que l'on avait en vue.

EXEMPLES.

1. J'ai acheté une propriété £466 13s. 4d., mais n'ayant pu la payer comptant, j'ai été obligé de payer 6 par cent d'intérêt. Je voudrais la revendre à 7½ par cent de profit, déduction faite de l'intérêt. Combien dois-je la vendre?

6 par cent et 7½ par cent font 13½

100: 1131: : 466 13 4: x = £529 13s. 4d. 4 × 4 × 7 + 1 $\frac{1}{4} = 113\frac{1}{4}$.

	1866	13	4
•	7466	13	47
•	52266 466 233	13	4
£5	29,66 2		4
	. 13,3 1		
	d. 4,0	0	Rép.

2. Un marchand achète pour £115 14s. 7d. de marchandises payables sous un mois; mais s'il passe ce terme il doit payer 5 par cent d'intérêt. Combien faudra-t-il qu'il vende pour faire 15 par cent de profit après avoir payé les intérêts?

Rép. £138 17s, 6d.

£529 13s. 4d.

3. Un marchand a pour £1285 18s. 9d. de marchandises sur lesquelles il a payé 6 par cent: il voudrait les vendre à 6 par cent de profit clair. Combien les vendra-t-il?

Rép. £1440 5s.

vraie

est

ulait

fau-

mme

ven-

com-

pour si je endre

elle je re en 4. Je reçois une cargaison valant £10,000 que je veux vendre en bloc à 7½ par cent de profit clair: les frais d'assurance, le fret, etc., se montent à 25 par cent. Combien dois-je la vendre?

Rép. £13250.

m

011

30

20

av

qu

gn

vie

pay

gar

mo

30s

110

le t

en

anc

div.

et l

RÈGLE DE COMPAGNIE.

LA REGLE DE COMPAGNIE est une règle par laquelle une quantité quelconque peut être divisée en un nombre de parties

proportionnelles à autant d'autres nombres proposés.

C'est par cette règle que des marchands, etc., en société, peuvent trouver la part de chaque associé dans le gain ou dans la perte, en proportion de sa mise. C'est aussi par cette règle que les biens d'un banqueroutier sont divisés parmi ses créanciers, que les legs sont ajustés dans le cas d'un manque d'effets, etc.

RÈGLE.

Faites cette proportion: la mise totale est au gain total, ou à la perte totale, comme la mise de chaque associé est à sa

part du gain ou de la perte.

Cette règle suppose que chaque mise est pour un même espace de temps; mais lorsque le temps des mises est différent, multipliez chaque mise par le temps qu'elle doit rester dans la masse, et faites cette proportion: la somme des produits des mises par leurs temps respectifs est au gain total, ou à la perte totale, comme chaque produit est à sa part du gain ou de la perte. On vérifie l'operation en ajoutant les gains ou les pertes des associés. La somme doit toujours égaler le gain total ou la perte totale.

EXEMPLES.

1. Trois marchands ont mis £900 en société: le premier a mis £200, le second £300, et le troisième £400; ils ont gagné £1800. Combien chacun doit-il avoir pour sa part?

£ £ £ £ £ 900 : 1800 :: 200 : x = 400 Part du premier. \$\ \begin{align*} \mathbf{F} \ 900 : 1800 :: 300 : x = 600 Part du second. 900 : 1800 :: 400 : x = 800 Part du troisième.

Preuve 1800 gain total.

veux assumbien

le une parties

ociété, gain ou ir cette mi ses nanque

tal, ou st-à sa

même t diffét rester es pron total, part du tant les oujours

premier ils ont art ?

er.

me.

2. Pierre a mis en commerce £200 pour 3 mois, Paul a mis £300 pour 4 mois, et Jacques £200 pour 6 mois : ils ont gagné £1200; combien revient-il à chacun?

£. Mois. £. £. £. £. £. £. 200 × 3 = 600 3000 : 1200 : : 600 : x = 240 d Pierre 300 × 4 = 1200 3000 : 1200 : : 1200 : x = 480 d Paul. 200 × 6 = 1200 3000 : 1200 : : 1200 : x = 480 d Jacques.

3000 Preuve 1200 gain total.

3. Un vaisseau valant £9000 a peri entièrement. A en avait \(\frac{1}{3}\), B en avait \(\frac{1}{4}\), et C le reste; Il n'y avait d'assuré que pour £540: combien chacun perd-il?

 $R\acute{e}p. \left\{ egin{array}{ll} A & \pounds 1057 & 10s. \\ B & £ 2115 & 0s. \\ C & \pounds 5287 & 10s. \end{array} \right.$

4. A, B. et C entrant en société: A mit £900 pour 4 mois, B en mit £720 pour 5 mois, et C £120 pour un an. Ils gagnèrent £600: quelle était la part de chaque?

Rép. { A et B £250 chaque. C £100

5. Un bâtiment ayant fait une prise de £43,769, on convient de la diviser entre l'équipage en proportion de leur paye et du temps qu'ils ont été à bord. Les officiers et les gardes de marine ont été 6 mois à bord, et les matelots 3 mois; les officiers ont 40s. par mois, les gardes de marine 30s., et les matelots 22s.; il y a 4 officiers, 12 gardes, et 110 matelots. Quelle est la part de chacun?

EQUATION DE PAYEMENTS.

LA REGLE D'EQUATIONS DE PAYEMENTS enseigne à trouver le temps moyen où l'on doit payer en entier une somme due en différents temps, de manière que ni le débiteur ni le créancier n'en souffre.

RÈGLE.

Multipliez chaque payement par le temps auquel il est dû, divisez la somme des produits par la somme des payements, et le quotient sera le temps cherché.

EXEMPLES.

1. Je dois à mon créancier £190 payables comme suit, savoir : £50 payables en 6 mois, £60 en 7 mois, et £80 en 10 mois. Je lui offre de lui payer tout à la fois. Quel est le temps moyen où je dois le payer?

er

la

ob dr

po

7 r

lar

bie

lbs liv

les

la g

50 × 6 = 300 60 × 7 = 420 80 × 10 = 800 190 1520 (190 1520 8 mois.

2. J'achète des marchandises à condition que je les paierai, un quart comptant, et un quart tous les trois mois. Je ne voudrais faire qu'un payement du tout : dans quel temps doisje payer?

Rép. en 4½ mois.

3. A doit à B £100 payables en 9 mois, et £500 payables, en un an et demi : quel est le temps moyen pour payer le tout?

Rép. 16½ mois.

4. Je dois une somme d'argent dont la moitié est payable à présent, un quart dans 4 mois, et le reste dans 8 mois: quel est le temps moyen pour le tout?

Rép. 3 mois.

5. J'ai acheté un fonds pour lequel je dois pay r £60 comptant, et £60 par an pendant 5 ans. Le vendeur convient de prendre tout en un seul payement. Dans combien de temps dois-je le payer?

Rép. en 2½ ans.

6. A doit à B £420, payables dans 6 mois; A lui offre £60 maintenant s'il veut l'attendre plus longtemps: combien de temps doit-il l'attendre? Rép. 7 mois.

REGLE D'ALLIAGE.

LA REGLE D'ALLIAGE enseigne à trouver le prix moyen d'un mélange formé de plusieurs choses différentes, dont les quantités et les prix sont donnés, ou à trouver dans quelle proportion il faut prendre chacune de ces choses, lorsque leurs prix et le prix moyen sont connus.

Cette règle renferme plusieurs cas.

1ER CAS.

Biant donnés la Quantité du Mélange, la Quantité et le Prix de chacun des Objets qui entrent dans le Mélange, trouver le Prix du Mélange.

REGLE.—Divisez la somme des prix de tous les objets qui entrent dans le mélange, par le nombre des mesures du mélange, et le quotient vous donnera le prix du mélange. Ce qui revient à cette proportion: La somme des mesures des objets à mêler est à celle de leurs prix, comme une mesure du mélange est à sor prix.

EXEMPLES.

1. Un marchand mêle 10 gallons de vin a 5s., 8 gallons à 8s., et 6 gallons à 9s. combien vaut un gallon de cette composition?

Gls. s. s. Gls. s. Gl. s. 10 d 5 = 50 24 : 168 : : 1 : x = 78 a 8 = 64 6 d 9 = 5424 Gls. 168 (24) 168 - 7s. Rép.

2. On a mêlé ensemble 8 minots de blé à 8s. 9d. le minot; 6 minots de pois à 3s. 7d.; 9 minots d'avoine à 2s. 6d., et 7 minots d'orge à 3s. Combien vaut un minot de ce mélange?

Rép. 4s. 6d.

3. J'ai acheté 1 quintal de sucre à £1 17s. 4d. le quintal, 11 quintal, £1 15s., et 84 livres à 9 sous la livre. A combien me revient la *livre*, l'un portant l'autre?

Rép. à 8 sous.

4. On veut mêler ensemble 5 lbs. de thé à 7s. la livre; 9 lbs. à 8s. 6d., et $15\frac{1}{4}$ lbs. à 5s. $10\frac{1}{2}d$. Combien vaudra une livre de ce mélange?

Rép. 6s. $10\frac{1}{2}d$.

2E CAS.

Etant donnés les différents objets qui entrent dans le métange, et le Prix moyen; trouver la Quantité de chaque objet qui doit entrer dans le Mélange.

REGLE.—Disposez les différents prix donnés les uns sous les autres dans une même colonne, et mettez le prix moyen à la gauche. Prenez les différents prix deux par deux, obser-

paierai, Je ne ps dois-

e suit,

£80 en

el est le

ayables, bayer le

payable B mois:

0 compvient de le temps

ffre £60 nbien de

yen d'un es quanlle proue leurs vant d'en prendre un plus grand et un plus petit que le moyen; prenez la différence entre ces prix et le prix moyen, et mettez la différence entre le prix plus bas et le prix moyen vis-à-vis le prix plus haut, et la différence entre le prix plus haut et le prix moyen vis-à-vis le prix plus bas.

On vérifie l'opération par le premier Cas.

EXEMPLES.

1. On veut mêlèr quatre espèces de vin ensemble, du vin à 18d., à 20d., à 24d. et à 28d., la pinte. Combien faut-il en prendre de chaque pour faire du vin à 22d. la pinte.

22d.
$$\begin{vmatrix}
d. & Pintes. & Preuve. \\
18 & 36d. & 36d. \\
20 & | 6 & 20d. & 120d. \\
24 & | 4 & 24d. & 96d. \\
28 & | 2 & 28d. & 56d. \\
\hline
14 & Rép. 22d.
\end{vmatrix}$$

Ou bien ainsi: Pintes. Preuve. 18d. =108d.6 à à 20d. =40d.48d.24d. =à 112d.28d. =14 308 (14

Rép. 22d.

Etc

d

céd

dan

qua fait

tan vis

terr

fére

vou

de l faut mé

33d

Ι

Les questions dans ce cas-ci, comme on peut le voir, sont susceptibles d'une infinité de solutions

2. J'ai du vin à 15d. la *Pinte*, à 17d., à 18d., et à 22d. Je voudrais en faire du vin à 20d. : combien en mêlerai-je de chaque?

3. Combien faut-il d'Orge à 3s. 6d. le minot, de blé à 4s. et d'avoine à 2s. pour faire un mélange valant 2s. 6d. le minot? Rép. 1. minot d'orge, 1 de blé, et 5 d'avoine.

que le moyen, le prix entre le bas.

, du vin ut-il en

oir, sont 22d. Je

rai-je de

5d.7d. 8d.2d.blé à 4s. . 6d. le oine.

4. Un marchand a du thé à 12s. la livre, d'autre à 11s., à 9s., et à 8s. Il veut le mêler ensemble et en avoir à 10s. Combien en prendra-t-il de chaque?

Rép. 2 lbs. à 8s., 2 lbs. à 12., 1 lb. à 9s., et 1 lb. à 11s. Ou bien, 1 lb. à 8s., 1 lb. à 12s., 2 lbs. à 9s., et 2 lbs. à 11s. Ou bien, une égale quantité de chaque, etc.

3E. CAS.

Etant donnés le Prix moyen, les Prix des différents Objets qui entrent dans le mélange et la quantité d'un des objets; trouver la quantité des autres objets.

Regle. - Disposez les prix donnés comme dans le cas précédent, mettant le prix moyen à la gauche; et opérez comme dans le cas précédent, c'est-à-dire, comme s'il n'y avait la quantité d'aucun objet de donner. Ayant pris les différences, faites autant de Proportions qu'il y a de ces différences, mettant pour premier terme de chaque, celle qui se trouve vis-à vis le prix de l'objet dont la quantité est donnée, pour second terme la quantité donnée, et pour troisième terme les autres diférences séparément ; le quatrième terme de chaque proportion vous donnera la quantité qu'il faut prendre de chaque objet. La preuve se fait comme dans le cas précédent.

EXEMPLES.

1. On veut mêler 12 minots d'avoine à 18d. le minot, avec de l'orge à 2s. 6d., du seigle à 3s., et du blé à 4s. Combien faut-il de blé, d'avoine, et d'orge pour qu'un minot de ce mélange vaille 2s. 9d. le minot?

d. Minots.	Minots.	Preuve.
[18—] 3 12	12 à 18a	l.=216
30 - 15) · · · · · \ 15:	$x = 60 \ a \ 30a$	l. = 1800
33d. \\ 36 \(\) 15\\ 3:12::\\ 15\\	$x = 60 \ a \ 36a$	l.=2160
33d. $ \begin{cases} 30 & -15 \\ 36 & -15 \\ 48 & -13 \end{cases} $ 3 : 12 :: $ \begin{cases} 15 \\ 15 \\ 3 \end{cases} $	x = 12 a 48a	s = 576
	-	
	144	4752(144
		432
		33d.
•		432
		432
		-

Rép. 60 m. d'orge, 60 m. de seigle, et 12 m. de blé.

- 2. Combien faut-il de vin à 8s., à 12s., et à 15s. le Gallon, pour faire du vin à 11s. en les mêlant avec 18 Gallons de vin à 10s?

 Rép. 72 Gals. à 8s., 18 à 12s., et 54 à 15s.
- 3. Combien de vin à 5s., à 5s. 6d., et à 6s. le Gallon, avec 3 Gallons à 4s. feront un mélange valant 5s. 4d. le Gallon? Rép. 12 Gals, à 5s., 24 à 5s. 6d., et 6 à 6s.
- 4. Combien faut-il de thé à 12s., 10s., et 6s., avec 20 lbs. à 4s., pour faire un mélange valant 8s. la Livre?

 Rép. 20 lbs. à 12s., 10 lbs. à 10s., et 10 lbs. à 6s.
 Ou bien. 20 lbs. à 12s., 40 lbs. à 10s. et 40 lbs. à 6s.

4E CAS.

Elant donnés le Prix moyen, les Prix des différents Objets qui entrent dans le Mélange, et la quantité de plus d'un Objet, trouver la quantité des autres Objets.

REGLE.—Cherchez, par le 1er. cas, le prix moyen des objets dont les quantités sont données; considérez ce prix moyen comme le prix d'un objet dont la quantité est égale à la somme des quantités données, et opérez ensuite comme dans le cas précédent.

EXEMPLES

1. On veut mêler ensemble 27 minots de pois à 18d. le minot, 3 minots d'avoine à 28d.. et des fêves à 30d. Combien faut-il de fêves pour que le minot de ce mélange vaille 20d?

Minots.
 d.
 d.
 Minots.

$$27$$
 \dot{a}
 $18 = 486$
 19
 10
 30
 3
 \dot{a}
 $28 = 84$
 30
 1
 $10:30:1:x=3$.

 30
 $10:30:1:x=3$.
 $10:30:1:x=3$.

 $19d$.
 $19d$.
 $10:30:1:x=3$.

2. Un marchand veut mêler 2 pintes de vin à 18d, 2 pintes à 28d., avec du Vin à 20d. et à 24d. Combien en faudra-t-il de ces deux derniers pour en faire du vin à 22d. la Pinte?

Rép. 6 Pintes à 20d. et 4 à 24d.

15s. le 18 Gal-

à 15s.

Gallon, s. 4d. le s. 6 à 6s.

c 20 lbs.

bs. d 6s. bs. d 6s.

Objets qui it, trouver

oyen des ce prix égale à comme

18d. le L. Comge vaille

1: x = 3.

Fêves.

, 2 pintes udra-t-il ?inte ? d 24d. 3. Combien faut-il d'Orge à 2s. le Minot pour mêler avec 20 minots de blé à 5s., et 36 minots de seigle à 3s., de sorte que le mélange puisse valoir 3s. le minot?

Rép. 40 minots.

4. Combien de vin à 5s. et à 6s le Gallon, faut-il mêler avec 3 gallons de vin à 4s. et 6 gallons à 5s. 6d. pour faire du vin à 5s. 4d. le Gallon?

Rép. 9 gallons de chaque.

SE. CAS.

Etant donnés le Prix des différents Objets qui entrent dans le Mélange, la Quantité du Mélange, et le Prix moyen, trouver la Quantité des Objets.

REGLE.—Prenez les différences comme dans le second cas; ajoutez-les ensemble et faites cette proportion: la somme des différences est à la quantité du mélange, comme chaque différence séparément est à la quantité de l'objet du prix vis-àvis lequel se trouve la différence qui l'a produite.

EXEMPLES.

1. On veut mêler ensemble du sucre à 12d., 10d., 6d., et 4d. la livre, pour en faire un mélange de 144 lbs. valant 8d. la livre. Combien faudra-t-il en prendre de chaque?

$$8 \begin{cases} 12 & d. & Preuve. \\ 10 & 4 & 2 & 288 \\ 6 & 4 & 2 & 24 & 12 & 288 \\ 4 & 48 & 10 & 480. \\ 2 & 2 & 44 & 48 & 4 & 6 & 288 \\ 2 & 24 & 4 & 4 & 96 \\ \hline 12 & 144 & 1152 & 1152 \\ \hline 12 & 144 & 1152 & 8d. Rép. \end{cases}$$

2. On veut mêler du thé de quatre différents prix, savoir : du thé à 5s., 6s., 8s., et 9s. la *livre*, pour avoir une composition de 87 *lbs*. valant 7s. la *livre*. Combien doit-on en prendre de chaque?

Rép. 14½ lbs. à 5s., 29 lbs. à 6s., 29 lbs. à 8s., 14½ lbs.

à 98.

Ou bien, 29 lbs. à 5s., 141 lbs. à 6s.. 141 lbs. à 8s., 29 lbs. à 9s.

Ou bien, 213 lbs. de chaque.

3. Combien de vin à 4s., à 5s., à 5s. 6d., et à 6s. le Gallon pour faire 18 gallons à 5s. 4d. le gallon?

Rép. 3 gals. à 4s. et à 5s. et 6 gals. à 5s. 6d. et à 6s. 4. Un apothicaire a trois sortes de drogues, une valant 4s. la livre, une autre 5s., et la troisième 8s. Il en veut faire deux lots, l'un de 2I lbs. à 6s. la livre, et l'autre de 35 lbs. à 7s. la livre. Combien doit-il en prendre de chaque pour chaque lot?

Rép. 6 lbs. à 4s.. 6 lbs. à 5s.. et 9 lbs. à 8s. pour le 1er

lot.

5 lbs. à 4s., 5 lbs. à 5s., et 25 lbs. à 8s. pour le 2e. lot.

PEGLE D'ÉCHANGE.

LA REGLE D'ECHANGE enseigne à trouver la quantité de marchandises, etc., dont on connaît le prix, qu'il faut donner en échange pour une quantité donnée de marchandises à un prix donné.

RÈGLE.

Divisez la valeur de la marchandise dont la quantité et le prix sont donnés, par le prix de la marchandise donnée en échange, et vous aurez la quantité qu'il faut en donner.

Lorsqu'on a des marchandises à un certain prix, pour Argent comptant, et qu'on veuille l'augmenter dans l'échange, il faut alors augmenter en même proportion le prix de la marchandise à échanger, et opérer comme ci-dessus.

EXEMPLES.

1. Combien de Chocolat à 4s. la livre faut-il donner ex échange pour 160 lbs. de Thé à 9s. le livre?

160 lbs. 9s..

1440 (4.

Rép. 360 lbs. Chocolat.

2. A a 224 lbs. de Chocolat à 4s. la livre, mais il vent en avoir 5s. en échange; B a de la Muscade à 10s. la livre, Argent comptant. De combien doit-il l'augmenter pour l'échanger, et combien doit-il en donner en échange?

s. s. s. s. 4 : 5 : : 10 : x=12.5 Prix augmenté de la Muscase.

Rép. 89 1 lbs.

- 3. Pierre donne à Jacques en échange 90 gallons d'Eaude-Vie à 7s. 8d. le gallon, pour lesquels il reçoit 9 guinées en argent et 500 lbs. de coton. A combien est évalué le coton?

 Rép. 1143d.
- 4. A et B veulent faire un échange: A a 20 minots de blé à 5s. le minot, pour lesquels B offre 201 lbs. de sucre à 4d. la livre, et la balance en Raisin à 6d. Combien doit-il donner de Raisin?

 Rép. 66 lbs.
- 5. Combien de tabac à £1 16s. le quintal faut-il donner en échange pour 3 pipes de Vin à £28 10s. la pipe?

 Rép. 47½ quintaux.
- 6. A offre à B de changer 40 verges de drap à 8s. 4d. la verge, si B veut lui donner 25 lbs. de thé à 12s. 9d. Qui des deux doit payer la balance, et combien?

 Rép. B doit donner 14s. 7d.

RÈGLE DE FAUSSE POSITION.

La règle de fausse position enseigne la manière de trouver des nombres inconnus par le moyen de nombres supposés sur lesquels on opère comme s'ils étaient les vrais nombres cherchés.

On la divise en Fausse Position SIMPLE et Fausse Position Double.

illon

i 6s. t 4s. faire

lbs.

e 1er

lot.

marer en prix

et le ée en

r Arange, mar-

er er

veut livre, r l'é-

FAUSSE POSITION SIMPLE.

La règle de FAUSSE POSITION SIMPLE enseigne à résoudre des questions dont les résultats sont proportionnels aux nombres supposés.

RÈGLE.

Prenez un nombre quelconque, et faites sur ce nombre les opérations décrites dans la question. Faites ensuite cette proportion: le total de la supposition est au total de la question, comme le nombre supposé est à un quatrième terme, qui sera le nombre cherché.

Pour faire la preuve, faites la même opération sur le nombre trouvé, et si le total est le même que celui de la question, l'opération est bien faite.

•

EXEMPLES.

1. On demandait à un maître d'école combien il avait d'écoliers; il répondit. Si j'en avais autant, la moitié, et le quart de plus, j'en aurais 88. Combien en avait-il?

- 2. Une personne ayant dépense le tiers et le quart de son argent, a encore £60. Combien avait-elle en premier?

 Rép. £144.
- 3. Un homme distribua 78s. entre un certain nombre de de pauvres; il donna à chaque homme 6s., à chaque femme 4s., et 2s. à chaque enfant: le nombre des femmes était

double de celui des hommes, et le nombre des enfants triple de celui des femmes. Combien y en avait-il de chaque?

Rép. 3. hommes, 6 femmes, et 18 enfants.

- 4. J'ai reçu ±400 pour principal et intérêts d'une somme prêtée, il y a dix ans, à 6 par cent d'intérêt simple. Quelle était la somme prêtée?

 Rép. £250.
- 5. Un jeune homme reçut £420, qui étaient les deux tiers de la portion de son frère aîné; trois fois la portion du frère aîné faisaient le bien du père. De combien était le bien du père?

 Rép. £1890.

te

s-

e,

on

e

6. Un homme laisse £1200 à trois enfants; la part du plus jeune n'est pas connue, mais le second a le double du plus jeune, et l'aîné autant que les deux autres ensemble. Quelle est la part de chaque?

Rép. L'aîné a £600, le second £400, et le plus jeune £200.

FAUSSE POSITION DOUBLE.

La règle de FAUSSE POSITION DOUBLE enseigne à résoudre les questions dont les résultats ne sont pas proportionnels à leurs suppositions, ce qui arrive lorsque le nombre cherché est augmenté ou diminué d'un nombre donné, qui, par la nature de la question, n'est pas une partie connue du nombre cherché. Dans ce Cas il faut faire deux suppositions.

RÈGLE.

Prenez un nombre quelconque, que vous assujettirez aux conditions de la question comme dans la fausse position simple: marquez l'erreur s'il y en a; faites une autre supposition, dont vous marquerez encore l'erreur.

Multipliez le premier nombre supposé par l'erreur de la seconde supposition, et le second Nombre supposé par l'erreur de la première supposition. Divisez ensuite la somme de ces produits par la somme des erreurs si ces erreurs sont différentes, c'est-à-dire, si l'une est plus grande et l'autre plus petite que le nombre donné. Si les Erreurs sont pareilles, c'est-à-dire, toutes deux plus grandes ou toutes deux plus petites que le nombre donné, il faut alors diviser la différence des produits par la différence des erreurs.

EXEMPLES.

1. A, B, et C veulent partager £100 entre eux, de maniere que B ait £3 plus que A, et C £4 plus que B. Quelle sera la part de chaque?

Supposons que A eût 12

B aura 15

et C 19

46 trop petit de 54.

Alors supposons que A eût 20 B aura 23

et C 27

70 trop petit de 30.

 $20 \times 54 = 1080$ $12 \times 30 = 360$

24 720 (24

Rép. 30 part de A. 33 part de B. 37 part de C.

Preuve 100

- 2. Une Femme va porter des œufs au marché; un homme vient qui achète la moitié de ce qu'elle en a et la moitié d'un œuf; vient un second qui achète la moitié de ce qu'il lui reste et la moitié d'un œuf; un troisième vient qui achète la moitié de ce qu'il lui reste et la moitié d'un œuf; et il lui en reste encore 72. Combien en avait-elle lorsqu'elle vint au marché?

 Rép. 583.
- 3. Un Fils voulant savoir son âge, son père lui dit: Votre âge est maintenant le quart du mien; mais il y a 5 ans il n'était qu'un cinquième du mien alors. Quel est l'âge du père et quel est l'âge du fils?

Rép. \ \ 80 l'age du Père. \ 20 l'age du Fils.

- 4. Quel est le nombre qui, pris 6 fois et ajouté à 18 et divisé ensuite par 9, donne 20 au Quotient ?

 Rép. 27.
- 5. Un homme s'engage pour quarante jours à 3s. pour chaque jour qu'il travaillera; mais chaque jour où il ne tra-

vaillera pas il s'engage à donner 1s. Au bout des quarante jours il reçoit £2 16s. qui lui reviennent. Combien de jours a-t-il travaillé?

Rép. 24.

6. A a 20 ans, B a l'age de A et la moitié de celui de C, et C a l'age des deux ensemble. Quel est l'age de chaque?

Rép.
$$\begin{cases} 20 \text{ dge de A.} \\ 60 \\ \hline{} & \text{B.} \\ 80 \\ \hline{} & \text{C.} \end{cases}$$

RÈGLE DE CHANGE.

LA REGLE DE CHANGE enseigne à trouver une somme d'argent d'un Pays égale à une somme donnée d'un autre Pays, suivant un Cours de change donné.

Par cours de change on entend la somme variable de l'argent d'un pays qu'il faut donner pour une pièce ou une somme constante d'un autre pays, et qui seit pour lors de règle ou de taux pour échanger d'autres sommes. Le cours du change monte et baisse presque tous les jours selon que l'argent est abondant ou rare, ou suivant le temps alloué pour le payement de l'argent à donner en échange; alors le cours du change est au-dessus ou au-dessous du pair.

Le pair du change est la somme de l'argent d'un Pays intrinséquement égale à une somme donnée d'un autre.

Cette règle se fait par la règle de trois.

EXEMPLES.

1. On remet de Londres à Dublin £375 15s. Combien doit-on y recevoir, lorsque le change est à 110 par cent?

d. 6,00

Quelle

ma-

omme é d'un i'il lui achète t il lui le vint

Votre ans il âge du

et di-

ir chaie tra2. Si l'on remet de Dublin à Londres £770, combien doiton recevoir à Londres, lorsque le change est de 110 par cent?

110: 100:
$$x = 700$$

100: $x = 700$
77000(110

Rép. £700

- 3. Combien recevrai-je à Londres pour 2750 Milréaux à 6s. 5d. de change par Milréal? Rép. £882 5s. 10d.
- 4. Combien d'Argent dois-je recevoir à Londres, si je paie à Gênes 976 piastres à 53d. par piastre?

 Rép. £215 10s. 8d.
- 5. Combien de piastres valent £510 sterling en Espagne, le cours du change étant à 50d. sterling par Piastre?

 Rép. 2448 piastres.
- 6. Combien de louis sterling valent 200 ducats de Vénise à 4s. 5d. par ducat? Rép. £44 3s. 4d.

DES PUISSANCES ET DES RACINES.

DES PUISSANCES.

On appelle puissance d'un nombre le produit de ce nombre multiplié par lui-même un certain nombre de fois.

On appelle première puissance d'un nombre, le nombre

lui-même.

On appelle deuxième puissance ou quarré d'un nombre, le produit de ce nombre multiplié une fois par lui-même : ainsi 9 est la deuxième puissance ou le Quarré de 3, parce que $3 \times 3 = 9$.

La troisième Puissance ou le cube est le produit d'un nombre multiplié deux fois par lui-même; ainsi 27 est la troisième puissance ou le cube de 3, parce que $3 \times 3 \times 3 = 27$. 81 est la quatrième puissance de 3, parce que $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$. Ainsi la puissance est désignée par le nombre des facteurs égaux qui ont produit cette puissance. On appelle ce nombre l'exposant de la puissance. Ainsi l'exposant de la

trois
la tr
faut
fact
sanc

d'ur

Aindon: divisandes nera

V jusq

P tipli d'ur

élev puis

P

1.

doitcent?

à 6s.

e paie

agne,

nise à

ombre ombre

re, le ainsi e que

nomtroi-=27.

3 × re des opelle

de la

troisième puissance ou du cube est 3, parce que, pour avoir la troisieme puissance d'un nombre, de 3 par exemple, il faut multiplier 3 deux fois par lui-même, ce qui donne trois facteurs égaux $3 \times 3 \times 3 = 27$, qui est la troisième puissance de 3.

Si l'on multiplie ensemble deux ou plusieurs Puissances d'un même nombre, le produit sera une puissance dont l'exposant sera égal à la somme des exposants des facteurs. Ainsi la 4e. puisssance d'un nombre multipliée par la 5e. donnera la 9e puissance, car 4 + 5 = 9. De même si l'on divise une puissance par une autre, le quotient sera une puissance dont l'exposant sera égal à la différence des exposants des facteurs. Ainsi la 10e. Puissance divisée par la 6e. donnera la 4e. puissance, parce que 10-6=4.

Voici les quarrés et les cubes de tous les nombres depuis 1 jusqu'à 10:

Nombres	1	2	3	. 4	5	6	. 7	8	9	10
Quarrés	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
Cubes										

RÈGLE.

Pour élever un nombre à une puissance quelconque, multipliez-le par lui-même autant de fois moins une, qu'il y a d'unités dans l'exposant de la puissance.

Pour élever une fraction à une puissance quelconque, élevez le numérateur et le dénominateur de la fraction à cette puissance.

EXEMPLES.

1. Quelle est la cinquième puissance de 4? 4= lère puissance. 16 = 2e puissance. 64 = 3e puissance.256 = 4e puissance.Rép. 1024 = 5e puissance

- 2 Quelle est la quatrième puissance de 5? Rép 625.
- 3. Quel est le quarré de 1?
- 4. Quel est le cube de $3\frac{1}{4}$?
- Rép. 42%.
 5. Quelle est la quatrième puissance de 2.3 ?
- 6. Quel est le cube de 0.07?

Rép. 27.9841. Rép. 0.000343. des

gra

sez

pal

che

de

per

zér

rac

l'ei

de

la 1

11.

]

DES RACINES.

On appelle RACINE d'un nombre ou d'une puissance, le nombre qui, multiplié par lui même un certain nombre de fois, a produit ce nombre ou cette Puissance. La racine est désignée par le nombre qui exprime combien de facteurs égaux ont produit la puissance. Ainsi 2 est la racine seconde ou quarrée de 4, parce que $2 \times 2 = 4$. 4 est la racine troisième ou cubique de 64, parce que $4 \times 4 \times 4 = 64$, etc.

L'Extraction des racines consiste à trouver les nombres qui ont produit les puissances.

DE L'EXTRACTION DE LA RACINE QUARRÉE.

RÉGLE.

Partagez le nombre donné en tranches, commençant par la droite, de sorte que chaque tranche soit de deux chiffres, excepté la première à gauche qui ne sera que d'un chiffre, lorsque le nombre des chiffres sera impair. Cherchez le plus grand quarré contenu dans la première tranche de la gauche, prenez-en la racine, que vous mettrez à la droite du nombre donné; élevez cette racine au quarré, et retranchez ce quarré de la première tranche; à côté du reste, s'il y en a, ou à côté de 0, s'il n'y en a point, descendez la seconde tranche, et prenez pour dividende le reste, s'il y en a, joint au premier chiffre de la tranche abaissée, ou le premier chiffre seul de la tranche abaissée, s'il n'y a aucun reste; prenez pour diviseur le double de la racine trouvée, que vous poserez sous le dividende; mettez le quotient à la racine et aussi à la droite du diviseur, multipliez le diviseur ainsi augmenté par le quotient, et retranchez le produit du dividende; descendez la tranche suivante à côté du reste, et opérez comme cidessus jusqu'à ce que vous ayez abaissé toutes les tranches.

Si dans le cours de l'Opération le diviseur se trouve plus grand que le dividende, mettez un Zéro au quotient, et abaissez une autre tranche.

Si le nombre donné contenait des décimales, il faudrait les partager aussi en tranches, mais en commençant par la gauche, et il y aurait à la racine autant de décimales qu'il y aurait de tranches de décimales au nombre donné.

Lorsqu'un nombre n'a pas de racine quarrée exacte, on peut cependant l'extraire aussi approchante que l'on veut, par le moyen des décimales, ce qui se fait en ajoutant, deux zéros à chaque dividende, et les quotients sont des décimales.

Pour extraire la racine quarrée d'une fraction, extrayez la racine quarrée du numérateur et celle du dénominateur.

Si vous avez un nombre entier et une fraction, réduisez l'entier en une fraction, en le multipliant par le dénominateur de la fraction et ajoutant le numérateur au produit; extrayez la racine quarrée de ce numérateur et celle du dénominateur.

EXEMPLES.

1. Extrayez la racine quarrée de 5499025, et celle de 11.9025.

5,49,90,25(2345 Racine.	1I.90,25)3.45 9	Racine.
14,9 43	29,0 64	
129	256	
209,0 464	342,5 685	
1856	3425	
2342,5 4685• **	••••	
2342,5		

issance, le nombre de racine est de facteurs racine seest la ra-4 × 4=64,

3.

s nombres

RÉE.

ençant par ux chiffres, un chiffre, chez le plus la gauche, du nombre z ce quarié en a, ou à de tranche. nt au prechiffre seul enez pour oserez sous aussi à la gmenté par descendez omme ciQuelle est la racine quarrée de 2? 2(1.4142 etc., Racine quarrée de 2.

(1.4142 etc.,	rec
10,0 24	
96	
40,0 281	
1190,0 2824	
11296	
6040,0 28282	
56564 etc.	

3. Quelle est la racine quarrée de 32? Rép. 2.

4. Quelle est la racine quarrée de 0.25? Rép. 0.5.

5. Quelle est la racine quarrée de 2.25? Rép. 1.5.

6. Une armée formée en bataillon quarré contenait 331776 hommes : combien y avait-il d'hommes sur chaque face?

Rép. 576.

7. Si la superficie d'un cercle, est de 576 pieds, quel sera le côté du quarré égal en supercie à ce cercle ?

Rép. 24 pieds.

8. On a un morceau de terre de 30 arpents de long sur 5 arpents de large; on veut le réduire en un quarré de même surface : quel doit être le côté de ce quarré?

Rép. 12.247 etc., ar pents.

DE L'EXTRACTION DE LA RACINE CUBIQUE.

LA RACINE CUBIQUE d'un nombre ou d'une puissance est un nombre qui, multiplié deux fois par lui-même, a donné ce nombre ou cette puissance.

Part que, c conten Posez suivan racine seur, p séparé racine, du divi tipliezplusieu le recu ensem racine. reste a la fin; avoir d que dé

> 1. Q Quarr

> Quarr

Quarr Quarr

2. Q

3. Q

4. O $10\frac{2}{3}$ de
bien de

RÈGLE.

Partagez le nombre donné en tranches de trois chiffres chaque, commençant par la droite. Cherchez le plus grand cube contenu dans la première tranche à gauche et l'en retranchez. Posez la racine à la droite du nombre, et abaissez la tranche suivante à côté du restant pour un dividende. Elevez la racine trouvée au quarré, et triplez le quarré pour un diviseur, par lequel vous diviserez le dividende, après en avoir séparé les deux chiffres à droite; mettez le quotient à la racine, élevez-le au quarré et mettez ce quarré à la droite du diviseur. Triplez le dernier chiffre de la racine et multipliez-le par le premier, (ou les premiers lorsqu'il y en a plusieurs,) mettez le produit sous le diviseur augmenté, en le reculant d'un chiffre à gauche; ajoutez ces deux nombres ensemble et multipliez la somme par le dernier chiffre de la racine. Retranchez ce produit du dividende, et à côté du reste abaissez la tranche suivante, et continuez ainsi jusqu'à la fin; et si alors il y avait un reste, et que vous voulussiez avoir des décimales, il faudrait abaisser trois zéros pour chaque décimale que vous voudriez avoir.

EXEMPLES.

EXEMP.	LES.
1. Quelle est la racine cubiqu	ne de 48228544?
Quarré de 2 × 3=27 divisr.	48,228,544(364 Rac.
Quarré du Quotient 6 ajouté à 2 6 × 3 × 1	7=2736 27 3= 54 ——
	${3276 \times 6} = \frac{212,28}{19656}$ Divid.
	15725,44 Divid.
Quarré de 36=1298 × 3=3888 Quarré de 4=16 ajouté à 3898= 4 × 3 × 36	=3 88816
, also	$393136 \times 4 = 1572544$

2. Quelle est la racine cubique de 15625?

. 0.5. . 1.5.

nait 331776 ne face ? . 576.

s, quel sera

. 24 *pieds*. long sur 5 ré de même

., ar pents.

ance est un a donné ce

JE.

- Rép. 25.
- 3. Quelle est la racine cubique de 444194.947?
 - Rép. 76.3.
- 4. On a une boîte de 16 pieds de long sur 24 de large et $10\frac{2}{3}$ de haut; on en veut faire une de forme cubique. Combien doit avoir chaque face?

 Rép. 16. Pieds.

- 5. On suppose une pierre de forme cubique contenant 474552 pouces cubes. Quelle est la superficie d'une de ses faces?

 Rép. 6084 pouces.
- 6, On veut faire une boîte cubique qui contienne un minot du Canada. Quelle largeur doit-elle avoir ?

 Rép. 12.4289 pouces Français.

DES PROGRESSIONS.

DES PROGRESSIONS ARITHMÉTIQUES.

On appelle Progression arithmetique une suite de nombres qui, comparés deux à deux successivement, ont entre eux la même différence. On l'exprime ainsi:

÷ 0. 2. 4. 6. 8. 10 &c. Progression croissante dont la différence est 2.

÷ 15. 12. 9. 6. 3. 0. Progression décroissante dont la différence est 3.

Dans une progression arithmétique, la somme de deux termes quelconques est égale à la somme de deux autres termes quelconques pris à égale distance des deux premiers, mais de côtés opposés. Ainsi dans le premier exemple cidessus la somme de 4 et de 6 est égale à celles de 8 et de 2, et de 10 et de 0.

Le double d'un terme quelconque est égal à la somme de deux autres termes quelconques pris à égale distance chaque côté de ce terme.

Dans les progressions Arithmétiques il faut considérer le premier et le dernier Terme, qu'on appelle aussi les extrêmes, la différence des termes, le nombre des termes, et la somme des termes. Trois de ces cinq choses étant données, les problêmes suivants enseignent à trouver les autres.

problème 1er.

Etant donnés un des extrêmes, la différence des termes, et le nombre des termes d'une progression, trouver l'autre extrême.

REGLE.—Multipliez la différence des termes par le nombre des termes moins 1: ensuite si le terme donné est le plus petit, ajoutez-le au produit pour avoir le plus grand terme; ai au contraire il est le plus grand, soustrayez-en le produit, pour avoir le plus petit.

prem dern

2. en ac il est il av

3. journ 5 lie

diffic terait le 10 il eu

Etan

Rice pliez par codifférila de premala mextré

plus fois comi ces o mun ontenant ie de ses

un minot

de nomont entre

diffé-

la dif-

de deux autres terpremiers, emple ci-8 et de 2,

somme de ce chaque

nsidérer le les extrêmes, et la t données, res.

t le nombre le nombre st le plus d terme; le produit,

EXEMPLES.

1. On a une progression croissante de 10 termes, dont le premier est 1, et la différence des termes 2. Quel est le dernier terme?

 $2 \times 9 = 18$. 18 + 1 = 19 Dernier Terme. Preuve. + 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

2. Un voyageur voudrait arriver en 5 jours à sa destinatio en accélérant sa marche de 4 lieues chaque jour. Pour cela il est obligé de faire 28 lieues le dernier jour. Combien doit-il avoir fait le premier jour?

 $4 \times 4 = 16$. 28 - 16 = 12 Lieues. Preuve. + 12. 16. 20, 24. 28

3. Un homme, partant pour voyage, fit 10 lieues la première journée, et se rendit en huit jours, augmentant sa marche de 5 lieues par jour. Combien fit-il la dernière journée?

Rép. 45 lieues.

4. Un ouvrier ayant entrepris un ouvrage qui croissait en difficultés, convint de le faire à condition qu'on lui augmenterait son salaire de 2s. 6d. par jour. Il termina son ouvrag le 10e. jour et reçut £18s. pour ce jour-la. Combien avaitil eu le premier jour?

Rep. 5s. 6d.

PROBLÈME 2.

Etant donnés un des extrêmes, la différence commune et la somme des termes, trouver l'autre extrême.

REGLE.—10. Si l'extrême cherché est le plus petit, multipliez le plus grand extrême, plus la différence commune, par quatre fois le plus grand extrême; multipliez ensuite la différence commune par huit fois la somme des termes moins la différence commune: retranchez ce dernier produit du premier, et à la moitié de la racine quarrée du reste ajoutant la moitié de la différence commune, vous aurez le plus petit extrême.

20. Si l'extrême cherché est le plus graud, multipliez le plus petit extrême moins la différence commune par quatre fois le plus petit extrême; multipliez ensuite la différence commune par huit fois la somme des termes plus la différence commune de la moitié de la racine quarrée de la somme de ces deux produîts: retranchez la moitié de la différence commune, et vous aurez le plus grand extrême.

EXEMPLES.

1. Le dernier terme d'une progression arithmétique croissante est 33, la différence des termes 4, et la somme des termes 152. Quel est le premier terme ?

$$33 + 4 = 37$$
. $33 \times 4 = 132$. $37 \times 132 = 4884$
 $152 \times 8 = 1216$. $1216 - 4 = 1212$. $1212 \times 4 = 4848$
 $6 \quad 4$ 36
 $\sqrt[2]{} \quad 36 = 6 \quad \frac{}{2} + \frac{}{2} = 5 \quad Premier \ terme$.

2. Le premier terme d'une progression arithmétique croissante est 12, la différence commune 6, et la somme des termes 390. Quel est le dernier terme ?

3. Un homme partant pour un voyage augmente tous les jours sa marche de 3 milles. Le dernier jour il fait 27 milles, et sa Marche entière est de 135 milles. Combien a-t-il fait le premier jour?

Rép. 3 milles.

le

re

el

 L_0

ni pr

te

pl

te

d

4. Un journalier s'engage pour un certain temps à 1s. pour le premier jour, à condition qu'on lui augmentera ses gages de 6d. par jour. Au bout de son temps il se trouve avoir gagné £3 7s. 6d. combien a-t-il eu le dernier jour?

Rép. 8s.

PROBLÈME 3.

Etant donnés la somme des termes, le nombre des termes, et un des extrêmes, trouver l'autre extrême.

REGLE.—Divisez la double, somme des termes par le nombre des termes, et du quotient soustrayez l'extrême connu et vous aurez l'autre extrême. tique croissomme des

132 = 4884 4 = 4848

36

me.

tique crossme des ter-

48= 288 6=18756 19044

r terme.

nte tous les 27 milles, n a-t-il fait

lles.

à 1s. pour ses gages ouve avoir

s, et un des

ar le nome connu et

EXEMPLES.

1. La somme des termes d'une progression est 220, le nombre des termes 10, et le premier extrême 4 : on demande le dernier extrême.

440 10 44-4=40 Dernier extrême.

2. Un homme a fait un voyage de 111 lieues en 6 jours; le dernier jour il a fait 31 lieues. Combien a-t-il fait le premier jour?

Rép. 6 heues.

3. Un homme a 8 enfants qui ont entre eux la même différence d'Ages. Le plus jeune a 3 ans, et la somme de leurs âges est 66. Quel est l'âge de l'aîné?

4. Une personne doit £912, et offre de payer en 8 termes en progessions arithmétiques croissantes. Au dernier terme elle paye £128. Combien a-t-elle payé au premier?

Rép. £100.

PROBLÈME 4.

La différence, le nombre et la somme des termes étant donnée trouver les extrêmes.

REGLE —Multipliez le nombre des termes diminué de l'unité par la différence commune : retranchez la moitié de ce produit de la somme des termes divisée par le nombre des termes, ou l'y ajoutez. Dans le premier cas vous aurez le plus petit extrême, et dans l'autre le plus grand.

EXEMPLES.

1. La somme des termes d'une progression arithmétique croissante est 310, la différence commune 6, et le nombre des termes 10. Quels sont les extrêmes ?

31 +27=58 Dernier extrême.

2. Une personne a fait 172 milles en 8 jours, en augmentant sa marche de 5 milles par jour. Combien a-t-elle fait le dernier jour?

Rép. 39 milles.

Un journalier a gagné £4 7s. 6d. en 20 jours, et ses gages étaient augmentés de 3d. par jour. Combien a-t-il gagné le premier jour?

Rép. 2s.

4. Les âges réunis de 9 personnes forment 72 années; la différence entre leurs âges est de 15 mois. On demande l'âge de la plus jeune et celui de l'aînée.

Rép. { 3 ans la plus jeune. 13 ans l'aînée.

PROBLÈME 5.

Elant donnés les deux extrêmes et le nombre des termes, trouver la différence commune.

Regle.—Divisez la différence des extrêmes par le nombre des termes moins 1, et vous aurez la différence commune.

EXEMPLES.

- 1. Si les deux extrêmes d'une progression sont 4 et 22, et le nombre des termes 7 ; quelle est la différence commune ?

 22-4
 - =3 différence commune.
- 2. Il y a 12 hommes dont les âges sont également distants les uns des autres; l'âge du plus jeune est 16, celui du plus vieux est 60. Quelle différence y a-t-il entre chaque homme?

 Rép. 4 ans.
- 3. Un homme fait un voyage en 12 jours. faisant 3 lieues le premier jour et 36 le dernier. De combien augmente-il sa marche chaque jour. Rép. de 3 lieues.
- 4. Un homme gagne 8s. en une semaine, et continue à augmenter son gain en progression arithmétique de semaine en semaine, de manière qu'à la dernière de son année il se trouve avoir gagné £20 16s. De combien son gain s'est-il accrû chaque semaine?

 Rép. de 8s.

ses gages gagné le

mées ; la demande

 $\it ine.$

trouver la

nombre

et 22, et nmune ?

distants du plus nomme?

3 lieues ite-il sa

emaine ée il se s'est-il

PROBLÈME 6.

Les deux extrêmes et la somme des termes étant donnés, trouver la différence commune.

Regle.—Du double de la somme des termes retranchez la somme des extrêmes ; par le reste divisez la différence des quarrés des extrêmes : le quotient vous donnera la différence commune.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression arithmétique est 3, le dernier 15, et la somme des termes 81. On demande la différence commune.

$$15 \times 15 = 225$$
. $81 \times 2 = 162$
 $3 \times 3 = 9$. $15 + 3 = 18$

Différence des quarrés 216 divisée par 144 = 11 différence commune.

2. Un homme fait 2 lieues de marche la première journée, et augmentant sa marche chaque jour en progression, il fait 17 lieues la dernière journée, et 104½ lieues en tout. De combien a-t-il augmenté sa marche chaque jour?

Rép. de 1½ lieue.

3. Un ouvrier s'engage à 1s. pour le premier jour, si l'on veut lui augmenter ses gages chaque jour d'une somme égale. Le dernier jour ses gages se montent à £1, et la somme entière de ses gages à £20 9s. 6d. De combien était l'augmentation journalière de ses gages?

Rép. de 6d.

4. Le plus jeune des enfants d'une famille a 3 ans, l'aîné a 13 ans ; leurs âges réunis forment 72 ans, et il y a la même différence d'âges entre chaque. Quelle est cette différence ?

Rép. 15 Mois.

PROBLÊME 7.

Ayant un des extrêmes, le nombre et la somme des termes trouver la différence commune.

Regle.—1°. Si c'est le plus petit extrême qui est donné, multipliez-le par le nombre des termes, retranchez ce produit de la somme des termes, divisez la différence qui en résultera par le quarré du nombre des termes moins une fois le nombre des termes: le double du quotient sera la différence commune.

2°. Si c'est le plus grand extrême qui est donné, multipliez-le par le nombre des termes, de ce produit retranchez la somme des termes, divisez la différence qui en résultera comme ci-dessus par le quarré du nombre des termes moins une fois le nombre des termes: le double du quotient vous donvera la différence commune.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression arithmétique croissante est 3, le nombre des termes 8, et la somme 164. Quelle est la différence des termes.

$$3 \times 8 = 24$$
. $164-24 = 140$. $140 \times 8 = 64$.

2. Le dernier terme d'une progression est 73, le nombre des termes 11, et la somme 418. Quelle est la différence des termes ?

$$73 \times 11 = 803$$
. $803-418=385$. $\frac{385}{11} \times 11 = 121$. $121-11=110$. $\frac{385}{110} \times 2=7$ diff. des termes.

3. Il y a 12 hommes dans une maison qui ont la même différence d'âges; le plus jeune a 16 ans, et la somme de leurs âges est 456. Quelle différence d'âges y a-t-il entre eux?

Rép. 4 ans.

m £

de

12

tin

SO

ma

me

de

pr te

40

4. Un homme est convenu de creuser un Puits de 15 pieds de profondeur, à condition qu'on lui augmentera son prix d'une certaine somme à chaque pied. Il se trouve avoir 8s. pour le dernier pied, et £3 7s. 6d. pour l'ouvrage entier. De combien a été l'augmentation?

Rép. de 6d.

PROBLÈME 8.

Etant donnés les extrêmes et la différence commune, trouver le nombre des termes.

Regle.—Divisez la différence des extrêmes par la différence commune, ajoutez 1 au quotient, et vous aurez le nombre des termes.

né, multranchez résultera es moins ent vous

ue croisl. Quelle

termes.

nombre ence des

termes.

même nme de l entre

pieds n prix oir 8s. entier.

rouver

difféez le

EXEMPLES.

1. Si les extrêmes d'une progression sont 3 et 19, et la différence commune 2, quel sera le nombre des termes?

$$\frac{19-3}{2}$$
 = 8. 8 + 1 = 9 nombre des termes.

2. Un voyageur fait 20½ lieues le premier jour, 3 lieues de plus le jour suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier qu'il fait 29½ lieues. Combien de jours marche-t-il? Rép. 4 Jours.

3. Une personne a été mise à l'amende pendant plusieurs mois de suite. Elle a payé 6s. pour le premier mois, et £5 2s. pour le dernier: chaque mois l'amende est plus forte de 12s. Combien de mois l'a-t-elle payée? Rép. 9 Mois.

4. Une personne ayant commencé un petit négoce avec 12s. 6d., fait 3s. 3d. de profit la première semaine, et continue ainsi à augmenter son gain de 3s. 3d. par semaine, en sorte qu'elle vient à faire £8 15s. en une semaine. On demande combien de semaines elle a ainsi négocié.

Rép. 51 Semaines.

PROBLÈME 9.

Etant donnés la somme des termes d'une progression et les deux extrêmes, trouver le nombre des termes.

REGLE.—Divisez la double somme des termes par la somme des extrêmes, et vous aurez le nombre des termes ?

EXEMPLES.

1. La somme des termes d'une progression est 145, les deux extrêmes 1 et 28 : quel est le nombre des termes ?

$$\frac{145 \times 2}{28 + 1} = \frac{290}{29} = 10$$
 nombre des termes.

2. Une personne doit £912 et offre de les payer en différents termes en progression arithmétique, savoir £14 pour le premier terme, et £100 pour le dernier. En combien de termes payera-t-elle la somme?

Rép. En 16 termes.

3. Un voyageur fait 4 lieues le premier jour de marche, et augmentant tous les jours en progression arithmétique, il fait 40 lieues le dernier jour, et il se trouva avoir fait 220 lieues. Combien de jours a-t-il marché? Rép. 10 Jours.

4. Il y a un certain nombre d'hommes dans une maison dont les âges sont également distants les uns des autres. Le plus jeune a 16 ans et le plus vieux 64, et leurs âges réunis font 520 ans. Combien y a-t-il d'hommes?

Rép. 13.

d

m

re

la

lie

PROBLÈME 10.

Ayant un des extrêmes, la différence commune, et la somme des termes trouver le nombre des termes.

REGLE.—1°. Si l'extrême donné est le plus petit, multipliez cet extrême moins la différence commune par quatre fois ce même extrême; multipliez ensuite la différence commune par huit fois la somme des termes plus la différence commune: de la racine quarrée de la somme de ces deux produits retranchez le double du plus petit extrême moins la différence commune. Le reste divisé par le double de la différence commune donnera le nombre des termes.

2°. Si l'extrême donné est le plus grand, ajoutez-y la différence commune, et multipliez cette somme par quatre fois l'extrême donné; multipliez ensuite la différence commune par huit fois la somme des termes moins la différence commune; ôtez ce dernier produit du premier: la racine quarrée du reste étant retranchée du double de l'extrême donné plus la différence commune, et le tout divisé par le double de la différence commune, vous aurez le nombre des

termes.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression arithmétique croissante est 5, la différence commune 4, et la somme des termes 152. Quel est le nombre des termes ?

$$5-4 = 1.
152 \times 8 = 1216.
10-4 = 6.$$

$$5 \times 4 = 20.
1216 + 4 = 1220.
1220 \times 4 = 4880
70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$4900$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-6$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

$$70-7$$

2. Le dernier terme d'une progression est 30, la différence commune 3, et la somme des termes 156. On demande le nombre des termes.

$$30 + 3 = 33$$
. $30 \times 4 = 120$. $120 \times 33 = 3960$
 $156 \times 8 = 1248$. $1248 - 3 = 1245$. $1245 \times 3 = 3735$

$$\sqrt[2]{225} = 15$$
. $60 + 3 = 63 - 15$ 225 $\sqrt[2]{225} = 8$ nombre des termes.

maison tres. Le es réunis

. 13.

destermes

nultipliez e fois ce commune nce comdeux proins la dife la diffé-

outez-y la oar quatre nce comlifférence la racine ême donle doumbre des

ue croises termes

= 20 = 4880 = 4900

lifférence mande le

= 3960 = 3735 225

termes.

3. Un journalier a 2s. pour sa première journée de travail; on lui augmente ses gages de 3d. par jour, et au bout de son temps il se trouve avoir £4 7s. 6d. en tout Combien de jours a-t-il travaillé?

Rép. 20 Jours.

4. Un voyageur, augmentant sa marche de 7 arpents tous les jours, fait 5 lieues le dernier jour de marche, et 147 lieues en tout. Combien de jours a-t-il marché?

Rép. 49 Jours.

PROBLÊME 11.

Les deux extrêmes et la différence commune étant donnés, trouver la somme des termes.

Regle.—Divisez la différence des quarrés des extrêmes par le double de la différence commune: au quotient ajoutez la demi-somme des extrêmes, et vous aurez la somme des termes.—Ou bien: A la différence des extrêmes ajoutez la différence commune; multipliez cette somme par la somme des extrêmes, et divisez le produit par le double de la différence commune, pour avoir la somme des termes.

EXEMPLES.

1. Les deux extrêmes d'une progression arithmétique croissante sont 10 et 70, et la différence commune 3. Quelle est la somme des termes ?

$$\frac{4900-100}{6} - 800$$

$$\frac{70 + 10}{2} = 40$$

$$\frac{2}{840 \text{ somme des termes.}}$$

$$\frac{340}{70+10} = 80$$

$$\frac{5040}{840 \text{ somme des termes.}}$$

2. Un voyageur fait $20\frac{1}{2}$ lieues la première journée de marche, et augmentant sa marche de 3 lieues par jour, il fait $29\frac{1}{2}$ lieues le dernier jour. Combien fait-il de chemin en tout?

Rép. 100 Lieues.

- 3. Un homme part de Québec pour Montréal, et fait 8 lieues la première journée, et augmentant de 2 lieues chaque jour, il fait 16 lieues le dernier jour, et arrive à Montréal. Combien a-t-il fait de chemin de Québec à Montréal?

 Rép. 60 Lieues.
- 4. Une personne commence un petit négoce avec 12s 6d. et gagne 3s. 3d. la première semaine, et continue ainsi, augmentant son gain de 3s. 3d. par semaine. Au bout d'un certain temps elle se trouve avoir gagné £8 15s. dans une semaine. Combien a-t-elle d'argent en tout ? Rép. £239 1s. 3d.

PROBLÈME 12.

Etant donnés les deux extrêmes et le nombre des termes, trouver la somme des termes.

Regle.—Multipliez la somme des extrêmes par la moitié du nombre des termes, et le produit vous donnera la somme des termes.

EXEMPLES.

- 1. Le premier terme d'une progression arithmétique est 1, le dernier terme 100, le nombre des termes 10. Quelle est la somme des termes?
 - 1 + 100 = 101. $101 \times 5 = 505$ somme des termes.
- 2. Un homme achète 17 verges de drap; pour la première il donne 2s., et augmentant en progression, il donne 10s. de la dernière. Combien paye-t-il le tout? Rép. £5 2s.

m

qu

lie

no

à

qu

bi

3. Combien de coups frappe le timbre d'une horloge en 12 heures? Rép. 78.

4. Un ouvrier entre dans un chantier à raison de 7s. pour le premier mois, et on lui promet d'augmenter son salaire d'une somme égale chaque mois. Le dix-neuvième mois il reçoit £3 10s. pour ce mois-le. Combien a-t-il gagné en tout?

Rép. £36 11s. 6d.

REMARQUE.—Lorsqu'une progression se trouve être la suite des nombres naturels à commencer par l'unité, telle que

1. 2. 3. 4. 5. etc., la somme des termes se trouve en multipliant le nombre des termes augmenté de l'unité par la moitié du nombre des termes. Ainsi dans le troisième exemple le nombre des termes étant 12, on aura:

12 + 1 = 13, $13 \times 6 = 78$.

PROBLÈME 13.

Ayant un des extrêmes, la différence commune, et le nombre des termes, vrouver la somme des termes.

Regle.—Multipliez le nombre des termes diminué de l'unité par la moitié de la différence des termes ; ajoutez ce produit au plus petit extrême, ou retranchez-le du plus grand et multipliez le tout par le nombre des termes pour en avoir la somme.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression arithmétique croissante est 5, la différence commune 6, et le nombre des termes 15. Quelle est la somme des termes ?

15-1=14.
$$14 \times \frac{6}{2}$$
=42. $42+5$ =47. 47×15 =705 $\begin{cases} somme \\ des \\ termes. \end{cases}$

2. Le dernier terme d'une progression est 91, la différence commune est 4, et le nombre des termes 23. Quelle est la somme de la progression?

23-1=22.
$$22 \times \frac{4}{2}$$
=44. 91 -44=47. 47×23 =1081 $\begin{cases} somme \\ des \\ termes \end{cases}$

3. Un journalier s'engage pour 20 jours, à 2s. pour le premier jour, et 3d. d'augmentation pour chaque jour subséquent. Combien aura-t-il gagné en tout au bout de son temps?

Rép. ±4 7s. 6d.

4. Un voyageur marchant pendant 49 jours, augmente chaque jour sa marche de 7 arpents, et le dernier jour il fait 5 lieues. Combien a-t-il fait de chemin en tout?

Rép. 147 Lieues.

REMARQUES.—1°. Si l'on voulait trouver la somme d'un nombre quelconque de termes de la suite des nombres impairs à commencer par l'unité, il ne s'agirait que de prendre le quarré du nombre des termes pour en avoir la somme. Ainsi la somme de la progression arithmétique ÷ 1. 3. 5. 7, etc., continuée jusqu'au 12e terme, serait 144, quarré de 12. Ou bien, ajoutez l'unité au dernier nombre, et prenez la moitié de cette somme que vous élèverez au quarré.

et fait 8 chaque contréal.

tes.
12s 6d.
nsi, augcertain
emaine.
s. 3d.

rouver la

moitié somme

elle est

es. remière 10s. de

2s. e en 12

s. pour salaire mois il gné en is. 6d. a suite le que n mul-

a moi-

temple

2°. Si l'on voulait avoir la somme d'un nombre de termes de la même suite, mais qui commencerait par tout autre nombre que l'unité il faudrait au nombre des termes diminué de l'unité ajouter le premier terme, et multiplier la somme par le nombre des termes. Ainsi pour avoir la somme de la progression ÷ 11. 13. 15. 17. 19, où le nombre des termes est 5, et le premier terme 11, on dira le nombre des termes 5 diminué de l'unité fait 4, qui, ajouté au premier terme 11, donne 15: ce dernier nombre multiplié par 5, le nombre des termes, donnera 75, somme de la progression.

3°. Pour avoir la somme d'un nombre de termes de la même suite par le moyen du dernier terme, ayant ajouté 1 au dernier terme, retranchez-en le nombre des termes, et mul-

tipliez le reste par le nombre des termes.

Les règles données dans ces deux dernières remarques ont également lieu pour une suite quelconque de nombres pairs

dont la différence commune est 2.

4°. Pour avoir la somme d'un nombre de termes de la suite des nombres pairs, à commencer par 2, multipliez la moitié du dernier terme par cette même moitié augmentée de l'unité.

PROBLÈME 14.

Trouver une ou plusieurs moyennes proportionnelles arithmétiques entre deux nombres donnés.

REGLE.—Pour une moyenne proportionnelle ajoutez les deux nombres donnés, et la moitié de leur somme sera la

moyenne proportionnelle demandée.

Si l'on veut avoir deux moyennes proportionnelles ou plus entre deux nombres, retranchez le plus petit nombre donnée du plus grand, et le reste, divisé par le nombre de moyennes, proportionnelles demandées, augmentées de l'unité donnera la différence commune, qui, ajoutée au premier terme, donnera le deuxième, ajoutée au deuxième donnera le troisième, etc. ou retranchée du dernier donnera l'avant-dernier, retranchée de l'avant-dernier donnera l'antépénultième, etc.

EXEMPLES.

1. On demande une moyenne proportionnelle aritmétique entre 6 et 14.

$$6 + 14 = 20.$$
 $\frac{20}{2} = 10$ Moyenne proportionnelle.

eņ

de termes
tout autre
es diminué
la somme
mme de la
es termes
terme 11,
ombre des

rmes de la ajouté 1 au es, et mul-

arques ont

bres pairs ermes de la ultipliez la gmentée de

ithmétique**s**

outez les me sera la

es ou plus ore donné moyennes, donnera, rme, dontroisième, er, retranetc.

ıtmétique

tionnelle.

2. Trouver tr' is moyennes proportionnelles entre 2 et 14.

14-2=12.
$$\frac{12}{-}$$
 =8 diff. commune. $2+3=5$ le. moy. prop. $5+3=8$ 2e. $\frac{12}{-}$ = $\frac{12}{4}$ = $\frac{12}{5+3}$
- Trouver six moyennes proportionnelles entre 2 et 23.
 Rép. 5, 8, 11, 14, 17, 20.
- 4. Trouver neuf moyennes proportionnelles entre 4 et 29. Rép. 6½, 9, 11½, 14, 16½, 19, 21½, 24, 26½.

DES PROGRESSIONS GÉOMÉTRIQUES.

On appelle Progression Geometrique une suite de nombres tels que la division successive de l'un par l'autre donne toujours le même quotient. On l'exprime ainsi:

1:4:16:64:256:1024, etc. Progression géométrique croissante dont le quotient est 4.

729 : 243 : 81 : 27 : 9 : 3 : 1, Progression géométrique décroissante dont le quotient est 3.

Dans une progression géométrique, le produit de deux termes quelconques est égal au produit de deux autres termes quelconques pris à égale distance des deux premiers, mais de côtés opposés. Ainsi dans le premier exemple ci-dessus, le produit de 16 par 64 est égal aux produits de 4 par 256 et de 1 par 1024.

Le quarré d'un terme quelconque est égal au produit de deux autres termes quelconques pris à égale distance chaque côté de ce terme.

Dans les progressions géométriques, il faut considérer le premier et le dernier terme, qu'on appelle aussi les extrêmes le quotient, le nombre des termes et la somme des termes. Trois de ces cinq choses étant données, les problêmes suivants enseignent à trouver les autres,

PROBLÈME 1.

Etant donnés un des extrêmes, le quotient et le nombre des termes d'une progression géométrique, trouver l'autre extrême.

REGLE —Si c'est le plus grand terme qui est connu, divisez-le par le quotient élevé à la puissance désignée par le nombre des termes mans 1, et vous aurez le plus petit terme. Si au contraire c'est le plus petit terme qui est connu, multipliez-le par le quotient élevé à la puissance ci-dessus, et vous aurez le plus grand terme.

EXEMPLES.

1. Le dernier terme d'une progression géométrique croissante est 486, le quotient est 3, et le nombre des termes 6. Quel est le premier terme ?

d

CO

pi to

m

au

L

av

fo

di

la

Le quotient 3 élevé à la 5e. Puissance = 243. $\frac{486}{243} = 2 Premier terme.$

- 2. Un homme laisse son bien à être distribué à ses dix enfants de la manière suivante, savoir : au plus jeune £50, au suivant £100, et ainsi en doublant jusqu'à l'aîné. On demande la part de l'aîné?

 Rép. £25600.
- 3. Un domestique rusé s'engage chez un monsieur pour 12 mois, à condition qu'il lui donnera 1 sou pour le premier rais 4 sous pour le second, et ainsi de suite en quadruplant. Combien eut-il pour le douzième mois? Rép. £8738 2s. 8d.
- 4. Une personne fait un payement en 5 termes dont chaque est égal à deux fois et demie le précédent : au dernier terme elle paye £62 10s. Combien a-t-elle donné au premier payement?

 Rép. £1 12s.

PROBLÈME 2.

Ayant un des extrêmes, le quotient, et la somme des termes, trouver l'autre extrême.

Regle.—1°. Si c'est le plus grand extrême qui est connu, retranchez-le de la somme des termes : multipliez la différence

re des termes strême.

onnu, divignée par le petit terme. onnu, muli-dessus, et

rique croises termes 6.

ses dix enune £50, au né. On de-

E25600.

eur pour 12 remier rasis plant. Com-738 2s. 8d.

dont chaque rnier terme emier paye-12s.

rmes, trouver

i est connu, la différence qui en résultera par le quotient, et le produit retranché de la somme des termes donnera le plus petit extrême.

20. Si c'est le plus petit extrême qui est connu, ajoutez-le à la somme des termes multipliée par le quotient diminué de l'unité. Le tout divisé par le quotient donnera le plus grand extrême.

EXEMPLES.

1. Le dernier terme d'une progression géométrique croissante est 3072, la somme des termes 4095, et le quotient 4. Quel est le premier terme ?

4095-3072=1023. 1023 × 4=4092. 4095-4092=3 Premier Terme.

2. le premier terme d'une progression géométrique est 1, le quotient 3, et la somme des termes 1093. Quel est le dernier terme ?

 $\begin{array}{c} 1093 \times 2 = 2186. \\ 2187 \\ \hline 3 \end{array} = 729 \begin{array}{c} 2186 + 1 = 2187. \\ \hline 0 \end{array}$

3. Une personne met une certaine somme en commerce, et elle fait deux fois et demie la somme qu'elle a mise; elle continue ainsi à plusieurs reprises, faisant toujours le même profit: à la dernière fois elle fait £24414 1s. 3d., et elle a en tout £40685 16s. 9d. Combien avait-elle lorsqu'elle a commencée?

Rép. £6 8s.

4. Une personne jouant à quitte ou double contre une autre, perd plusieurs fois de suite en progression double. La première fois elle perdit 2s. 6d., et en tout elle se trouva avoir perdu £127 17s. 6d. Combien perdit-elle la dernière fois?

Rép. £64.

PROBLÈME 3:

Ayant le Quotient, le Nombre et la Somme des Termes, trouver les Extrêmes.

REGLE.—Multipliez la somme des termes par le quotient diminué de l'unité; ce produit divisé par le quotient élevé à la puissance désignée par le nombre des termes, et ensuite

diminué de l'unité, donnera le plus petit extrême, lequel étant ensuite lui-même multiplié par le quotient élevé à la puissance désignée par le nombre des termes moins l'unité, donnera le plus grand extrême.

EXEMPLES.

1. La somme des termes d'une progression géométrique croissante est 11718, le nombre des termes 6, et le quotient 5. Quels sont les extrêmes ?

11718×4=46872. 5 élevé à la 6e. Puissance=15625.

46872

15625—1=15624. —=3 Petit extrême.

5 élevé à la 5e. Puissance=3125. 3125×3=9375 Grand extrême.

2. Un Domestique s'engage pour un an à un certain prix pour le premier mois, en triplant, chaque mois suivant, le prix du mois précédent. Au bout de son année il se trouve

avoir amassé £1107 3s. 4d. Combien a-t-il eu le premier et le dernier mois ?

Rép. { 1d. le 1er mois. £738 2s. 3d. le dernier mois.

3. Un boucher allant à la campagne pour acheter des bœufs rencontre un cultivateur qui en avait 23: après avoir marchandé de part et d'autre, le cultivateur offre de lui donner le premier bœuf pour un prix bien modique, à condition qu'il doublera de prix pour chaque autre bœuf jusqu'au dernier. Après avoir fait ou fait faire son calcul, il se trouve qu'il aurait eu £8738 2s. 73d. à donner pour tous les bœufs. On demande le prix du premier bœuf, celui du dernier, et le prix auquel serait revenu chaque bœuf l'un dans l'autre.

Rép. { \frac{1}{4}d. le Premier bæuf.} £4369 1s. 4d. le dernier. £379 18s. 4\frac{1}{2}d. l'un dans l'autre.

4. La somme de £65606 13s. 4d. est à partager entre 9 personnes, de manière que la deuxième ait trois fois la somme de la première, la troisième trois fois celle de la deuxième, et ainsi de suite, en triplant jusqu'à la neuvième. Quelles seront les parts de la première et dernière?

Rép. { £6 13s. 4d. la première. £48740 la dernière. \boldsymbol{L}

me, lequel élevé à la ins l'unité,

ométrique quotient 5.

ce = 15625.

trême.

ertain prix suivant, le se trouve premier et

mois.

cheter des près avoir le lui donà condition qu'au derse trouve les bœufs. nier, et le autre.

l'autre.

er entre 9 is la soma deuxièneuvième.

premiè**re.** ière.

PROBLÈME 4.

Etant donnée les deux extrêmes, et le nombre des termes d'une progression, trouver le quotient.

REGLE.—Divisez le plus grand extrême par le plus petit, et extrayez-en la racine désignée par le nombre des termes diminué d'une unité, et vous aurez le quotient.

EXEMPLES.

1. Les extrêmes d'une progression géométrique sont 1 et 512, le nombre des termes est 10. Quel est le quotient?

$$\frac{512}{1} = 512. \quad \sqrt[9]{512} = 2 \text{ Quotient.}$$

- 2. La population d'un pays s'est accrue uniformément tous les ans, de manière que de 10,000 âmes qu'il y avait d'abord il s'en est trouvé 14,641 au bout de 5 ans; de combien s'est accrue la population chaque année?

 Rép. De ‡‡.
- 3. Le premier terme d'un progression géométrique est 4, le dernier 1640¹4, et le nombre des termes 5. Quel est le Quotient?

 Rép. 4¹2.
- 4. Un marchand veut vendre 17 verges de drap superfin, la première verge à 3d. et augmentant en une certaine proportion, en sorte que la dermère verge se trouve revenir à £538084 0s. 3d. Combien chaque verge vaut-elle la précédente?

 Rép. 3 fois.

PROBLÈME 5.

Les deux extrêmes et la somme des termes étant donnés, trouver le quotient.

REGLE.—Divisez la somme des termes moins le plus petit extrême par cette même somme des termes moins le plus grand extrême.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression géométrique est 5, le dernier 10935, et la somme des termes 16400. Quel est le quotient ?

$$\begin{array}{r}
 16400 - 5 = 16395. \\
 16400 - 10935 = 5465.
 \end{array}
 \qquad \frac{16395}{5465} = 3 \, \text{Rép.}$$

- 2. Un commis s'engage chez un marchand pour un certain nombre d'années à raison de £2 pour la première année et de £195 6s. 3d. pour la dernière, en augmentant chaque année en raison géométrique. Au bout de son temps il se trouve avoir en tout £324 3s. 9d. En quelle proportion son salaire a-t-il augmenté?

 Rép. De 1 d 2½.
- 3. Un journalier s'engage à tirer de la pierre d'une carrière à 4s. pour le premier lit, augmentant en proportion géométrique pour chaque lit subséquent. Après avoir tiré un certain nombre de lits, il reçoit £204 16s. pour le dernier lit, et il se trouve avoir fait £273 en tout. En quelle proportion a été l'augmentation?
- 4. Un domestique voulant s'engager pour un certain nombre d'années, ne demande que 2s. 6d. pour la première année, mais à condition qu'on lui augmentera ses gages tous les ans dans une certaine proportion. Le maître ayant fait son calcul, trouve qu'il aurait £9765 12s. 6d. à lui donner pour la dernière année, et qu'il lui faudrait £12207 pour lui payer ses gages entiers. On demande dans quelle proportion il voulait augmenter ses gages?

Rép. De 1 à 5.

PROBLÈME 6.

Les deux extrêmes et le quotient étant donnés, trouver le nombre des termes.

RECLE.—Divisez le plus grand extrême par le plus petit; divisez ensuite le quotient résultant de cette division par le quotient de la progression, successivement, jusqu'à ce qu'il n'y ait point de reste; le nombre de divisions que vous aurez faites, augmenté de l'unité, vous donnera le nombre des termes.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression géométrique croissante est 3, le dernier 729, et le quotient 3. Quel est le nombre des termes ?

729 = 243. En divisant, 243 par 3, successivement, jusqu'à

ce qu'il n'y ait point de reste, on aura 5 divisions. 5+1=6 nombre des termes

2. Une somme d'argent étant partagée entre un certain nombre de personnes, en donne à la première £20, et £43740 à la dernière, et chaque Personne réçoit trois fois la celle qui l'a précédée. Combien étaient-elles en tout?

3. Un homme laisse son bien à être distribué entre ses Enfants: au plus jeune il laisse £50, au suivant £100, et ainsi de suite en doublant jusqu'à l'aîné qui se trouve avoir £25600 combien avait-il d'enfants?

Rép. 10.

4. Un homme s'engage au service d'un autre, pour un certain temps, à condition qu'on lui donnera 1 sou pour le premier mois, 4 sous pour le deuxième, et ainsi de suite en quadruplant jusqu'au dernier mois qui lui aurait produit £8738 2s. 8d. Four combien de mois s'était-il engagé?

Rép. 12 mois.

PROBLÈME 7.

Les deux Extrêmes et la somme des Termes étant donnés, trouver le nombre des Termes.

Regle.—Cherchez le quotient par le problème 5e., et ensuite procédez comme au problème précédent.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression géométrique croissante est 2, le dernier terme 1458, et la somme des termes 2186. Quel est le nombre des termes ?

Par prob. 5e. $\begin{cases} 2186-2 & =2184 \\ 2186-1458=728 \end{cases} = 3 \text{ Quotient.}$

 $\frac{1458}{2} = 729.$ Divisant ensuite 729 par 3, successivement

jusqu'd ce qu'il n'y ait point de reste, vous aurez 6 divisions. 6+1=7 nombre des termes.

que est 5, uel est le

n certain
née et de
ue année
se trouve
n salaire
1 d 21.

géomégeoméun cerier lit, et portion a 1 à 4.

in nomnière anstous les
t fait son
ner pour
lui payer
portion il
d 5.

ombre des

s petit; n par le ce qu'il us aurez bre des

- 2. Un Homme doit £4095 qu'il convient de payer par termes en proportion géométrique; le premier payement est de £1 et le dernier de £2048. En combien de termes doit-il payer?

 Rép. 12.
- 3. Une personne me doit £197 0s. 7½d. Elle n'a que £4 à me donner pour le premier payement; mais elle m'offre de me payer par termes réguliers, en raisou géométrique, de manière que le dernier sera de £68 6s. 10½d. En combien de payements acquittera-t-elle sa dette?

 Rép. 8.

4. On a partagé une somme de £65600 entre un certain nombre de personnes. On a donné £20 à la première, et augmentant en raison géométrique à chaque personne, la dernière a eu £43740. Entre combien de personnes la somme a-t-elle été partagée?

Rép. 8.

PROBLÈME 8.

Le premier Terme, le Quotient, et la somme des Termes étant donnés, trouver le nombre des Termes.

REGLE.—Multipliez la somme des termes par le quotient diminué de l'unité; divisez le produit par le premier terme, après quoi vous ajouterez une unité. Divisez ensuite le tout par le quotient, successivement, jusqu'à ce qu'il n'y ait point de reste; le nombre de divisions que vous aurez faites vous donnera le nombre des termes.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression géométrique est 3, le quotient 5, et la somme des termes 58593. Quel est le nombre des termes ?

5-1=4. $58593 \times 4=234372$. $\frac{234372}{2}=78124$.

78124+1=78125. En divisant 78125 par 5 successivement, jusqu'd ce qu'il n'y ait point de reste, on a 7 divisions, qui est le nombre de termes cherché.

2. Un homme s'engage à un sou pour le premier mois, à condition que le salaire de chace mois sera quatre fois celui du mois précédent. Au bout d'un certain temps, il se trouve que ses gages se montent en tout à £11650 16s. 10½d. Combien de temps a-t-il servi?

Rép. 12 mois.

er par terent est de les doit-il 12.

n'a que mais elle u géomé-0}d. En

8.

n certain mière, et le, la derla somme . 8.

tant don-

quotient er terme, te le tout ait point tes vous

ue est 3, el est le

3124.

uccessi-7 divi-

mois, à pis celui e trouve . Com-

- 3. Une personne doit £25 14s. 9d.; elle offre 16s. pour le premier payement, 24s. au bout d'un mois, et continuant ainsi à payer chaque mois une fois et demie ce qu'elle aura donné le mois précédent. En combien de mois payera-t-elle?

 Rép. 7 mois.
- 4. Un homme laisse une somme de £51150 à distribuer entre ses enfants : il laisse au plus jeune £50, et ainsi de suite en doublant jusqu'à l'aîné. Combien avait-il d'enfants?

 Rép. 10.

PROBLÈME 9.

Le dernier Terme, le Quotient et la somme des Termes étant donnés, trouver le Nombre des Termes.

Regle.—Multipliez le dernier terme par le quotient; divisez ce produit par la somme des termes dont vous retrancherez la différence entre la somme des termes et le dernier terme, multipliée par le quotient. Divisez lé résultat de cette division par le quotient de la progression, successivement, jusqu'à ce qu'il n'y ait point de reste; le nombre de divisions vous donnera le nombre des termes.

EXEMPLES.

1. Le dernier terme d'une progression géométrique est 192, le quotient 2, et la somme des termes 381. Quel est le ombre des termes?

- 2. Un homme doit £48 16s. 6d. Il convient de payer une certaine somme pour le premier mois, et ensuite à chaque mois cinq fois ce qu'il aura payé le mois précédent. Le dernier mois il a £39 1s. 3d. à payer. En combien de mois a-t-il fait son payement?

 Rép. en 6 mois.
- 3. Un père distribue £2059 entre ses enfants suivant leurs âges, de manière que chaque enfant ait une fois et demie la somme de celui qui le précède. La part de l'aîné se monte à £729. Combien y a-t-il d'enfants? Rép. 7.

4. Un commis s'engage chez un marchand à un certain prix pour la première année, et pour chaque autre année un quart de plus que l'année précédente. La dernière année il a £156 5s. et tous ses gages réunis se moment à £525 5s. Combien a-t-il été d'années?

Rép. 5 ans.

PROBLÈME 10.

Etant donnés les Extrêmes et le Quotient d'une Progression Géométrique, trouver la Somme des termes.

REGLE.—Divisez la différence des extrêmes par le quotient diminué d'une Unité, ajoutez le plus grand extrême au Quotient de cette division, et vous aurez la somme des termes.

EXEMPLES.

1. Les extrêmes d'une progression géométrique sont 1 et 729, et le Quotient 3. Quelle est la somme des termes ? 729—1

 $= 364 \times 729 = 1093$ somme des termes.

2. Le premier payement d'une dette est de £1, le dernier de £2048 : chaque payement est double du précédent. Quelle était la somme due ? Rép. £4095.

3. Une somme d'argent étant divisée entre un certain nombre de personnes, on donne à la première £20, et £43740 à la dernière. Chaque somme est triple de la précédente. Quelle est la somme totale?

 $R\acute{e}p.$ £65600.

4. Un domestique veut s'engager pour un certain temps à 1 sou pour le premier mois, 3 pour le deuxième, et ainsi de suite en triplant. Il se trouve que son dernier mois se monterait à £369 1s. $1\frac{1}{2}d$. A combien se monteraient tous ses gages réunis? $R\acute{e}p.$ £553 11s. 8d.

PROBLÈME 11.

Ayant les deux extrêmes et le nombre des termes, trouver la Somme des Termes.

REGLE.—Divisez le plus grand extrême par le plus petit, extrayez-en la racine désignée par le combre des termes moins

n certain année un année il 6525 5s.

ms.

Géomé-

le quoême au me des

ont 1 et

dernier Quelle

mes.

certain 20, et la pré-

emps à nsi de monus ses 8d.

Somme

it, exmoins l'unité: multipliez cette racine par le plus grand extrême, et du produit retranchez le plus petit extrême. Le résultat divisé par cette même racine diminuée de l'unité, vous don nera la somme des termes.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression géométrique est 2, le dernier 13122, et le nombre des termes 9. Quelle est la somme des termes ?

$$9-1 = 8. \frac{2}{2} = 6561.$$

$$3 \times 13122 = 39366.$$

$$39366-2 = 39364.$$

$$39364 = 19682 somme des termes.$$

2. Un père faisant le partage de son bien entre 7 enfants, donne £32 au plus jeune, et augmentant la part de chacun des autres en proportion géométrique, la part de l'aîne se trouve de £364 10s. Quel était le bien du père?

Rép. £1029 10s.

3. Un homme joue tous les soirs pendant une semaine entière, il perd 2s. 6d. la première soirée, et continue à perdre tous les soirs dans une certaine proportion, jusqu'à la septième soirée qu'il perd £512. Combien a-t-il perdu en tout?

Rép. £682 12s. 6d.

4. Un arbre fruitier a rapporté pour la valeur de 3s. de fruit, et il a continué à rapporter pendant 7 années en progression. Le produit de la dernière année a eté de £109 7s. Combien a-t-il produit en tout?

Rép. £163 19s.

PROBLÈME 12.

Etant donnés le premier terme d'une progression géométrique, le quotient, et le nombre des termes, trouver la somme des termes.

Regle.—Elevez le quotient à la puissance désignée par le nombre des termes, ôtez-en une unité, et divisez-le par le quotient diminué d'une unité, et le multipliez ensuite par le premier terme, et vous aurez la somme des termes.

EXEMPLES.

1. Le premier terme d'une progression géométrique est 3, le

Quotient 3, et le nombre des termes 6. Quelle est la somme des termes ?

 $\frac{3 \text{ elevé à la 6e puissance}}{729-1} = 364.$ $364 \times 3 = 1092 \text{ somme des termes.}$

- 2. Un homme voulant acheter un cheval, convint de payer un sou pour le premier clou des fers, 2 sous pour le second, 4 sous pour le troisième, et ainsi en doublant jusqu'au dernier. Il y a 4 fers; chaque fer à 8 clous. Combien coûte le cheval à ce prix?

 Rép. £8947848 10s. 7½d.
- 8. Un homme s'engage pour un an au service d'un autre à condition que celui-ci donnera 1 sou pour le premier mois, 4 sous pour le second, et ainsi de suite en quadruplant. A combien se montent ses gages au bout de l'aunée ?

 Rép. £11650 16s. 101d.
- 4. Une somme d'argent est à partager entre 8 personnes : la première a £20, la deuxième £60, et de même en triplant jusqu'à la dernière. Quelle est la somme à partager?

 Rép. £65600.

PROBLÈME 13.

Ayant le plus grand extrême, le quotient et le nombre des termes, trouver la somme des termes.

REGLE.—Du quotient élevé à la puissance désignée par le nombre des termes retranchez l'unité: divisez cette différence par la différence entre le quotient élevé à la puissance désignée par le nombre des termes et ce même quotient élevé à la puissance désignée par le nombre des termes diminué de l'unité. Le résultat de cette division multiplié par le plus grand terme donnera la somme des termes.

EXEMPLES.

1. Le dernier terme d'une progression géométrique est 1215, le quotient 3, et le nombre des termes 6. On demande la somme des termes.

la somme

nes.

de payer second, u'au derien coûte 10s. 7½d.

in autre à ier mois, plant. A

8. 101d.

rsonnes : n triplant : ?

nes, trou-

e par le fférence ce désiélevé à inué de le plus

ue est mande 2. Un homme s'engage à un certain prix pour le premier mois, à condition qu'on lui doublera ses gages à chaque moissuivant, jusqu'au douzième, qui lui reviendrait à £204 16s. A combien lui reviendraient tous ses gages réunis?

Rép. A £409 10s.

3. Un père famille a 5 enfants entre lesquels il partage sont bien. Il donne une certaine somme au plus jeune, troisfois cette somme au deuxième, et ainsi de suite jusqu'à l'ainé qui reçoit £4050. Quel était le bien du père?

Rép. £6050.

4. Un marchand voudrait acheter une pièce de drap superfin qui contient 20 verges: on lui demande un prix bien modique peur la première verge: mais à condition qu'il payera chaque autre verge le triple de ce qu'il aura payé la verge précédente. Après avoir compté, il trouve que la dernière verge lui reviendrait à £14528268 6s. 9d. Combien aurait-il payé la pièce entière sur ce pied-là, et combien lui coûterait chaque verge l'une dans l'autre.

Rép. { £21792402 10s. la pièce entière. } £1089620 2s. 6d. la verge.

PROBLÈME 14.

Trouver une ou plusieurs Moyennes Proportionnelles Cométriques entre deux nombres donnés.

Regle.—10. Si vous ne voulez qu'une moyenne proportionnelle, multipliez les deux nombres donnés l'un par

l'autre, et extrayez la racine quarrée du produit.

20. Si vous voulez plus d'une moyenne proportionnelle, divisez le plus grand des deux nombres donnés par le plus petit; extrayez ensuite la racine du quotient désignée par le nombre de moyennes proportionelles demandé, augmenté de l'unité: cette racine vous donnera le quotient de la progression, par lequel vous multiplierez le premier ou plus petit nombre pour avoir le deuxième, le deuxième pour avoir le troisième, et ainsi de suite, suivant le nombre de moyennes proportionnelles demandé.

EXEMPLES.

1. On demande une moyenne proportionuelle géométrique entre 3 et 27.

 $3 \times 27 = 81$. $\sqrt{81} = 9$ Rép, Preuve. 3:9:9:27.

2. Trouver trois Moyennes proportionnelles entre 16 et 81.

- 3. Trouver cinq moyennes proportionnelles entre $\frac{1}{27}$ et 27. $Rép. \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1, 3, 9.$
- 4. Trouver six moyennes proportionnelles entre 16384 et 78125.

 Rép. 20480, 25600, 32000, 40000, 50000, 62500.

PROBLEME 15.

Trouver la somme d'une Progression géométrique décroissante, dont on connaît le Quotient et le premier Terme, ou tous les deux.

Les progressions décroissantes sont finies ou limitées, c'està-dire, qu'on en connaît le dernier terme; ou bien elles sont infinies ou illimitées, c'est-à-dire, qu'on les suppose continuées jusqu'à ce que le dernier terme devienne 0 ou rien. Il est évident, par la nature de ces progressions, que le Quotient est alors une fraction.

Regle.—10. Si la progression est finie, et que vous en ayez les deux extrêmes et le quotient, multipliez le dernier terme par le quotient, retranchez le produit du premier terme, et divisez le tout par 1 moins le quotient, et vous aurez la somme des termes.

20. Si la progression est infinie et que vous en connaissiez le premier terme et le quotient, divisez ce premier terme par 1 moins le quotient, et vous aurez encore la somme des termes.

EXEMPLES.

1. Quelle est la somme d'une progressiou dent le premier terme est 1, le dernier terme $\frac{1}{64}$ et le quotient $\frac{1}{4}$?

16 et 81.

Prop.

: 81.

3, 9.

16384 et

62500.

ante, dont deux.

es, c'estelles sont ose conou rien. e le Quo-

vous en dernier er terme, aurez la

naissiez erme par me des

premier

 $\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

2. Quelle est la somme de la progression $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$, etc., continuée à l'infini, dont le quotient est $\frac{1}{2}$?

½ divisée par1-1=1 somme des termes.

- 3. Quelle est la somme de la progression $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, etc., continuée à l'infini ?
 - Rép. 1.
- 4. Quelle est la somme de la progression $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{4}$, etc., à l'infini?

 Rép. $2\frac{1}{4}$.
 - 5. On demande la somme de 3, 7%, 84, etc., à l'infini? Rép. 3.
- 6. Quelle est la somme de $2\frac{7}{9}$, $1\frac{9}{3}$, 1, $\frac{9}{4}$, etc., à l'infini? $R\acute{e}p$. $6\frac{17}{5}$.
- 7. Trouver la valeur de la fraction décimale 0.6666, etc., continuée à l'infini.

Cette fraction équivant à la progression $\frac{6}{10} + \frac{6}{100} +$

 $\frac{1}{10}$ divisé par $1-\frac{1}{10}=\frac{6}{5}=\frac{2}{5}$. Valeur de la Fraction.

8. Quelle est la valeur de la fraction décimale périodique 0.324324324, etc., à l'infini?

9. Trouver la valeur de la fraction périodique mixte 0.138888 etc., à l'infini.

Cette fraction équivant à $\frac{13}{100}$ plus la progression $\frac{8}{1000}$ + $\frac{8}{10000}$ + $\frac{8}{100000}$ etc., dont le premier terme est $\frac{8}{1000}$, et le quotient $\frac{1}{10}$.

Pour avoir d'abord la somme de la progression on aura $\frac{3}{10000}divisé$ par $1-\frac{1}{10}=\frac{300}{9000}=\frac{3}{900}$ somme de la Progression. Mais la fraction vaut cette somme-là et $\frac{1}{1000}$ ou $\frac{11}{1000}$ de plus. Or $\frac{3}{1000}+\frac{1}{1000}=\frac{1}{1000}=\frac{5}{1000}=\frac{5}{1000}$ Valeur de la fraction.

Ces trois derniers exemples peuvent donner quelques éclaircissements sur les fractions décimales périodiques.— Voyez page 26, Problème 1er.

COLLECTION DE QUELQUES PROPRIÉTÉS CURIEUSES ET UTILES DES NOMBRES.

de

- 1. Tout nombre pair peut être divisé par 2.
- 2. Tout nombre finissant par deux zéros, ou tout nombre pair dont les deux derniers chiffres, pris comme nombre entier, sont divisibles par 4, peut lui-même être divisé par 4.—S'il finit par trois Zéros, ou si les trois derniers chiffres sont divisibles par 8 le nombre lui-même sera divisible par 8.

Anna de combre 123524 est divisible par 4, car le nombre 24, composé des deux derniers chiffres, est divisible par 4. De même 123624 est divisible par 8, car 624 est lui-même divisible par 8.

- 3. Tout nombre qui finit par 5 est divisible par 5; s'il finit par 25 il sera divisible par 25, et s'il finit par 125 il sera divisible par 125, etc.
- 4. Tout nombre qui finit par un zéro peut être divisé par 10, et par conséquent par 5; s'il finit par deux zéros, il peut être divisé pa 100, et par conséquent par 25, et par 4 d'après l'article 2, et par conséquent par 20.
- 5. Si la somme des chiffres qui expriment un nombre est divisible par 3. le nombre lui-même est divisible par 3; il le sera par 6 s'il est pair: par 15 s'il finit par 5; par 30 s'il finit par un zéro; par 12 s'il finit par deux zéros ou par deux chiffres qui, pris comme nombre entier, sont divisibles par 4.—Voyèz article 2.
- 6. La somme des chiffres qui expriment un multiple quelconque de 9, est elle-même un multiple de 9; comme réciproquement tout nombre dont la somme des chiffres est 9 ou un multiple de 9, est lui-même un multiple de 9. Le nombre 72, par exemple, multiple de 9, donne pour la somme de ses chiffres, 7+2=9. 378, autre multiple de 9, donne $3+7+8=18=9\times 2$.

Ainsi pour connaître si un nombre peut être divisé exactement par 9, cherchez la somme des chiffres qui l'expriment, et si elle est 9 ou multiple de 9, on peut être assuré que le nombre est divisible par 9, et par conséquent par 3; par 18, et par conséquent par 6 s'il est pair; par 45, et par conséquent par 15 s'il finit par 5, et par 36 s'il est en outre divisible par 4, etc.

SES ET

nombre nombre visé par chiffres e par 8.

nombre par 4. -même

'il finit sera di-

isé par il peut 4 d'a-

ore est il le il finit deux es par

quelne rés est 9 . Le omme lonne

exacxprissuré ar 3; t par outre Si les chiffres qui expriment le nombré forment par leur addition un nombre qui excède 9 ou un multiple de 9, ce dont il excèdera ce multiple sera le nombre qui restera après la division par 9. Ainsi si l'on voulait savoir si 376 est divisible par 9, dites 3+7+6=16=9+7, ce qui indique qu'après avoir divisé par 9, il resterait 7.

7. Les chiffres qui expriment un nombre quelconque étant transposés de telle manière que l'on voudra, et les différents nombres qui en résultent étant comparés deux à deux, leur différence sera toujours 9 ou un multiple de 9.

EXEMPLES.

$$\begin{array}{lll} 642-624&=&18&=\\ 264-246&=&18&=\\ 462-426&=&36&=&9\times 4.\\ 624-462&=&162&=\\ 426-264&=&162&=\\ 426-246&=&180&=\\ 426-246&=&180&=\\ 426-264&=&198&=\\ 462-264&=&198&=\\ 462-246&=&216&=\\ 462-246&=&216&=\\ 624-264&=&360&=&9\times 40.\\ 642-264&=&378&=\\ 624-246&=&378&=\\ 624-246&=&378&=\\ 624-246&=&396&=&9\times 44. \end{array}$$

8. Dans tout nombre divisible par 11, la somme des 1er, 3e. 5e. 7e. etc. chiffres est égale à la somme des 2e. 4e. 6e. 8e. etc. ou bien la différence de leurs sommes est égale à 11 ou divisible par 11.

Si l'on renverse l'ordre des chiffres qui expriment un nombre quelconque, la somme et la différence du nombre direct et du nombre renversé sont des multiples de 11; la somme quand les chiffres du nombre proposé sont en nombre pair, et la différence quand ils sont en nombre impair.

Ex.
$$\begin{cases} 8254 + 4528 = 12782 \text{ divisible par } 11. \\ 82543 - 34528 = 48015 \text{ divisible par } 11. \end{cases}$$

9. Un nombre quarré ne peut finir que par les chiffies 1, 4, 5, 6 ou 9, ou par un nombre pair de zéros précédés d'un de ces chiffres.

- 10. Un nombre cube peut finir par quelque chiffre que ce soit de la suite des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou par trois, six, neuf, etc. zéros.
- 11. Tout nombre quarré pair est divisible par 4, et tout nombre cube pair est divisible par 8.
- 12. Tout nombre quarré impair divisé par 4 donnera 1 de reste : ainsi un nombre qui, divisé par 4, donnera 2 ou 3 de reste, ne peut pas être un nombre quarré.
- 13. La somme de deux nombres quelconques qui ne diffèrent entre eux que d'une unité est égale à la différence des quarrés de ces mêmes nombres. Par exemple 5+6=11qui est la différence entre 25 et 36, quarrés de ces mêmes nombres.
- 14. La somme d'un nombre quelconque de termes de la suite des nombres impairs, commençant par l'unité, donne le quarré du nombre des termes.—Voyez la première remarque au bas de la page 139.
- 15. La somme de deux nombres multipliée par la différence de ces mêmes nombres donne la différence des quarrés de ces nombres.
- 16. Il suit de l'article précédent que la différence des quarrés de deux nombres peut-être divisée par la somme et par la différence de ces nombres.
- 17. Le double de la somme de deux quarrés est égal au quarré de la somme des racines ajouté au quarré de la différence de ces mêmes racines.
- 18. La différence entre un quarré et sa racine peut être divisée par 2, et celle entre un cube et sa racine par 6.
- 19. Pour avoir la somme d'une suite de nombres quarrés à commencer par l'unité, doublez la racine du dernier terme et ajoutez-y l'unité, multipliez ensuite cette somme par le tiers de la somme des racines à commencer par l'unité.
- 20. Pour trouver la somme des cubes, depuis l'unité, prenez le quarré de la somme des racines.
- 21. Pour trouver un quarré en raison donnée avec sa racine, divisez le premier nombre de la raison par le deuxième ; le quarré du quotient sera le quarré demandé.

6,

éga par siv

la s le p diffe de c brea

div

E

et det diff

qua qua 2 sen div

sen deu des l'ai que ce 7, 8, 9,

et tout

a 1 de

ne difce des = 11 nêmes

de la donne re re-

diíféparrés

quarpar la

al au liffé-

t être

rés à erme ar le

pre-

cine,

Ex. Pour avoir un quarré qui soit à sa racine comme 5 est

6, divisez 5 par 6, et vous aurez—: - :: 5: 6

22. La demi-somme du cube et du quarré d'un nombre, égale la somme des produits de ce nombre par lui-même et par tous les autres nombres au-dessous, jusqu'à l'unité inclusivement.

Ex. Le cube de
$$5 = 125$$

Le quarré de $5 = 25$
 $5 \times 4 = 20$
 $5 \times 3 = 15$
 $5 \times 2 = 10$
 $5 \times 1 = 5$
 150
 $5 \times 1 = 5$

23. La somme des cubes de deux nombres est divisible par la somme de ces nombres; et si du quotient vous retranchez le produit de ces deux nombres, vous aurez le quarré de la différence de ces nombres : de même la différence des cubes de deux nombres est divisible par la différence de ces nombres; et si au quotient l'on ajoute le produit de ces deux nombres, l'on aura le quarré de la somme de ces nombres.

24. Pour multiplier un nombre par 5, ajoutez-y un zéro et

divisez par 2.

Ex. Multipliez 756345 par 5.

7563450 (2

3781725 Rép.

25. Pour multiplier un nombre par 25 ajoutez-y deux zéros et divisez par 4; pour multiplier par 125 ajoutez trois zéros et divisez par 8, etc.

26. Si l'on multiplie l'un par l'autre deux nombres dont la différence est 2, leur produit augmenté d'une unité sera le quarré du nombre intermédiaire.—Ex. $7 \times 9 + 1 = 64$, quarré de 8.

27. Si deux nombres sont tels que leurs quarrés ajoutés ensemble fassent un quarré, le produit de ces deux nombres est

divisible par 6.

28. Pour trouver deux nombres dont les quarrés ajoutés ensemble fassent un nombre quarré, multipliez l'un par l'autre deux nombres quelconques, le double de leur produit sera un des nombres cherchés, et la différence de leurs quarrés sera l'autre.

FORMULES ALGÉBRIQUES DES PRINCIPALES REGLES GON-TENUES DANS CET OUVRAGE.

FORMULE DE LA RÈGLE D'INTÉRÊT SIMPLE.

10

20

30

On a

Soit p le principal; d le denier par cent; r l'intérêt; t le temps qu'une somme reste à intérêt, et m le montant.

On aura
$$1^{\circ} \cdot p = \frac{100r}{dt} = m - r = m \left(\frac{100}{100 \times dt} \right)$$

$$2^{\circ} \cdot d = \frac{100r}{pt} = \frac{100}{t} \left(\frac{m-p}{p} \right) = \frac{100}{t} \left(\frac{r}{m-r} \right)$$

$$3^{\circ} \cdot r = \frac{p \ d \ t}{100} = m - p = m \left(\frac{d \ t}{100 + d \ t} \right)$$

$$4^{\circ} \cdot t = \frac{100r}{p \ d} = \frac{100}{d} \left(\frac{m-p}{p} \right) = \frac{100}{d} \left(\frac{r}{m-r} \right)^{\bullet}$$

$$5^{\circ} \cdot m = p + r = \frac{p}{100} \left(100 + dt \right) = \frac{r}{t} \left(\frac{100 + dt}{d} \right)$$

ES CON-

rêt ; *t* lø t.

 $\left(\frac{r}{m-r}\right)$

 $\left(\frac{r}{-r}\right)$ 00+dt

 $\left(\frac{00+dt}{d}\right)$

FORMULES DE LA REGLE D'INTÉRET COMPOSÉ.

10
$$p=m\left(\frac{100}{100+d}\right)^t = m-r = \frac{r(100)t}{(100+d)t-(100)t}$$

20 $r=p\left(\frac{100+d}{100}\right)^t - p = m-p = m \times -\frac{(100+d)-(100)t}{(100+d)t}$
30 $m=p\left(\frac{100+d}{100}\right)^t = p+r = \frac{r(100+d)t}{(100+d)t-(100)t}$

FORMULES DE LA REGLE D'ESCOMPTE.

Soit p le principal ou la somme à escompter ; e l'escompte ou la somme a déduire ; v la valeur présente ou le principal diminué de l'escompte ; d le denier par cent, et t le temps.

On aura 1o.
$$p=v+e=e\left(\frac{100+d\ t}{d\ t}\right)=v\left(\frac{100+d\ t}{100}\right)$$
.
2o. $e=p-v=p\left(\frac{d\ t}{100+d\ t}\right)=\frac{v\ d\ t}{100}$
3o. $v=p-e=p\left(\frac{100}{100+d\ t}\right)=\frac{100\ e}{d\ t}$.
4o. $d=\frac{100}{t}\left(\frac{e}{p-e}\right)=\frac{100}{t}\left(\frac{p-v}{v}\right)=\frac{100\ e}{v\ t}$.
5o. $t=\frac{100}{d}\left(\frac{e}{p-e}\right)=\frac{100}{d}\left(\frac{p-v}{v}\right)=\frac{100\ e}{v\ d}$.

FORMULES DES PROGRESSIONS ARITHMÉTIQUES.

Soit a le plus petit terme; x le plus grand; d la différence des termes; n le nombre des termes, et s la somme des termes.

On aura 1o.
$$a = x - dn + d$$
. 2o. $a = \frac{d}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4x^2 - 8ds + 4dx + d^2}$
3o. $a = \frac{2s - nx}{n}$. 4o. $a = \frac{s}{n} - d\left(\frac{n-1}{2}\right)$. 5o. $x = a + dn - d$.
6o. $x = \frac{1}{2}\sqrt{4a^2 + 8ds - 4ad + d^2} - \frac{d}{2}$ 7o. $x = \frac{2s - an}{n}$
8o. $x = \frac{s}{n} + d\left(\frac{n-1}{2}\right)$. 9o. $d = \frac{x - a}{n-1}$ 10o. $d = \frac{x^2 - a^2}{2s - x - a}$
11o. $d = \frac{2s - an}{n}$ 12o. $d = \frac{n^2 - n}{n^2 - n}$ 13o. $n = \frac{d}{2a - d}$
14o. $n = \frac{2s}{a + x}$ 15o. $n = \frac{1}{2d} \sqrt{4a^2 + 8ds - 4ad + d^2} - \frac{2a - d}{2d}$
16o. $n = \frac{ad + dx + x^2 - a^2}{2d}$ 18o. $s = n\left(\frac{a + x}{2}\right)$.
17o. $s = \frac{ad + dx + x^2 - a^2}{2d}$ 18o. $s = n\left(\frac{a + x}{2}\right)$.

IS.

la difféi somme

$$4dx+d^2$$

$$+ dn-d$$

$$=\frac{2s-an}{n}$$

$$x-a+d$$

$$a = 2a - d$$

FORMULES DES PROGRESSIONS GÉOMÉTRIQUES.

Soit a le plus petit terme ; x le plus grand ; q le quotient ; n le nombre des termes, et s la somme des termes.

On aura,
$$1 \circ . a = \frac{x}{q}$$
 2 \cdot . $a = s - q$ (s-x).

3°. a (s-a) = x (s-x) Par le moyen de cette équation on peut trouver la valeur de a ou de x, selon le cas, par une fausse position double. $4°. a = \frac{s (q-1)}{q n-1}.5°. x=aqn-1.$

$$6 \circ \cdot x = \frac{a + s (q - 1)}{q} \cdot 7 \circ \cdot x = \left(\frac{qs - s}{qn - 1}\right) \cdot q \cdot 8 \circ \cdot q = \sqrt{\frac{s}{a}} \cdot \frac{n - 1}{a} \cdot \frac{x}{a} \cdot q = \sqrt{\frac{s - a}{a}} \cdot 10 \circ \cdot q - 1 - \frac{s}{a} \cdot q - 1 = 0.$$

11°. q^{n} $\left(s-x\right)$ -sq + x = 0. Par le moyen de ces deux dernières équations on trouvera la valeur de q par la règle de

Fausse position double. 12°. $n = \frac{\text{Log. } x - \text{Log. } a}{\text{Log. } q} + 1$; ou bien

$$q = \frac{x}{a}$$
: En divisant par q successivement, jusqu'à ce

qu'il ne reste rien, le quotient de $\frac{a}{a}$, le nombre de divi-

sions + 1 donnera
$$n.$$
 13°. $n = \frac{\text{Log. } x - \text{Log. } a}{\text{Log. } (s-a) - \text{Log. } (s-x)} + 1;$

Ou bien, $\left(\frac{s-a}{s-x}\right)^{n-1} = \frac{x}{a}$: On trouvera n en divisant le quo-

tient de $\frac{x}{a}$, continuellement, par le quotient de $\frac{s-a}{s-x}$, jusqu'à

ce qu'il ne reste rien, et en ajoutant 1 au nombre de divisions.

Log. s(q-1) + a - Log. a $14 \circ . n = \frac{n}{\text{Log. } q}$; ou bien, $q = \frac{n}{a}$:

En divisant continuellement $\frac{qs-s+a}{a}$ par q, jusqu'à ce qu'il

ne reste rien, le nombre de divisions donnera n.

15°. $n = \frac{\text{Log. } (qx-sq+s)}{\text{Log. } q} + 1$; ou bien, $q = \frac{x}{qx-sq+s}$:

En divisant continuellement par q, jusqu'à ce qu'il qx-sq+s ne reste rien, et ajoutant 1 au nombre de divisions, on aura n.

$$\frac{qx-a}{q-1} \cdot 17^{\circ} \cdot s = \frac{x \sqrt[4]{a}}{x \sqrt[4]{a}} \cdot 18^{\circ} \cdot s = \frac{aq-a}{q-1}$$

$$\sqrt[4]{-1}$$

$$19^{\circ} \cdot s = \frac{xq - x}{qn - qn - 1}$$

FORMULES DE COMPTES, REÇUS, ETC.

FORMULES DE COMPTES.

Québec,	le	12	mars	1855.
---------	----	----	------	-------

Mr. Pierre Etienne, marchand,

ce qu'il

-sq + s:

a ce qu'il

on aura n.

aq-a

A acheté de Martin & Cie.

			8	d.			£	8.	d.
18	Verges de Sa	atin à	10	6	par verge		9	9	0
	Verg. de Sa						3	10	0
19	Verg. de Ve	elours à	17	6	-		16	12	6
18	Verg. de Dr.	ap à	15	0	-		13	10	0
28	Verg. de Se	rge à	4	0	-		5	12	0
							-		
						C14	640	10	-

Reçu le montant le même jour.

MARTIN & CIE.

Québec, le 12 mars 1855.

Mr. George Goûtfin,	
marchand-épicier,	A acheté d'Edouard Lecours.

				8.	d.	£		s. d.
271	lbs.	de Café de Smyrne	à	5	8	7	14	5
33	lbs.	do. de Mocha	a	5	4	8	16	0
261	lbs.	de Thé Impérial	à	25	0 -	33	2	6
103	lbs.	do. Bou				7	15	101
13	lbs.	do. vert	à	18	8	12	2	8
21	lbs.	de sucre double)					
		raffiné		1	$0\frac{1}{3}$	1	1	101
							-	_

Ct. £70 13 4

Reçu le même jour cinquante louis courant à-compte.

Pcur EDOUARD LECOURS. CHARLES COMMIS.

COMPTE TIRÉ DES LIVRES.

Mr	Togo	nh	Vincent.	doit
TATI.	1056	\mathbf{n}	vincent.	aon

	· coop		00111,						àL	ucas &	Cie	
	1855.						s.	d.		£	8.	d.
23	Mai.	1500	mino	s de	Blé	à	4	9		356	5	0
9	Juillet.	1230	do.		do.	à	5	0		307	10	0
			do.							60	0	0
28		240	Verge	es de								
	m		Toile			à	0	10		10	0	0
_	19656 S.	11	lbs. d	e Fi						1	7	6
.83		77.4	B Ga						Ct.	£735	2	6

Reçu le montant, Québec, le 1er de Sept., 1855. LUCAS & CIE.

FORMULES DE REÇUS ET DE QUITTANCES.

Reçu, Québec, le 1er. septembre, 1855, de M. Jean Julien, la somme de sept louis huit chelins et demi courant, à-compte de ce qu'il me doit.

£7 8 6 Ct.

ROBERT RENÉ.

por

£50

Ign

loui

£4

cer

son

£1

Po

ou

ce:

Reçu, Montréal, le 15 juillet, 1855, de Mr. Bernard Bonnesoi, la somme de soixante et-quinze louis courant, à compte de ce qu'il doit à Mr. Denis Détailleur.

£75 0 0 Ct.

CHARLES COMMIS.

Reçu, Québec, le 8 août, 1855, de Mr. Pierre Payebien, la somme de dix louis dix chelins à-compte de mes gages.

£10 10 0 Ct.

CORNEILLE CRISPIN.

Reçu, Québec, le 20 août, 1855, de Mr. Antoine Acheteur, la somme de deux mille louis courant, pour solde de tout compte jusqu'à ce jour.

£2000 0 0 Ct.

VINCENT VENDEUR.

FORMULES DE BILLETS.

Je promets payer à demande, à M. Edouard Drolet, ou au porteur, la somme de sept cents louis courant, valeur reçue. Québec, le 20 août 1855.

JACOB JACOBSON.

£700 0 0 Ct.

A demande je promets payer à Charles Villiers, écuyer, ou à son ordre, cinquante louis courant, valeur reçue. Québec, le 8 août 1855.

BERNARD BELLEFASSE.

£50 0 0 Ct.

Montréal, 10 août 1855.

A quarante jours de cette date, je promets payer à M. Ignace Ingant, ou à son ordre, quatre cent quarante quatre louis et sept chelins courant, pour valeur reçue.

REMI RABOT.

£444 70 Ct.

Québec, 12 février 1855.

Emprunté et reçu de M. Timothy Jigglepins, la somme de cent cinquante louis courant, que je promets lui payer ou à son ordre, le 15 août prochain.

£150 0 0

LETTRES DE CHANGE.

Pour £50 Ct.

Québec, 10 mai 1855.

HENRI HIBOU.

A six jours de vue, il vous plaira payer à M. Thomas Tireur ou ordre, cinquante louis courant, valeur reçue de lui, et placez-les, comme par avis, à-compte de

F. E. TOMY.

A M. Barthélemy Banquier, marchand, Montréal.

Jean urant,

Cie.

10 0

355.

s. d.

0

Bon-

IÉ.

nt, à

bien,

IS.

N.

teůr, tout

R.

Pour £22 5 Ct.

Trois-Rivières, 15 avril 1855.

A vingt jours de date il vous plaira payer à M. Etienne Benoît, vingt deux louis et cinq chelins courant, valeur reçue de M. Barnabé Belleface, que vous placerez en compte, comme par avis de RENE RICHARD.

A M. Paul Putoff, merchand, Québec.

[Première de change.] Pour £250 sterling.

Québec, 8 août 1855.

A soixante jours de vue payez cette première de change, (la seconde et la troisième ne l'étant pas,) à M. Richard Riche, ou ordre, la somme de deux cent cinquante louis sterling, pour valeur reçue ici de M. Simon Sauri, et placez-la en compte, comme par avis de THOMAS TIREUR.

A M. Francis Farfetch, marchand à Londres.

[Seconde de change.] Pour £250 sterling.

Québec, 8 août 1855.

A soixante jours de vue payez cette seconde de change, (la première et la troisième ne l'étant pas,) à M. Richard Riche, ou ordre, la somme de deux cents cinquante louis sterling, pour valeur reçue ici de M. Simon Sauri, et placez-la en compte, comme par avis de

THOMAS TIREUR.

A M. Francis Farfetch, marchand à Londres.

[Troisième de change.] Pour £250 sterling.

Québec, 8 août 1855.

A soixante jours de vue payez cette troisième de change, (la première et la seconde ne l'étant pas,) à M. Richard Riche ou ordre, la somme de deux cent cinquante louis sterling, pour valeur reçue ici de M. Simon Sauri, et placez-la en compte, comme par avis de

THOMAS TIREUR.

A M. Francis Farfetch, marchand à Londres.

FORMULE DE CONNAISSEMENT.

Jr., George Goudron, maître, après Dieu, de la Goëlette Marie, maintenant mouillée dans le Port de Québec, dans l'endroit appelé le Cul-de-Sac, pour du premier temps qu'il plaira à Dieu d'envoyer, aller en droite route au Port de Montréal, reconnais et confesse avoir reçu de M. Bernard Bonnepaye, Marchand de Québec, et chargé dans le bord de ma dite Goëtette, sous le franc Tillac d'icelle, ringt-six quarts de Cassonade, le tout en bon ordre et bien conditionné, et marqué de la marque mise en marge: lesquelles marchandises je promets et m'oblige porter et conduire dans ma dite Goëlette; sauf les périls et risques de la mer et de la navigation, au dit lieu de Montréal, et là les délivrer à M. Bernabé Brissebois, marchand, en me payant pour mon fret la somme de vingt-six chelins, avec les avaries, selon les Us et Coutumes de la mer. Et pour ce accomplir, je m'oblige corps et bien, avec ma dite Goëlette, fret et Apparanx d'icelle. En foi de quoi j'ai signé trois connaissements d'une même date et teneur, dont l'un étant accompli, les autres seront de nulle valeur. Fait à Québec le 6 juin, 1855.

(Signé,)

BB

GEORGE GOUDRON.



1855.

compte,

1855.

change, rd Riche, sterling, cez-la en REUR.

1855.

change,
Richard
ante louis
et placez-

REUR.

t 1855.

change, ard Riche sterling, acez-la en

REUR.